

COMMENTARII
DE REBUS
IN
SCIENTIA NATURALI
ET
MEDICINA
GESTIS.



VOLUMINIS XVII. PARS IV.

LIPSIAE MDCCLXXII.

PVD IO. FRIDERICVM GLEDITSCH

Venduntur etiam

Amstelodami apud I. Schreuder, Londini apud Io. Nourse, Parisiis apud
Briasson, Venetiis apud I. B. Pascali, Patavii apud Io. Manfrè,
Holmiae apud L. Salvium.



I.

De Bononiensi scientiarum et artium instituto atque academia commentarii. Tomi quinti, pars prima 8. Alph. 8. pl. 48. tab. aen. pars altera 8. Alph. 88. tab. aen. Bononiae typis Laelii a Vulpe 1767. 4.

Pluribus, quae ad historiam instituti Bononiensis, de cuius ratione alio loco diximus*), pertinent, omissis, notamus tantum ab anno 1757 ex Professoribus instituti DOMINICVM FABRIVM, HERACLIVM MANFREDIVM, IOSEPHVM IGNATIVM SCANDELLARIVM, PETRVM PAVLVM MOLINELLIVM, HERCVLEM LELIVM et IACOBVM BARTHOLOMAEVM BECCARIVM diem obiisse. Huic ultimo, qui Praesidis uniuersi Instituti munere fungebatur, Cl. FR. MARIA ZANOTTVS successit, qui a secretis Academiae antea erat. ZANOTTI vero munus SEBASTIANO CANTERANO commissum est.

In Commentariis, in quibus, vti alibi iam monuimus, summa opusculorum a Sociis Instituti communi-

O o 2

muni-

*) Comment. nostr. Vol. V. p. 286. Confer. quoque Vol. VII. p. 387.

- p. 29. municatorum traditur, varia tamen occurrunt, quae in opusculis desiderantur, et de quibus breuiter ad lectores referre, operae pretium esse duximus. Sic relatum legimus Cl. FERDINANDVM BASSIVM hyacinthum orientalem, caule bulbifero instructum, in horto reperiisse, a BOEHMERO in catalogo harum plantarum praetermissum. Idem BASSIVS de petrefactis agri Bononiensis pluribus exposuit. ANTONIVS BALDANVS locustas maiores, quibus S. IOANNES BAPTISTA in deserto vitam tolerasse creditur, descripsit. MOLINELLIVS denique vsum fungi in larice et fago crescentis in haemorrhagiis sistendis aequae magnum esse ac illius, qui e quercu colligitur, variis experimentis comprobauit. Commemorantur tamen quoque casus, vbi agaricus inutilis fuit, nisi compressio simul quoque vasis discissi adhiberetur.

Opuscula vero in parte prima huius voluminis sequentia continentur:

P.I. p. I. 1) IACOBI BARTHOLOMAEI BECCARII *de lacte commentarius*. Vti Cl. BECCARIUS in triticea farina, quae tota vegetabilis indolis esse videtur, animale partem vegetabili admixtam esse primus demonstrauit *); sic in lacte particulas nonnullas animalis naturae reperiri experimenta hic enarrata probant. Ante BECCARIVM lac BOERHAAVIUS imprimis et MACQUERUS, in elementis chemiae chemice disquisuerunt. Et prior quidem massam a destillatione lactis residuam pinguem et dulcem, salium plane expertem esse affirmavit; posterior vero lac in partem serosam, butyraceam et caseosam diuisit, ferumque a Cl. GEOFFROY iam examinatum nulli ulteriori examini subiecit. Docent vero experimenta hic

*) Comment. Bonon. T. II. P. I. p. 123 seq.

hic fufius defcripta, ex maſſa a deſtillatione lactis re-
liſta, ſi fortiori igne vrgeatur, acidum ſpiritum ob-
tineri, tandemque particulas ſalis alcalini volatilis
vaporum alborum ſub forma ſurgere et excipuli pa-
rietibus adhaerere. Eadem phaenomena ſeri deſtilla-
tio exhibuit; gluten vero e caſeo coctura et preſſione
paratum, quo fabri lignarii vtuntur, ſpiritum tantum
alcalinum, acidi vero nihil plane exhibuit *).

2) FRANCISCI BIBIENAE *ſpicilegium de bom-* p. 9.
byce. Cl. Auct̃or occasione morbi cuiuſdam quo a. 1749.
bombyces afficiebantur fabricam harum erucarum ſub-
tilius examinavit obſervationesque ſuas hoc commen-
tario academiae, communicavit. Materia, quae in
canalibus ſericeis (*vaiſſeaux ſoyeux*) **) continetur, ſeu
ſericeus humor primo capite diſquiritur. Hæc, ſi ſpiritu
vini eruca ante diſſectionem immiſſa fuerit, in duas par-
tes diuidi commode poteſt, quarum interior ſine co-
lore eſt, exterior vero longe minor, colorata et fla-
ueſcens deprehenditur. Humor ſericeus aqua non ſol-
uitur; educitur tamen colorata pars, quae vero non
perfecte diſſolvitur, ſed fundum vasis petit. Ab alcalino
ſale non mutatur, neque ab oleo; ſpiritus vero vini hu-
morem illum condenſat, et ſucceſſu temporis colo-
ratam partem quoque ſolvit. Saponum vero ope per-
fecta ſolutio obtinetur. Humorem ſericeum nutritioni
animalis inferuire Cl. Auct̃or ſuſpicatur. Addit quo-
que varia de modo, quo interior pars ab exteriori ob-
ducitur, et putat exteriorem partem flexibilitatem

Oo 3

interioris

*) Cl. MACQUERUS in dictionario chemico ſub voce
fromage alcali volatile caſeo ineſſe iam monet, quam-
quam in elementis chemiae de acido tantum loquitur.

**) Omnino conferri hic merentur, quae Cl. LYO-
NET in eleganti erucæ ſaliciſ descriptione de hiſ et
reliquis erucarum partibus habet. Vid. Cl. LYO-
NET in libro citato p. III. et 498. Comm. noſtr.
Vol. XI, p. 443.

- p. 24. interioris quodammodo conseruare. Secundo capite de canali alimentorum bombycis Auctor Cl. exponit. Hic ex duplici tunica constat, minime inter se connexis, quarum interiorem bombyx, dum in chrysalidem se vertit, deponit. Ventriculi quoque forma et totius canalis mirum in modum mutatur, et in superiore eius parte liquor, secernitur, quo papilio, dum egressum ex folliculo molitur, ad eius humectationem et emollitionem vtitur. In inferiore vero canalisi alimentarii parte humor colligitur, qui cum acido marino et nitroso efferuescit, et si deinceps, exsiccat, rubellum colorem acquirit. In aliis papilionibus iam sine acidi admixtione rubet, et, si a papilione, e folliculo egresso, excernitur, guttulam sanguineam refert, quales saepe a plebe pro pluuia sanguinea habitae fuerunt. In bombycibus vero non, nisi acido affuso, rubet. Ferri particulas ei inesse chemica experimenta Auctorem Cl. docuerunt. Tercio capite Cl. Auctor de peculiari coloris mutatione in tracheis, quae in chrysalide obseruantur, exponit. Quae enim in eruca plumbeum colorem referebant, iam in chrysalide argenteae apparent, interiore tunica nigricante (vti de canalisi alimentarii tunica iam diximus) cum exuiis erucae deposita. Quarto capite spinalis medullae peculiaris motus describitur. Notum est, spinalem medullam *) in erucis pluribus gangliis siue nodis instructam esse, ex quibus nerui prodeunt. Haec, vt cerebrum et medulla spinalis in aliis animalibus, omni motu destituitur. Dum vero eruca in chrysalidem et papilionem mutatur motum quendam acquirit constantem ac regularem et irritabilis fit, qui motus, vt cordis irritabilitas, quae post mortem remanet. Quinto capite varia experimenta in papilionibus, circa generationis negotium instituta, enarrantur. Feminae, capite rescisso, coitum
- p. 49.
- p. 56.
- p. 67.

*) vid. LYONET l. c. p. 96. Comm. nostr. l. c. p. 432.

coitum tamen exercuerunt, in foecunda tamen oua posuerunt.

3) FERDINANDI BASSI *de ambrosina, nouo plantae genere* dissertatio. Est arum *proboscideum* LINN. Var. b. De ipsa vera hac dissertatione seorsim impressa, iam alio loco ad lectores retulimus *).

4) VINCENTII RICCATI *disquisitio analytica, de termino generali serierum reccurrentium*, cum appendice. P. 82.

5. CAIETANUS MONTIUS *de ammannia, herbae palustris, noua specie.* Ammanniam (*baccifera* P. 87. ram) foliis subpetiolatis, capsulis calyce maioribus coloratis LINN. quae in China habitat, in agro Bononiensi nunc quoque magna in copia repertam esse refert.

6) THOMAE LAGHI *historia epidemicae constitutionis, in qua parotides, seroso glutine tumentes, reduntur, cum peculiaribus symptomatibus, quaeque constitutio, ineunte anno 1753, Bononiae contigit.* **) In febribus catarrhalibus similibus tumor ad parotidesoriebatur tactu renitens, glandulas quoque maxillares et interdum colli glandulas et tonsillas occupans. Rubor et dolor modo maior, modo minor erant. Febris vt plurimum ad nonum, vndecimum vel decimum quartum diem durabat et venaesectione, lenientibus et diluentibus leuabatur. A parotidibus, tussi et febre auctis, saepius ad testes metastasis in hoc morbo obseruabatur, qui maiori dolore, quam parotides, vexabantur. Fomentis tamen malum facile cedebat. In feminis pudenda quoque afficiebantur dolore et pruritu, dolorque aderat lumborum, qualem sub menstruorum accessu saepius feminae experiuntur.

*) vid. Comment. nostr. Vol. XI. p. 509.

**) vid. quoque Cl. ROCHARD Journ. de Med. 1757. p. 379. Comm. Vol. VIII. p. 461. Est *catarrbus Bellinseianus* Cl. SAUVAGES Nosol. method. Vol. II. p. 35.

untur. Caussam morbi in tempestate humida et frigida, quae praecesserat, Cl. Auctor ponit, accusat tamen etiam effluvia peculiaria terrae, cum in Bononiensi tantum agro morbus hic observatus fuerit. Iam ab HIPPOCRATE L. I. *Epidem.* similem morbum observatum fuisse, Auctor Cl. probat. Vidit enim ille morbum post pluviiosam tempestatem, in quo tubercula magna circa aures erant, qui in quibusdam parum incalescebant, in omnibus vero non in suppurationem abibant; tussis interea siccae aegros vexabant et paulo post testiculorum unus vel uterque inflammabatur.

P. 126. 7) EUSTACHII ZANOTTI *de veneris ac solis congressu, observatio habita in Astronomica specula Bononiensis scientiarum instituti d. 5. iunii 1761.*

P. 141. 8) FERDINANDI BASSI *de Bononiensi phytotypolito dissertatio.* Lapidem describit prope Bononiam repertum, ex calce, arena et mica compositum, in quo, praeter varia conchyliā petrificata, etiam folium e *quercu Indica* RUMPHII Cl. Auctor reperit.

P. 150. 9) VINCENTIUS RICCATI *de motibus liberis et curvilineis corporum proiettorum, quae sese attrahunt per funem extensibilem, transeuntem per datum punctum.*

P. 169. 10) ROGERIUS IOSEPHUS BOSCOWICK *de recentibus compertis pertinentibus ad perficiendam dioptricam.*

P. 236. 11) IANI PLANCI Ariminensis *epistola ad FERDINANDUM BASSIUM de incessu marinorum echinorum, ac de rebus quibusdam aliis marinis.* Summa observationum, quas Cl. PLANCUS hic proponit,

nit, est: echinos aculeorum ope se in latus voluere, cornubus vero, quae per foramina emittant, tum aquam fugere, tum progredi *). Echinis vulgo notis Cl. Auctor adhuc coriaceam aliquam speciem *cucumerem* scilicet *marinum* RONDELETTII ob internam formam et mammillas, quas emittit, licet aculeis careat, adnumerat. Coniungit etiam cum iis *mentulas* sic dictas *marinas*. Stellarum quoque marinarum ingressus ope spinarum fit, siue aculeorum breuissimorum, quibus corpus attollunt et incedunt.

12) GUSMAN GALEATIUS *de renum morbis*. p. 249. Varias morborum historias et sectiones cadauerum Cl. Auctor describit, vbi signis calculi in renibus praesentibus, post mortem calculi nulli, sed renes tantum magnitudine aucti et intus vesiculis multis compositi deprehendebantur. Vesiculae hae seroso humore turgescabant, et in quadam femina ante mortem cum vrina tales quoque excernebantur. In omnibus his aegris hydrops ascites accessit, omnesque apoplexiâ subito extincti fuerunt.

13) VINCENTIUS MENGHINUS *de aqua*. p. 261. *rum vi in calculis dissoluendis*. *Commentarius* I. et II. Nullum esse aquarum genus, quod ad dissoluendos calculos, debite applicatum, eos vel omnino vel ex parte saltem emollire non deprehendatur, experimenta Cl. Auctoris confirmant. Vfus vero est 1) aqua pluuiâ destillata 2) aqua pluuiâ non destillata 3) puteali quadam sublutosa 4) puteali aliqua puriore et 8) aqua pluuiâ cum tartaro solubili (i. e. tartaro tartarifato nostrarum officinarum) coniuncta. Frustula calculi e vesica extracti, quorum singulorum pondus granorum quatuordecim erat, iis immisit, viditque

O o 5

*) Similia fere iam habet Cl. REAUMUR in Actis Parisinis a. 1710.

viditque post viginti dies 1) aquae speciem duo grana, 2) grana tria, 3) grana sex, 4) grana septem, et 5) grana octo soluisse. Cum igitur tartari tartarifati tantam, in calculo dissoluendo, esse vim cognosceret, eum cum variis aliis salibus mediis comparauit, viditque, eum et tartarum regeneratum (seu terram foliatam tartari nostrarum officinarum) reliqua omnia virtute lithontriptica superare.

p. 275. 14. IANI PLANCI *epistola de vrina veneta* *).

p. 280. 15) PETRI PAULLI MOLINELLII *de grauium corporum descensu in aqua commentarius*.

p. 291. 16) PAULUS FRISIUS *de motu orbium planetarum*.

p. 309. 17) IDEM *de acceleratione et retardatione motus planetarum*.

p. 333. 18. CAIETANUS MONTIUS *de xylophthori terrestris prima specie*. Insectum, hoc commentario descriptum, ad phalaenas bombyces elingues, alis depressis, dorso laeui LINNAEI pertinet. Larua huius phalaenae in vagina seu folliculo ex gramineis culmis contexto, habitat, quam sibi ipsa conficit. Phalaena ipsa antennas nigricantes pectinatas, habet; thorax griseus est, alae vero vtraque facie pulchrae, nitore sericeo sublucentes, et ad imam oram fimbriatae deprehenduntur. Papilio femina alis destituitur et toto habitu differt. Haec e folliculo egressa in vagina latitans se conuertit vt aluum et oviductus ostium mari obiiciat et ita ab eo foecundetur.

19.

*) vid. Comment. nostr. Vol. VI. p. 261.

19. FRANCISCI MARIAE ZANOTTI *ad* p. 349.
TORQUATUM VARENIUM *epistola, in qua pri-*
 mum de luce agitur, tum pauca indicantur de motu cor-
 porum initiali.

In parte secunda sequentes commentarii con-
tinentur:

I) PETRI PAULLI MOLINELLI *obserua-* P. II.
tiones aliquot medicae. Prima observatio *de ossis hyoi-* p. I.
dis luxatione inscribitur. Os hyoideum in antero-
rem partem luxatum VALSALVA ex boli maioris de-
glutitione vidit, luxari vero idem hoc os in posteriorem
quoque partem posse Cl. MOLINELLI duplici obser-
uatione probat. Accidit vero hoc in iuvene vi ex-
terna, cum scilicet in concertatione aduersarius collo
eius manum iniiceret, et ad priorem dextramque
partem vehementer conprimeret. Luxatione facta, ae-
ger loquela, et respiratione parum impeditis, nil ta-
men solidi vel liquidi deglutire potuit, summaque
anxietate affectus est. Larynx quodammodo defor-
mata visa est, tumorque in dextro latere inter la-
ryngem et sternomastoideum musculum conspicieba-
tur. Cl. Auctor in auxilium aegri aduocatus digi-
tum indicem dextrae manus in fauces dimisit, exte-
rius vero digitos duos sinistrae manus collo apposuit,
quibus pressionem indicis in fauces dimissi, qua os
in situm dirigere tentabat, moderaret et dirigeret.
Quo etiam artificio non solum in hoc, sed in alio quo-
que viro, qui etiam ab externa causa simili luxatione
vexabatur, os in pristinum situm restituit. Secunda p. 7.
obseruatione *de venefica aeris indole* agitur. Probat
vero Cl. Auctor experimento in 22 hominibus facto,
carnes cum pinguedine, adiecto sale, in vase aeneo, stan-
no non obducto, tostas exinde non nociuam naturam
aequisiuisse. Tertia obseruatione vincturam descri- p. 9.
bit

bit, *adrupti tendinis patellae* curationem vtilissimam. Cum enim Cl. Auctor cognosceret nec situ solo, nec MUSCHENBROECKII lamina, plenariam curationem obtineri, aliud vincturae genus excogitavit. Componitur vero haec duabus fasciis, e molli corio confectis, quarum vna superius ventri altera genu et tibiae infra affectum tendinem circumducitur. Vtraque vero fibula quoque munitur, atque inter se tribus habenis coniungitur, quae inferiori fascia stabilitur, superiore vero mediante fibula annexae sunt, et magis adhuc in situ circumducta tertia fascia firmantur,

P. II. 2) PAULLUS FRISIUS *de inaequalitatibus motus terrae et lunae circa axin ex Astronomorum hypothesebus.*

P. 59. 3) IOANNES BAPTISTA A CAVOLO *de metamorphosi duorum ossium pedis in quadrupedibus aliquot.* Os, quod Galli *le canon* dicunt et quod metatarsi et metacarpi ossibus respondet, ex Cl. FOUGEROUX obseruatione in fetu et recens natis vitulis et agnis componitur duobus ossibus, quae superficie plana per totam suam longitudinem sibi invicem accumbunt, tandemque ita inter se concrescunt, vt primo septum remaneat cartilagineum, quod sensim deletur, vt vnicum tandem os supersit. Rationem huius concretionis et motum, quo septum deletur, Cl. Auctor hic vltius examinat, docetque pressione externa musculorum et motu animalis concretionem hanc plurimum adiuuari.

P. 66. 4) SEBASTIANUS CANTERZANUS *de attractione sphaerae.*

5) GREGORIUS CASALIUS *de machinula* p. 71.
quadam ad proiettilium theorias per experimenta probandas.

6. CAIETANUS TACCONI *de rhachitide* ob. p. 81.
seruationes. Femina iam tertio anno rhachitide adficiēbatur, quam spinæ et extremitatum inflexio, immodica ventris crassities pluraque alia incommoda sequuta sunt, quibus omnibus non obstantibus, ad 42 tamen annum miseram vitam protraxit. In cadauere eius Cl. TACCONI insignem in abdominis cauo tumorem detexit, album superficieque scabrum, qui etiam in thoracem, adactō diaphragmate, se invexerat, visceraque abdominis; ventriculum, lienem, magnamque intestinorum partem sursum adegerat. Massa hæc 22 libras pendebat, adeoque dura deprehendebatur, vt ferræ ope disseccanda esset. Osseam enim naturam habebat, quæ tamen sensim in scirrhosam duritiem mutabatur, cavitæque intus instruebatur, quæ libram vnam semis humoris visceridi et quasi pinguis continebat. Exterius vero et interius tenui membrana obducebatur. Cohærebat hic tumor cum nonnullis aliis tumoribus in abdomine conspicuis; aderat quoque caries vertebrarum et costarum. His præmissis, de rhachitide Auctor Cl. in vniuersum exponit, atque ex consideratione ossium plurimorum rhachiticorum quinque obseruationes communicat: 1) ibi inflecti ossa, vbi arterias maiori copia recipiunt, 2) eas arterias, vbi ossa ingrediuntur, latiores esse et ampliores, sed statim, vt ingressæ sunt, maiorem in modum constringi, 3) in parte ossium concaua foramina et cellulas sanguine foedas in pueris præsertim reperiri: 4) has cellulas nullum manifestum periosteum habere vel illud vlcusculis affectum esse: 5) in conuexa ossium parte, si ipsam conuexitatem excipias, nil præternaturale

turale reperiri. Ex his vero obseruationibus colligit, mucosum sanguinem eo loco, vbi vasa os ingrediuntur, stagnare, stagnando corrumpi et exsudare cellulasque ipsas male afficere, sicque latentem cariem producere.

p. 99. 7) IOANNES BACIALLIUS *de fluminibus in mare fluentibus.*

p. 108. 8) IOANNES ANDREAS CASTELVRETUS *de proprietate numerorum diuisibilium per I, II, III, IV. I. - etc.*

p. 120. 9) HIERONYMI SALADINI *methodus Bernoulliana de reducendis quadraturis transcendentibus ad longitudinem curuarum algebraicarum, a quibus inutilis saepe redditur, imaginariis quantitatibus liberatur, atque eiusdem reductionis innumerae aliae viae indigantur.*

p. 139. 10) GUSMAN GALEATII *historiae duae mirabiles calculorum in vreteribus existentium.* Calculos in renibus haerentes si adeo magni sunt, vt per vretes non transire possint, abscessus in renibus excitare, duae hae morborum historiae et sectiones probant. Hoc pus si cum vrina exeat, aeger licet debilitetur, tamen per aliquot annos vitam trahere potest. Si vero calculus omnem viam praecludat, citius aeger perit. In vno tamen horum aegrorum, calculo in vretre sinistro haerente, pus ex fistulosa apertura in hypochondrio sinistro egressum sibi parauit, aegerque adhuc per aliquod tempus seruatus est. Calculo vero ex dextro rene vretre ingresso omni-que vrinae exitu praecluso diem obiit.

p. 151. 11) IACOBI BLANCANI *iter per montana*
159. *quaedam agri Bononiensis loca. Vezzanum montem*
et

et ripas fluminis Samodiae et petrefacta aliaque fossilia ibi reperiunda describit.

12) GREGORIUS CASALIUS *de quorundam* p. 169. *vitrorum fracturis sermo alter, quo diluuntur obiecta nonnulla, quae Cl. IOANNES BAPTISTA SCARELLA protulerat aduersus sermonem primum de eodem argumento conscriptum* (vid. Comment. Bonon. Vol. III.)

13) VINCENTIUS RICCATUS *de aequivalencia potentiarum per principia metaphysica demonstranda.*

14) EIVSDEM *epistolae tres, quibus utilitas calculi finuum et cosinuum in infinitesimorum analysi demonstratur.*

15) GYSMANN GALEATIVS *de cortice Peruviano.* Auctor varia hic ad Cl. TORTI *de usu corticis Peruviani* dissertationem addit. Singularem febrium speciem facit asthmaticarum, quae solo usu corticis curantur. Enarrat quoque nonnulla exempla utilitatis huius remedii in febribus lethargicis et cum spasmo coniunctis. In nonnullis aegris, febre intermittente laborantibus cortex, nihil profecit, nisi cascarilla quoque ei adiungeretur. Reliqua ad dosin corticis pertinent, quae ad febris curationem requiruntur. Hanc TORTVS duarum vnciarum fecit, GALEATIVS vero recte monet saepe longe maiore copia opus esse.

16) HIERONYMVS FABRICVS *de monstrop. humano.* Externam capitis formam fetus monstrosi describit, in quo calua ita depressa fuit, vt fere omnis cranii cauitas abesset; tactu tamen se cerebelli quoddam vestigium distinguere potuisse putat.

p. 236. 17) EVSTACHIUS ZANOTTUS *de supputandis aequationibus in orbitis planetarum.*

p. 241. 18) SEBASTIANI CANTERZANI *epistola ad HIERONYMUM SALADINUM, qua EVSTACHII ZANOTTI observatio Veneris, solem traicientis, ab omni erroris suspitione liberatur.*

p. 249. 19) IOANNIS BRUNELLI *epistola ad EVSTACHIUM ZANOTTUM de pororoca.* Americano hoc nomine subitanea et horrenda eruptio et quasi turgescencia aquarum indicatur, quae in fluuio *Guama* ad *Param* urbem nonnullisque aliis Americae locis observatur, et cum aestu maris coniuncta est, quamquam in locis poprius ad mare sitis nihil eiusmodi accidat. Ostendit Noster aquam per canales subterraneos in fluxu maris ad haec loca transferri; libere tamen fatetur, nec per hanc hypothesin omnia phaenomena bene explicari posse.

p. 256. 20) EUSTACHIUS ZANOTTUS *de angulo positionis et eius usu in determinanda telluris figura.*

p. 265. 21) ROGERIUS IOSEPHVS BOSCONICH *de unione colorum aliorum post alios per binas substantias ac unione multo maiore per tres.*

p. 334. 22) IOANNIS BRUNELLI *de mannioca ad FERDINANDUM BASSIVM epistola,* Culturam *Iatrophae manihot* LINN. (f. *Cassiae*) varia, quae ex ea parantur, cibi genera et effectus succi eius venenati describit, quae omnia, cum nil noui contineant, omittimus.

p. 345. 23) GREGORIUS CASALIUS *de vi pulueris pyrii per machinas dimetienda.*

24) GRE-

24) GREGORIUS CASALIUS *de ictu pulueris* p. 357
pyrii.

25) IOANNES BAPTISTA MARTINI *de* p. 372
usu progressionis geometricae in musica.

26) IOSEPHI BENVENUTI *de Lucensium* p. 395.
thermarum atmosphaera. Situm harum thermarum, quae in pago *Corsena* reperiuntur, describit, et aerem ibi purissimum esse ostendit. Addit meteorologicam tabulam, in quam observationes, ab ineunte mense maio 1762 vsque ad exitum aprilis 1763, retulit.

27) VINCENTII RICCATI *additamentum ad* p. 415.
opusculum de termino generali serierum recurrentium,
(vid. partem primam huius voluminis p. 583.)

28) EIUSDEM *epistola ad* Cl. CLAIRAUT, p. 421.
de corpore proiecto cui, praeter potentiam seruantem rationem reciprocam duplicatam distantiarum a centro, applicatae sunt aliae potentiae duae, quarum una dirigitur ad idem centrum, altera est huic perpendicularis.

29) EIUSDEM *epistola ad* IACOBVM MARI- p. 432.
SCOTTVM *de quadratura curuarum, tradita per summas generales serierum.*

30) IOANNES BAPTISTA SCARELLA *de* p. 446.
principiis visionis directae, reflexae et refractae.

31) ALOYSIVS GALVANVS *de renibus at-* p. 500.
que ureteribus volatilium. Renes auium plerarumque duo sunt oblonga viscera, anterieus in quatuor, posterius in duos lobos diuisa. Componuntur ex oblongis lobulis, arteriaeque cum vasis secretoriis vrinariis.

niferis communicant, quae in vnum vreterem tandem, vt glandularum conglomeratarum ductus, confluunt. Vreteres in intestinum rectum terminantur, eosque in auibus viuis apertis peristalticum et antiperistalticum motum habere Cl. Auctor obseruauit.

p. 509. 32) FRANCISCI MARIAE ZANOTTI *sermo observationem nouam exhibens, qua Cl. DE LANDE mirabilem quandam in Saturni motibus inaequalitatem demonstrat.*

p. 514. 33) PAULLI FRISII *epistola ad FR. M. ZANOTTVM, qua operis de grauitatis legibus, a se edendi, formam rationemque describit.*

II.

Differtations sur les antiseptiques, qui ont concouru pour le prix proposé par l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon en 1767, dont la première a remporté le Prix, et dont les deux autres ont partagé l'*Accessit*; Inprimées par ordre de l'Académie. A Dijon, chez Francois Des Ventes, Libraire de Monseigneur le Prince de Condé. A Paris chez Des Ventes de la Dové, Libraire. 1769. 8 mai. Alph. 2 plagg. 3½ sine praefatione.

h. e.

Differtationes de antisepticis, quibus de praemio, ab academia Divionensi proposito, certatum est, quarum prior illud obtinuit, reliquae duae autem eidem proxime accesserunt; impresso ex mandato academiae.

Thema

Thema hoc, quod olim iam indicauimus, ab illustri hac Academia propositum fuisse *), inter alios elaborandum sibi sumserunt viri Cll. DE BOISSIER, BORDENAVE et GODART. Cl. BORDENAVE tamen ideo praemium tributum non est, quia non idem studium in explicandis auxiliis medicis ad putredinem, quam chirurgicis, adhibuisse videbatur: Cl. GODART autem, quia modum non exposuit, quo antiseptica eousque putredinem corrigerent, ut partibus, eadem affectis, consistentiam naturalem redderent; quod quidem momentum maxime Cl. MACBRIDE tentaminibus debemus. Nostrum nunc est, singulorum scriptorum rationem lectoribus nostris exhibere.

Cl. DE BOISSIER opus suum ad normam quaestionis, ab Academia propositae, in quatuor partes diuidit, ideoque, praemissa introductione, in parte prima de notione antisepticorum in sensu latissimo, in parte secunda de modo, quo ea agant, in tertia, quomodo variae eorum species distingui debeant, et in quarta de usu eorum in morbis exponit. Vltterius autem tractatio diuiditur, ita, ut in secundae partis sectione prima, de modo agendi antisepticorum simplicium, in altera medicamentosorum dicatur: pars quarta, eaque amplissima, sectiones tres exhibet, de morbis productis a putredine in parte externa, in primis viis, et in massa sanguinis; vltima harum sectionum tres rursus articulos complectitur, de putredine scorbutica sanguinis, de febrili, et de ea, quam actio causae localis producit, quae duas paragraphos exhibet, alteram de putredine purulenta, alteram de gangraenosa.

Primo loco ad stabiliendam putredinis animalis notionem cum propria, tum aliorum auctorum exempla Cl. Auctor recenset, et ex iis varia corollaria

P p 2

elicit;

*) vid. Comm. nost. Vol. XIII. p. 163.

- p. 16. elicit; nimirum aerem ex substantiis animalibus, in putredinem abeuntibus, magna copia egredi; ad eam necessario requiri actionem aeris exterioris, qui si attingere non possit substantias istas iam putrescentes, putredo ipsa sistatur; istas in vase, exacte clauso, putrescentes alkali volatile euoluere, quod in aere liberiori, aut adiuncto maiore caloris gradu, protinus dissipatur, ac in quodam tantum putredinis gradu neque sub initium aut finem, praesens sit; odorem putridum semper adesse, debiliorem tamen sub initium et finem, et corrigendum ab alkali volatili; substantias putrescentes voluminis et ponderis iacturam pati; putredinem augeri calore, tardari frigore, adiuvari humiditate et aeris exterioris impetu debiliores idem corporibus fermentantibus, aut, quae paucum aerem contineant aut eundem absorbeant; substantiam sanam seruari, si defendatur ab impressionibus aeris exterioris, aut impediatur euolutio et iactura aeris fixi aut elementaris; corpora putrida aerem absorbere, eorumque putredinem corrigi absorptione aeris eius, quem quaedam substantiae offerunt, et qui exit sub fermentatione aut efferuescentia, item
- p. 18. que, cum nitrum super carbonibus deflagrat. Putredo vero est motus intestinus, excitatus sponte inter particulas insensiles corporis organici, formans principia foetida indolis alkalinae volatilis, ea dissipant et corpus in elementa sua resolvendo illud destruunt quatuor ergo in quocumque huius morbi generis gradus constitui debent, procliuitas nempe in eam principium, progrediens, ac denique consummatio quae differentiae omnes ex mutatis phaenomenis patent.
- p. 20. Partes animales omnes, sibi relictæ, putredinem contrahunt; primum euoluitur lene ac idum, quamquam non in omnibus, subito evanescens, postmodum odor putridus, ab alkalescentia plane diuersus, et citius oriens, quam is, diutius etiam

etiam perdurans. Cum omnis substantia salina ex partibus aquosis cum terrestribus iunctis constet, haecque in alkalibus copiosiores adsint, quam in acidis, atque in illis volatilibus subtiliores et arctius cum phlogisto coniunctae, quam in fixis, patet inde, sub initia putredinis facilius extricari acidum, terrae leviori antea sociatum, quae postmodum subtilior reddita et arctius copiosiusque cum phlogisto unita, volatilis redditur, et alkali huius generis offert. Haec p. 23. ergo a motu intestino pendent; is autem proficisci videtur ab aere fixo, exitum quaerente, particulis eius arctius ad se inuicem accedentibus atque elasticitatem acquirentibus, indeque reliquis partibus elementaribus in motum ductis. Remotis autem hisce coniecturis, hoc patet, omnia ea, quae prop. 24. pensionem aeris fixi in statum elasticum augment, evolutionem et expansionem eius promouent, obstacula huius evolutionis tollunt vel infringunt, ac denique ad disiunctionem principiorum aliquid conferunt, considerari debere tamquam causas agentes putrefactionis, quo ea pertinent, quae iam ex corollariis superius adduximus. Causam ergo motus intestini, putredinem efficientis, Cl. Auctor in actione simultanea aeris p. 26. interni et atmosphaerici ponit, dum prior se liberare tentat a substantia, putredini obnoxia, alter in eam penetrare. Antiseptica ergo dicenda sunt ea remedia, quae impressionem aeris exterioris impediunt, aerem fixum in corporibus conseruant, aut eundem amissum restituunt: quae quomodo fiant p. 27. pars secunda exponit, cui tabulam generalem adiunxit Cl. Auctor, ut vno intuitu totus ambitus remedium horum conspici posset, quorum ergo diuisionem nunc exhibituri sumus.

Remedia antiseptica sunt:

A. *Simplicia*, quae agunt in substantias, vita destitutas, quarum solida aequae ac fluida sunt in statu inertiae; haec sunt:

- a. *conferuantia*, quae substantiam sanam ab impressione aeris exterioris defendunt, aeremque fixum in eadem retinent; diuiduntur iterum in
- a. *unctuosa*, quae partibus oleosis, mucilaginosi cet. poros occludunt,
 1. *oleosa*, olea pressa cet.
 2. *pinguia*, adeps liquatus.
 3. *gummosa*, gummi arabicum et tragacanthae, sicca adhibita.
 - β. *adstringentia*, quae solida stringunt, exsiccant, ideoque etiam poros coarctant.
 1. *frigida*, glacies, nix, aqua gelida.
 2. *salina*, nitrum, sal ammoniacus, crudus.
 3. *salinometallica*, crystalli lunae, turpethum minerale, plumbum et ferrum in acidis mineralibus soluta, cet.
 4. *terreoslyptica*, calx viua.
 5. *acida*, vegetabilia et mineralia.
 6. *alkalia*, fixa et volatilia.
 - γ. *mixta*, vtrisque proprietatibus ditata.
 1. *resinae aut gummiresinae*, balsamum peruianum, camphora cet.
 2. *substantiae simplices*, chinae cortex in puluere vel decocto, cet.
 3. *liquores vinosi et spirituos*, varii generis.
- b. *corrigentia*, quae progressum putredinis coercent, eamque corrigunt, sunt:
- a. *imperfecta*, quae tantum substantiam penetrant, principia putrida quasi saturant, neutra reddunt et corrigunt.
 1. *acida*, vel *vegetabilia*, vel *mineralia*.
 2. *alkalia*, vel *fixa*, vel *volatilia*.
 - β. *perfecta*, quae substantiis putridis amissum aerem fixum restitunt,
 1. *gummosoresinosa*, extractum chinae cet.
 2. *mate-*

2. *materiae, actu fermentantes*, quorum commistio corticis chinae cum salina refertur, cet.
3. *mixturae effervescentes*, acidum vitrioli cum lixiuio tartari, sal cornu cerui cum aceto vini cet.
4. *liquores vinosi*, varia vina, iisque analoga potus genera v. c. cidre cet.
5. *terreoslyptica*, calx viua.
6. *vapores*, ignis liberi, nitri detonantis, suffimigiorum cet.

B. *Medicamentosa*, quae in partes viuas agunt, solidis et fluidis actionem iuuantibus; haec sunt:

a. *externa seu topica*,

α. *improprie dicta*, quae vel putredinem retinent, ne oriatur, vel separationem putridi promouent,

1. *emollientia*, cataplasmata, fofus, balnea cet.
2. *refoluentia, reperimentia*, frigida, folutiones falium mediorum, fpirituo-fa cet.
3. *vulneraria*, balsamica, digeftiua cet.
4. *efcharotica*, aqua phagedaenica cet.
5. *auxilia chirurgica*, fcarifationes, ex-firpationes vel amputationes.

β. *proprie dicta*, quae putredinis progreflum coercent, aut partibus, hac affectis, fanitatem reftituunt,

1. *fubftantiae fimplices*, plantae amarae, aromaticae, china, balsama naturalia, fty-rax, camphora, myrrha, olea effentialia
2. *medicamenta*, ex his praeparata et compofita.

3. *vapores* nitri detonantis, suffimigiorum accensorum, materiarum fermentantium seu efferuescentium.

b, *interna*, eaque

a. *improprie dicta*, quae materias putridas euacuant

1. *emetica*, ipecacuanha et remedia ex antimonio parata.
2. *cathartica*, fena, aloe, rheum, cassia cet.
3. *diuretica* sic dicta frigida, plantae nasturtinae, nitrum, cremor tartari.
4. *diaphoretica* ex vegetabilibus, antimonium diaphoreticum, cet.
5. *bechica* ex vegetabilibus, balsama nativa, mel, cet.

β. *proprie dicta*, seu *alterantia*.

1. *prophylactica*, quae partibus, in quibus putredo euoluitur, statum naturalem reddunt.

a) *adstringentia* vel *styptica*, ad tonum solidorum restituendum, vegetabilia et mineralia, potissimum acidum vitriolicum.

b. *frigida*, ad moderandum calorem intestinum, acida vegetabilia et mineralia, nitrum cet.

c) *calida* vel *stimulantia*, ad excitandas vires, spirituosae, cardiaca, alkalia volatilia.

2. *curatiua*, quae partes, in quibus putredo iam progressus fecit, sanant,

a) *diaetetica*, desumpta ex

α) *animalibus*, serum lactis, iuscula animalium iuniorum cum vegetabilibus cet.

γ. ve-

β) *vegetabilibus*, nutrientia gelatinosa, demulcentia et lubricantia, nec non varia potus fermentati genera.

γ) *reliquis rebus non naturalibus*, aer purus, renouatus et correctus variis auxiliis; exercitium corporis moderatum; animi tranquillitas.

b) *pharmaceutica*,

α) *antiscorbutica*, ex nasturtinorum classe

β) *febrifuga*

1) *aromatica*, cortices citri, aurantiorum, nux moschata cet.

2) *balsamica*, balsama nativa,

3) *alexipharmaca*, angelica, serpentaria virginiana, allium cet.

4) *amara*, cortex peruianus, centaureum minus, cascarilla, absinthium cet. catechu, myrrha, camphora, gummi ammoniacum.

γ) *effervescentia*, succus citri, cum sale absinthii mixtus et illico assumtus.

Haec autem tabula quamvis magis ad partem tertiam huius tractationis, quae differentes antisepti-
corum species tradit, pertineat, nos tamen malui-
mus, eam ante exhibere, quam nonnulla ex parte
secunda, de modo agendi eorum, exciperemus, ne
molesta repetitione taedium crearem Lectoribus.
Sales omnes videri possent, vim exserere antisepti-
cam, cum carnes exsiccent fibrasque stringant, ideo-
que referendi inter adstringentia: sed neutri potius p. 29.
augent proclivitatem in putredinem, si in minori dosi
adhibentur, dum pars ipsorum terrea magis agit,
quam acida, ideoque aerem fixum absorbet; maior

- autem dosiſ vere eos antifepticos reddit, quia tunc pars acida efficacius agit, quam terrea. Calci viuæ virtutem hanc conciliare videtur principium iſtud, quod MEYERUS acidum pingue dixit, quodque Cl. Auctor non niſi aerem fixum intime cum materia puriſſima ignis ſociatum eſſe putat. Antifeptica
- p. 31. mixta ex vegetabilibus tantum petenda ſunt, quæ tamen vel particulis, nimis facile fermentationem contrahentibus, vel particulis craſſioribus terreis orbata eſſe oportet; prius demonſtrat effectus guaiaci, ſæpius excocti, alterum extracti corticis Peruuiani.
- p. 32. Inde etiam diuerſitas virtutis antifepticae liquorum,
- p. 41. fermentatione paratorum, patet. Antifepticorum externorum proprie dictorum effectus idem fere eſt, qui corrigentium: potentiſſima ex iis ſunt, quæ ex ſubſtantiis reſinoſis aut gummoſoreſinoſis petuntur.
- p. 42. Vaporum, quos hic recenset Cl. Auctor, ipſe nondum expertus eſt uſum, quem tamen utique theoria promittit. In alterantium refrigerantium uſu caute attendendum eſt, ne, acidis nimis copioſe adhibitis, vaſa excretoria primarum viarum iuſto plus conſtringantur, putridæque materiae exitus præcludatur: quare nonnulli practici, acidis ſigi materiam morbiſicam, dixerunt. Caute etiam cum ſtimulantibus mercandum eſt, quorum uſus nonniſi in irritando ſyſtemate neruoſo et vaſculoſo conſiſtit; immediate ergo putredini non reſiſtunt, cum alia ex iis, ut ſpirituosa parum aeris fixi contineant, alia, ut alkalia volatilia, ſoluendo humores, eorum acrimoniam augeant: et licet partem, vita deſtitutam, a putredine immunem reddant, eandem tamen in corpore viuo excitant atque accelerant. Cum nonnunquam ſpiſſitudo humorum cauſſa remota putredinis exiſtat, hanc præuertendo utilia eſſe queunt: unde forte uſus eorum, in viperæ morſu protinus applicatorum, declarari poterit. Antifeptica curatiua ex ſolis vegetabilibus

tabilibus peti possunt, quibus quippe maior copia p. 47.
 inest aeris elementaris quam corporibus aliorum reg-
 norum naturae; accedit facilior ad fermentationem
 propensio, si cum liquoribus animalibus commiscentur
 indeque facilior aeris huius euolutio. Neque vero
 omnium vna eademque est conditio, aut idem vsus.
 Recentia vere efficaciora sunt siccis, sed saepe adhi-
 beri nequeunt in morbis acutis, quia aer in primis
 viis copiose euolutus, neque adeo facile resorben- P. 48.
 dus, elasticitate rursus acquisita, saepe maxima in-
 commoda parit. Inde tunc magis eorum decocta
 vel infusa, iuncta iusculis animalibus tenuioribus, vel
 serum lactis in vsum ducenda sunt: cum in morbis
 chronicis vegetabilia recentia per se, liquores, actu
 fermentantes vel in fermentationem proni, maxime
 conferant. Principium volatile in plantis nastur-
 tinis forte ex insigni quantitate aeris fixi, facile euol-
 vendi, constat, eodem forte modo, quo aer iste ex p. 50.
 liquoribus fermentantibus prodit.

Progredimur nunc ad partem quartam de vsu p. 55.
 horum remediorum in morbis. Morbos putridos,
 vt caussae occasionales, producunt victus animalis,
 defectus alimentorum aut deprauata eorum indoles,
 abusus liquorum spirituosorum, bilis abundantia,
 motus fluidorum corporis nostri vel nimis retarda-
 tus vel nimis acceleratus, aer vel humidus, vel ca-
 lidus, vel vterque simul, vel exhalationibus pu-
 tridis refertus. Disponuntur ad eosdem homines
 biliosi, plethorici, exercitio corporis vel abutentes
 vel destituti; voraces aut fame pressi, potui spiri- P. 58.
 tuoso dediti, vescentes alimentis deprauatis, aut
 victu animali magis, quam vegetabili, habitantes in
 vrbibus, in prouinciis calidis, in locis humidis, ae-
 rem putridum haurientes cet. Putredo, ex his caus-
 sis nata, vel fluida tantum occupat, vel ad solida quo-
 que extenditur: effectus eius vel in parte quadam ex-
 terna,

p. 60.

terna, vel in primis viis, vel in massa sanguinis sese exserunt. Inde primo loco de usu antisepticorum in morbis a putredine in parte externa dicendum est. Haec iterum, vti supra omnis putrefactio in genere in quatuor stadia vel gradus diuiditur, primus seu putredo imminens est, si in corpore, ad eam disposito, inflammatio vel contusio violenta nec resoluitur, nec in suppurationem tendit, sed vlcus efficit, carnibus mollescentibus et suppuratione vel imminuta vel aucta; secundus, seu status putridus est, si, minutis symptomatibus, inflammationis color partis affectae obscurior fit, in superficie vesiculae, sero rubello plenae, eleuantur, suppuratio pus foetidum et tenue praebet, carniū superficies nigrescit, marginesque inflammantur; tertius seu gangraena, si eadem symptomata ingrauescunt, frigus, mollities, insensibilitas partis aegrotae augentur, color liuidus fit et nigricans, cutis vel pustulis sero, rubello vel liuido plenis, obseritur vel indurefcit et occallefcit, vlcus foetidissimum profundius serpit, et margines inflammati in gangraenam abeunt; quartus denique seu sphacelus, si pars affecta vita prorsus priuatur, coloris nigri, foetoris teterrimi, suppuratione ad ossa penetrante, parsque emortua per frustra decedit aut

p. 61.

induratur. Nascitur autem in parte quadam viui corporis putredo, si vel vitiatī succi ad eam deferuntur, vel in ea corrumpuntur, vel vtroque modo simul; inde causa vel generalis est, vel particularis

p. 61.

aut localis vel mixta. Prior locum habet in morbis putridis internis, potissimum si membrum aliquod magis remotum est a centro circulationis aut compressum vel vlceratum, aut si circulatio in eodem impeditur: altera, si humores in parte affecta lentius circulantur aut stagnant; tertia in vtriusque generis casibus simul. Causa autem proxima semper ponenda est in iactura

p. 63.

aeris fixi, quam actio aeris exterioris adiuuat; siue haec
a per-

a peruersitate fluidorum, siue solidorum induc̃ta fuerit. Necessarium autem est, disquirere gradum putredinis, qui partem affectam tenet, quia singuli singula ac diuersa plane inter se auxilia postulant. Sic prior gradus in inflammatione, aquosa, emollientia cet. in stasi humorum extrauasatorum, eorum educationem, in contusione, repercutientia, in vulneribus vel vlceribus, traumatica, balsamica cet. requirit, adhibitis venaesectionibus, euacuantibus aliisque remediis pharmaceuticis ac diaeteticis. Status p. 65. secundus restitutionem aeris fixi per antiseptica externa, proprie dicta, postulat, inprimis decoctum corticis chinae, quae vero internis remediis iuuari debent. Cautè tamen dispiciendum est, ne antisepticiis his prius vtamur, quam vere perspexerimus, p. 69. fluida putredinem contrahere et solidà tonum naturalem perdere, ne fibris, iam tensis, rigiditatem maiorem et fluidis densitatem maiorem comparando, inflammationem intendamus et ad resolutionem ipsamque adeo suppurationem incongruam reddamus. In gradu tertio putredo tantum sistenda est, ne sanas partes tangat, et excitanda inflammatio, qua corruptum separetur, quod escharoticis, vel in grauiori casu scarificationibus, efficitur: quibus tamen itidem interna remedia auxiliari debent. Sphacelus demum eadem remedia desiderat, quae vero cum saepe non sufficiant, in exstirpatione aut amputatione vnicum superest auxilium. Morbi putridi, quorum fomes p. 71. in primis viis haeret, itidem quatuor diuersos gradus offerunt, signis suis inter se diuersos. Causa p. 73. horum morborum in deprauata digestionè consistit, quae vel a nimis longa mora alimentorum in primis viis, vel a deprauata eorum indole vel a corruptione putrida liquorum digerentium proficiscitur, quorum omnium diuersissimae iterum causae esse possunt. Indicationes eo tendere debent, vt impediamus p. 75.

- mus, ne copia materiae putridae in primis viis au-
geatur, aut putredo ipsarum ulterius se extendat;
vt eas ex corpore expellamus, ac denique statum
naturalem partium affectarum restituamus. Prio-
rem implent diaeta seu prudens vsus antisepticorum
diaeteticorum, alteram euacuantia, tertiam antise-
ptica pharmaceutica. In principio morbi ad vom-
tum ciendum saepe potus copiosus sufficit, vbi ta-
men Cl. Auctor aquam frigidam tepidae praefert. In
p. 76. secundo gradu ex vomitoriis saepe ipecacuanha re-
p. 78. media, ex antimonio parata, superat, quia, ob partes
gummosoresinosas, insigni virtute antiseptica pollet:
nocet tamen ob vim adstringentem, vbi materies
abundantior est, deiectionibus aluinis non adeo copio-
sis, solidis irritatis et primis viis ad inflammationem
procliuius; conducit autem solidis laxis, materia
insignem putredinis gradum consequuta, et deie-
ctionibus copiosis. Vbi purgantia indicantur, vege-
tabilia adhibenda sunt vel, ob substantiam gummoso-
resinosam, v. c. fenna, rheum, vel ob qualitatem
facile fermentescentem, dulcem, v. c. cassia, man-
na cet. antiseptica, adiunctis salibus, inprimis nitro
p. 79. et cremore tartari. Euacuatis demum materiis cor-
ruptis, si digestio adhuc languet, febrifugis locus
datur, quae etiam ad euacuationem libere sustinen-
dam cum purgantibus vnire conuenit. Ipsa autem
haec antiseptica, in fine morbi adeo vtilia, sub eius
p. 80. principium peniciosissima sunt. In prouectiore
morbo, seu tertio eius gradu, prius praeparanda est
materia, quam euacuetur; prius praestatur antise-
pticis diaeteticis, demulcentibus ad acrimoniam ob-
tundendam, potu parca, sed repetita crebrius dosi
sumendo et topicis, externe adhibitis, ad inflamma-
tionem praeuertendam aut sedandam; alteri scopo
laxantia antiphlogistica inseruiunt. Roborantia de-
mum eodem modo, vt in secundo gradu, exhiben-
da

da sunt. Quartus gradus, isque periculosissimus, re-
media, vt in quouis ancipiti malo, valentiora postu-
lat, vesicatoria, cardiaca potentissima, potum fri-
gidum cum acidis, vitriolico inprimis, coniunctum,
vsum topicorum, abdomini applicandorum, inprimis
aquae frigidae; ac demum largas doses febrifugorum,
potissimum corticis Peruuiani.

Accedimus ad morbos, a putredine sanguinis pro-
ductos. Hanc in corpore viuo multi negarunt exi-
stere posse: contrarium autem ex FERNELII,
MORTONI, HUXHAMI et PRINGLII obserua-
tionibus patet. Causa iterum vel generalis vel lo-
calis est; prior licet ab omnibus superius adductis
produci possit, originem tamen plerumque debet
materiis putridis, in primis viis collectis, suppressae
perspirationi et contagio. Localis vel ab inflamma-
tione in gangraenam mutata, vel a suppuratione
interna, vel a resorptione puris ex vlceribus quali-
buscumque proficiscitur. Differrunt etiam mor-
borum symptomata inter se pro varietate cum caus-
farum, tum constitutionis corporum. Differentia
autem attentione dignissima constituenda est inter
morbos putridos, a causa generali inductos, acutos
et chronicos, quorum illos putredinem cum materia
seu scorbuticam, hos putredinem sine materia seu
febrilem appellat Cl. Auctor.

In putredine scorbutica sanguinis iterum qua-
tuor gradus differunt pro grauitate et copia sym-
ptomatum, quae a successiua sanguinis et humorum
corruptione pendent. Omnia ergo auxilia eo ten-
dere debent, vt fluidis aequae ac solidis perditus aer
fixus restituatur, quod vegetabilibus omnium optime
praeestatur, cum ad praecauendum, tum ad curandum
scorbutum inprimis iis ipsis, quibus in specie anti-
scorbuticorum nomen est. Corticis Peruuiani vsum
hic iterum in principio morbi noxius est, in fine
quam

quam maxime proficiuus, isque in casibus vrgentibus cum acido vitriolico combinari debet.

p. 103. In putredine febrili, quae iterum, pro incremente sensim symptomatum grauitate, in quatuor gradus diuiditur, sub initium morbi diaeta antiseptica, exercitio moderato et aere pus vincitur. In secundo gradu, vbi morbifica materia auctior iam febrim accendit, coctio eius diluentibus ac corrigentibus praestanda, simulque, quantum fieri potest, ipsa euacuanda est. Potio crebra, licet paruis dosibus, ne ventriculus nimis obruatur, eaque statui et viribus aegri accommodata, primae indicationi respondeat, in primis si mixtura RIVERII ex sale absinthii et succo citri sub ipsa efferuescentia paruis, at repetitis dosibus, adiungatur, cuius vsum iam in morbis putridis primarum viarum Cl. Auctor laudauerat. Euacuationes per colatoria iuuandae sunt, quae natura ipsa monstrat: in omni tamen casu ad eam potissimum viam respiciendum, per quam putredo cum humoribus communicata fuit. Abstinentum plane a venae sectione, nec febrifugis vtendum, nisi iis obseruatis, quae antea monita sunt. In gradu tertio morbi, putredine iam magis aucta, et ipsa iam materia morbifica plus minus expulsa, febre tamen subsistente, ad corrigendam ipsam et tollenda mala inde inducta, viribus sustinendis et excitandis, corrigendis mutationibus, per putredinem in solidis ac fluidis productis, et denique iuuandis euacuationibus materiae morbosae opus est: primum obtinemus cardiacis aromaticis, alexipharmacis, si parum caloris adsit, vel in opposito casu acidis mineralibus, potissimum vitriolico aliisque adstringentibus; secundum antisepticiis febrifugis, maxime cortice Peruuiano; tertium euacuantibus, a natura indicatis, simul tamen adhibitis febrifugis iam laudatis. Si materia exitum quaerit in parte externa, in eo iuuanda; sin
in

in interna quadam decumbat, vesicatoriis cet. extrorsum ducenda est. In summo morbi gradu car- p. 115.
diacis aromaticis potentissimis et alexipharmacis opus
est, vti tinctura corticis Peruuiani cum elixirio vi-
trioli, corticis huius puluere cet. in maioribus dosi-
bus et saepe repetitis, cautissimeque abstinendum
ab omnibus alkalibus volatilibus iisque, quae ad ea
accedunt.

Putredo a caussa locali, seu inflammatoria exi- p. 117.
stet vel a gangraena, vel a resorptione puris. Inde
primo loco de putredine purulenta, antisepticorum-
que in eadem vsu, agitur. Si in parte inflammata p. 119.
suppuratio praecaueri nequit, ad duo momenta re-
spiciendum est, nempe, vt extimescenda inde damna
vel praeuertantur vel tollantur. Ad prius opus est,
vt puri optimam indolem conciliemus, promptum-
que iusto tempore exitum paremus: ad secundum,
vt massa humorum contra infectionem praemunia-
tur, et diathesis purulenta optimis remediis impug-
netur. Pus obtinetur bonum, adhibitis iis antise- p. 120.
pticis, quae caussa et conditio morbi postulant. Exi- p. 121.
tus ei facile paratur in abscessibus externis: in inter-
nis contra videndum est, an eidem via pandi possit
per organa excretoria, sedi abscessus proxima, quare
primo abundante potu aquae mellitae, infusorum
vulnerariorum cet. ac deinde, pro differentia sedis
morbi bechicis, incidentibus, diureticis, purganti-
bus, ipsisque adeo vomitoriis opus est. Difficilior p. 122.
casus est, si nec his auxiliis sedem abscessus tangere
possumus: interdum tamen metastasis spontanea fit
ad loca exteriora; interdum pus siccatur et induratur,
quod interdum aegrum saluum reddere potest; inter-
dum illud in circulum humorum regressum insolitis
viis excernitur; interdum in cauitate quadam aut vi-
ceris cuiusdam superficie colligitur: quae mutationes
medelam sibi conuenientem efflagitant. Ad expel- p. 125.
lendum

- lendum pus resorptum euacuantibus (et remediis externis irritantibus cet. vtendum est: ad massam humorum ab acrimonia eius defendendam, auxiliis pro
- p. 126. indicatione diuersa diuersis, demulcentibus, veneno contrariis, diaeteticis antisepticis, cet. Motu autem intestino diutius durante, sensim humores perdunt aerem fixum, contrahuntque acrimoniam putridam, celerrime cum lymphâ nutriente ipsisque solidis communendam: ad impugnandam ergo hanc diathesin purulentam eo respiciendum est, vt corruptum extrorsum versus ducatur, deprauatio putrida retardetur, et quicquid humorum putredine mutatum fuerit, corrigatur. Primum saepius impossibile est, atque adeo necessarium, vt euacuationes colliquatiuae saepius coerceantur, quam promoueantur. Alterum diaeta vegetabili ex antisepticis diaeteticis, adiuncto prudente vsu antisepticorum pharmaceuticorum, exercitio conueniente, aere liberiore cet. perficitur. Lactis vsus hoc in casu summam
- p. 128. cautionem requirit: nocet quippe, si vel materiae acidae aut putridae in primis viis haerent, quae tamen nonnunquam corrigi et euacuari se sinunt, vel si humores iam putridi sunt, quia tunc nimis facile corrumpitur, neque satis aeris fixi ad corrigendum istum statum putridum continet: neque ergo vtile est, nisi in principio phthiseos purulentae. Correctio humorum putridorum difficillimi negotii res est, cum colliquatio purulenta humorum diuersae omnino inter se indolis sit, neque tamen diuersitates haec satis cognosci et determinari queant. Exempla curationum nihil certi definiunt, cum eadem remedia hunc aegrum sanauerint, illum praecipitauerint. Quaecumque tamen in ardua hac re poni possunt, ad haec redeunt, vt omnia irritantia, acria, resolu-
- p. 131. ventia, v. c. sales alkalini, medii cet. item aromatica, saltem nisi atonia et relaxatio partium manifesta sint

sint, euitentur; vt, non nisi summa cum cautione, adhibeantur amara nimis resinosa, iisque praestantur vegetabilia ea, quae minorem resinae partem fouent, subiuncto vsu demulcentium vegetabilium animaliumque; vt pari cautione vtamur balsamicis, iisque tantum in dosi minima et demulcentium connubio mitioribus redditis; tandemque vt instinctus ipsius aegri rationem habeamus, et tentamina, ex analogia petita, instituamus, nisi contraindiantia obstant.

Putredo gangraenosa, quatenus ex inflammatio-
ne partis externae enascitur, iam superius a Cl. Auctore pertractata est: nunc ergo tantum de gangraena interna, et de ea differit, quae variolis superuenit, quippe a causa vniuersali inflammatoria producta, et cum febre eiusdem indolis coniuncta. Licet omnis gangraena interna, ac potissimum sicca, gravissimus morbus sit, non tamen plane de bono euentu curationis dubitandum est: haec autem eo dirigatur, vt vires vitae sustineantur ac refocillentur, progressus gangraenae ac putredinis impediatur, corruptumque corrigatur, ac denique, quod corrigi nequit, euacuetur. Prius cardiaca, aromatica et
alexipharmaca, alterum antiseptica adstringentia et febrifuga, cum diaeteticis coniuncta, inprimis acidum vitriolicum et parata ex eo remedia, myrrha, camphora, Peruvianus cortex praestant: tertium bechica incidentia, diaphoretica, diuretica, vulneraria, laxantia leniora, pro gangraenae diuersa sede. Topi-
cis etiam nonnunquam vsus omnis denegari nequit, qui in variolis, praesertim gangraenosis, summe necessarius interdumprehenditur.

Cl. BORDENAVE in pertractando hoc argu-
mento eundem ordinem summorum capitum, vti ab academia propositus fuerat, seruauit, licet dispositio vltior ab ea, quam Cl. DE BOISSIER se-

- quutus est, omnino recedat. Ad determinandam notionem generalem remedium antisepticorum itidem primo definit, quid sit putredo, quam docet esse eum statum, in quo partes integrantes corporum, decompositae per separationem aut dissolutionem particularum elementarium, ex quibus constabant, ad dispositionem differentem transeunt, novaeque coniunctiones formant. Hoc, nisi corpus desiccatione vel igne violento destruat, fieri non potest, nisi praegressa fermentatione, seu motu intestino, quo aer, in corporibus latens, euoluitur, hocque vinculo partium sublato, hae ipsae a se invicem secedunt, putredinemque inchoantem ostendunt. Haec autem aeris interni evolutio non post mortem de-
- p. 146. mum tantum contingit, sed in corpore viuo etiam, cum a fermentatione alimentorum in primis viis, tum in morbis nonnullis, quamprimum aequilibrium inter aerem atmosphaericum et illum, qui corporibus inest, sublato fuerit. Causae igitur, quarum immediatus effectus in mutanda textura partium et ex
- p. 153. iis separando aere fixo consistit, vel internae sunt, vel externae. Internae vel in solidis, vel fluidis haerent: ad priores pertinent actio solidorum vel nimis viuida, vel languens, adeoque horum status vel nimis strictus, vel nimis laxus, aut tono prorsus destitutus; ad posteriores vel mutationes iam dictis solidorum vitiis ratione circularis motus productae, vel alkali spontaneum, vel ab hoc distinguenda acrimonia caustica humorum in hac illaue parte tantum effectus suos exferens, vel varia cacochymiae genera v. c. venerea, scrophulosa, scorbutica, cancrofa,
- p. 158. pro sua diuersitate plus minus vehementia. Ad causas externas referri debent aer, putridis particulis foetus, item humiditate, siccitate, calore, frigore excedens, maxime si alterutrius qualitatis excessus concurrant; cibi ac potus deprauata indoles; motus excessiuus;

cessius; actio corporum exterius laedentium, contundentium, vulnerantium, siue inde partes nimium stringantur, siue expandantur, adeoque tonum prorsus perdant; effectus morsus animalium, siue per se, siue coniuncta simul vi veneni infusi; caustica actualia et potentialia, itemque peruersa applicatio topicorum ad morbos externarum partium; denique ea, quae veteres septica dixerunt, quae vel parti applicatae putredinem conciliant, qualia sunt caustica ex regno minerali, vel humoribus indeque toti corpori, vt cicuta aquatica, aconitum, elaeus secalinus, atque ob solam nimiam copiam opium. Alia autem putredo est in partibus solidis, alia in p. 166. fluidis; in prioribus eadem vel humida, vel sicca, diuersa tamen in partibus durioribus et mollioribus. In humoribus alia est sanguinis, cuius iterum variae pro constitutione ipsius, aut solidorum, aut diuersitate causarum, species sunt; alia humorum inde secretorum, v. c. lymphae, bilis, vrinae, lactis, pinguedinis; alia etiam pro diuersitate aetatis cet. Causae etiam putredinis ipsam diuersissimam red. P. 173. dunt; vitium humorum serophulosum aliam induit, quam venereum, scorbuticum cet. Neque putre. P. 175. do, a substantiis septicis inducta, plane vnus eiusdemque est indolis; alia enim escharam mollem, alia solidam formant, alia fibris musculosis robur conciliant. Pari modo venena considerata sunt, quorum alia coagulant, alia rarefaciunt fluida, alia partes solidas irritant et inflammant, Accidentales denique causae, calor vel humiditas, frigus, clima cet. itidem diuersas putredinis species inducunt. Gra. P. 177. dus etiam varii eiusdem distinguendi sunt; nempe humoralis, incipiens et mediocris, distingui debet a determinata seu perfecta; ea, quae solida occupat, vel in iis tantum distensionem et inertiam efficit, qui status mortificatio dicitur, a gangraena et putredine discernen.

discernendus, et, sublato infarctu humorum, restituta-
que per stimulantia actione solidorum, tollitur; vel
solida vita priuat, et primo gangraenam, postmo-
dum sphacelum inducit. Primus ergo gradus pu-
tredinis in genere dicendus erit, cum pars intume-
scit, aerque liberare se tantum annititur; secundus,
cum is ipse superat resistantiam partium, extricatur,
ipsarumque nexum soluit; tertius denique, cum
principia reliqua a se inuicem discedunt, et resolutio
vniuersalis fit.

- P. 179.** Antisepticorum remediorum definitio eadem
est, quam superius ex scripto Cl. DE BOISSIER
adduximus. Cum autem euolutio aeris fixi ex parti-
bus corporis animalis per structuram ipsarum impe-
diatur, ad hunc finem impetrandum opus est, vt
solidis iustum robur construamus: vnde adstringen-
tium cet. vsus patet. Opus praeterea est, vt aer
amissus restituatur, aut vltior eiusdem egressus
praeuertatur; prius sit nouorum succorum acces-
sione per nutrimenta vegetabilia in genere, alterum
applicatis exterius remediis conuenientibus. Anti-
septica praeterea putredinem sistere debent et partes
iam putridas corrigere, quod vltimum in solidis
quidem impossibile est, in fluidis autem, corrigenti-
bus, praestatur. Huc referuntur acida, in quorum
tamen vsu videndum est, ne solidis vis inferatur;
alkalia, quorum in corpore viuo vsus internus non-
nisi rarissimus est, exterior nonnunquam vt stimu-
lantium et causticorum; miscelae fermentantes. Re-
p. 182. media vero per se non absolute antiseptica dicenda,
indolem hanc acquirunt, cum variis causis putredi-
nis opponuntur: sic solida nimis rigida relaxantia,
nimis laxa roborantia, fluida incrassata et infarcta in
parte quadam deriuantia et diluentia postulant. Caco-
chymiae variae remedia specifica exigunt, v. c. ve-
p. 184. nereae mercurialia, scrophulosa resoluentia, scorbu-
tica

tica antiscorbutica, cancrofa incrassantia, stupefacientia cet. Aeris et alimentorum potulentorumque vitia remediis iis oppositis indigent. Vis, exterius corpori illata, vario, quem edidit, effectu vel discutientia et resoluentia, vel emollientia cet. requirit. Venena antidotis opus habent, quae tamen nondum omnino clare satis patent, cum plurimum ex illis indoles declarari nequeat. Opus etiam est iis remediis, quae putredinem actualem et localem sistunt; nunc euacuando partem humorum stagnantium, nunc exsiccando cet. Differre etiam possunt effectus antisepticorum pro ratione formae, sub qua applicantur, tempestatum cet.

Ex his omnibus, inter se collatis, remedia antiseptica in sex classes rediguntur, nempe *relaxantium*, *stimulantium*, *adstringentium*, *balsamicorum*, *exsiccantium* et *causticorum*. *Relaxantia* indicantur, cum tensio aut nimis fortis actio solidorum et infarctus vasorum, accelerata circulatione et stasi humorum eorumque adeo decompositione inducta, putredinem efficiunt. Haec remedia ex *emollientium* classe depromi debent, si sola tensio solidorum tollenda stagnantibusque humoribus spissis meabilitas restituenda est; eaque adhibenda sunt sub forma lotionum, fomentationum et cataplasmatum, iungendaque iis olea recentia, nisi inflammatio viuidior usum eorum prohibeat. Vbi dolores vrgent, in usum trahi oportet *anodyna* et sedantia, minime vero narcotica. Iisdem etiam remediis interne vtendum est in potionibus. Si abundantia humorum tensionem solidorum effecerit, eorumque actionem intenderit, venae sectione ea imminuenda est. Infarctus grauior vasorum incisionem postulat, praesertim si irritatio, a corpore peregrino facta, eum produxerit: idem etiam suo modo de irritatione, per fracturam, compressionem, ligaturam vasorum producta, valet, vbi causae

p. 193. eius, quantum fieri poterit, remouenda sunt. *Stimulantia* pro maiore vel minore gradu laxitatis aut inertiae solidorum varia sunt: si quid adhuc in iis roboris superest, *resoluentia* et leni tantum stimulo praedita conducunt, v. c. melilotus, sambucus, chamaemelum, farinae semen leguminosorum cet. ex quibus plura etiam interne in potionibus adhiberi possunt; sin actio solidorum magis suppressa est, fibraque laxa, istis *tonica et roborantia*, v. c. vinum, spirituosum, plantae adstringentes, vulnerariae, addenda sunt; sin autem atonia summum gradum attigit, vehementioribus opus est, nimirum plantis aromaticis ex vino coctis, vel spirituofo liquore et sale penetrante addito fortioribus redditis. Haec vero nocent, ubi cum atonia solidorum stagnatio insignior vel coagulum fluidorum coniuncta fuerint; tunc potius *amaris discutientibus*, addito itidem sale marino vel ammoniaco vtendum. Ad *stimulantia* etiam pertinent *sapones* naturales atque artificiales, quorum effectui is similis censendus est, qui ab applicato exterius alkali fixo vel volatili proficiscitur; imo quibusdam in casibus ad tollendam spissitudinem humorum his vsus internus etiam adscribi poterit. Iam vsus externus *aquarum* quarundam *thermalium*, et internus quorundam *euacuantium*, ad normam indicationis assumtorum, eidem

p. 195. classi adscribi merentur. Efficacius agunt *adstringentia*, quorum effectus non in solidis tantum subsistit, sed ad fluida etiam pertingit: ingens est in regno, inprimis vegetabili, eorum copia, quorum virtus augetur, additis vinis adstringentibus, aceto vel liquoribus spirituosiss; neque aqua calcis viuae hic praetermittenda. Ad hanc classem referri etiam debent *absorbentia*, nempe vegetabilium pulueres sicci, aut praeparata ex iis remedia resinosa; gummi arabicum et tragacanthae in puluerem redacta; calx
viua

viua calcinata et in puluerem redacta. Absorbentia testacea, et quae mere terrea sunt, v. c. terrae calcareae, nonnisi in calcem redactae, virtutem hanc acquirunt. Promptissime agunt, quibus cum absorbente vis adstringens coniuncta inest, v. c. gallae, cortex Peruvianus, vitriolum aliaeque substantiae salinometallicae. *Acida* alkali putridum saturant, ideoque putredinis progressum impediunt; vegetabilia, ad externos vsus debiliora, tutius intus assumuntur; exterius autem adhibenda sunt concentratiora mineralia, inprimis vitriolicum eique analoga. *Balsamica* partes, putredine tactas, conseruant, de-p. 200. compositionem earum impediunt, ipsasque restitunt, dum depurationi humorum resistunt, aerem exteriorem arcent, et quo minus internus euolvatur, impediunt, solidaque ipsa nonnihil ad viuidiorem actionem incitant. Huc spectant *olea essentialia*, sal volatile succini, camphora; acriora tamen, vti oleum caryophyllorum, cautissime vsurpanda sunt, ne nimis irritent; *resinae*, v. c. terebinthina, pix, aliaeque balsama naturalia; gummiresinae, quarum tamen effectus debilior est, quaeque in puluere vt absorbentia, solutae vero, balsamica vi agunt; *olea et spiritus destillatione parata*, inprimis si cum substantiis penetrantibus, v. c. sale marino vel ammoniaco, camphora cet. combinantur; *vegetabilium partes resinogummosae*, inprimis cortex Peruvianus, et vltima quidem classis efficacissi-p. 204. ma omnium balsamicorum remedia sistit. Vbi autem putridi humores infarcti sunt in parte affecta, eaque dissolutioni proxima metum facit contagii, cum tota humorum massa communicandi, *exsiccantibus*, at iis potentissimis, opus est, nempe applicationi ferri candentis aut olei, inprimis terebinthinae feruentis; vltimum autem remedium nunc plane fere exoleuit, cum actionem nonnunquam profundius exseruerit, quam proficuum erat. Ad haec effectus

p. 207. *causticorum* accedit, quibus tamen promiscue utendum non est: alia enim solida crispant ac tendunt, fluida coagulant, escharamque siccam formant, ut acida mineralia, iisque analogae, quae promptius in partes carnosas, quam in cutim agunt, quod etiam de iis compositis cum substantiis metallicis valet, si a solo mercurio sublimato recesseris, qui escharam in cute format; tutius plerumque in forma sicca adhibentur, quam in liquida, ubi partes tantum, iis tangendae, non autem remedia, in partibus affectis diu relinquenda sunt; ad haec praeparata etiam coniunctio substantiae mineralis cum acido vegetabili, uti in unguento aegyptiaco, pertinet; omnium tamen horum remediorum effectus gradu inter se diversi sunt. Alia e contrario ratio est causticorum, quae ex alkalibus parantur, uti lapidis caustici et olei tartari per deliquium; eschara enim inde indurata, licet nonnunquam in principio solida sit, tamen postea mollescit et resolvitur, carnosae etiam partes, iis tractatae, colliquescent, ut adeo caustica acidae indolis putredini magis resistent, alkalinae vero eandem potius augeant, quam tollant.

p. 210. Vsum horum remediorum in morbis in parte quarta copiosius exponit Cl. Auctor, cuius tamen ampliore recensione supersedere nos posse putauimus, cum praecipua ex tractationibus superioribus momenta hic tantum repetendo prolixius explicentur et,

p. 241. adiunctis observationibus practicis, illustrentur. In fine denique aeris et alimentorum usus antisepticus declaratur, tandemque antisepticorum specificorum ad hanc illamue putredinis speciem v. c. veneream, scorbuticam, scrophulosam, adhibendorum, amputationisque partis, putredine destructae, si illa non prouenerit a causa interna, aut in parte affecta sedem tantum fixerit, mentio iniicitur.

Cl. GODART tractationi suae experimentorum p. 247.
 quorundam, a se institutorum, recensionem praemisit, p. 251.
 ex quibus patet, salinas substantias, in minori quan-
 titate partibus animalibus additas, in principio qui-
 dem nonnihil resistere, quum autem id non amplius
 possint, participare de motu intestino, adeoque at-
 tenuando partes minimas putredinem augere; odo- p. 253.
 rem putridum pro varietate circumstantiarum sae- p. 262.
 pissime variare, evanescere ac redire rursus; sales a
 putredine, sub vario eius augmento diuersos, evolui,
 primum acidos, postmodum, putredine iam obfirma-
 ta, alkalinos, ac eos in vltimo demum stadio ita a
 phlogisto ligatos, vt sui praesentiam, nec tingendo
 liquores coeruleos vegetabiles, nec efferuescendo
 cum acidis, demonstrent; humores animales putre-
 scentes sedimentum deicere, non iterum soluen- p. 267.
 dum, etsi color accedat, qui id in sedimento vrinae
 praestat, quare illud a putredine productum pro
 parte terrea, salinis sulphureisque particulis orbata,
 habendum est; liberioris aeris accessum aut permis- p. 269.
 sum aut denegatum vel promouere vel retardare pu- p. 276.
 tredinem; frigus itidem putredinis effectus arcere; p. 277.
 calorem contra, pro variis eius gradibus, eandem
 plus minusue accelerare.

Partes constitutivae corporum sunt aer, terra, p. 284.
 phlogiston, sal et aqua; atque aer quidem vincu-
 lum, reliquarum sistit, ignis autem motum ipsis et
 vitam quasi conciliat. Ex phaenomenis ergo, quae p. 287.
 in putredine conspiciamus, facile ad causas eius re-
 gredi poterimus, quae in calore miti, aere incluso,
 humido vel stagnante, stagnatione materiarum cor- p. 290.
 ruptarum, fermento putrido, ac defectu compressio-
 nis positae sunt, quarum vltius examen Cl. Auctor
 instituit. Septicam indolem aeris inclusi cum maio- p. 297.
 re eiusdem electricitatis gradu coniunctam esse, ex-
 perimen-

- p. 304. perimenta eundem docuerunt. Antiseptica ergo ea sunt remedia, quae calorem, putredinem inducentem, temperant, corpora ab eius impressione defendunt, et mutationem seu separationem elementorum a se inuicem impediunt. Priori intentioni omnia ea satisfaciunt, quae vel in corpus ingesta vel eidem exterius applicata, calorem aut coercent, aut tollunt; quumque is solus fere non producat putredinem, nisi humiditas vel extrinsecus vel ex corporibus ipsis accedat, huc quoque pertinent ea, quae humiditatem septicam vel absorbent, vel dissipant.
- p. 310. Corporum autem particulae constitutivae ab impressionibus destructoriis causae agentis putredinis defenduntur remediis iis, quae solida roborant, fibrarumque mutuam, inter se, cohaesionem augent, aerisque evolutioni se opponunt, ex quo fundamento etiam balsamationis artificium diiudicandum est. Ex actione igitur remediorum antisepticorum diuisionis eorum fundamentum peti oportet; sunt ergo vel
- p. 319. *refrigerantia*, vel *ventilantia*, vel *roborantia*. *Refrigerantia* et frictionem nimiam, ut causam mechanicam, et agitationem intestinam, ut causam chemicam caloris, tollunt, dum partim in mechanismum resolutionis ipsorum agunt, partim aequilibrium inter solida et fluida restituunt: diuiduntur rursus in
- p. 320. *antipyretica*, *temperantia* et *relaxantia*. Ad priora pertinent potus frigidi, vel salium adaequata copia efficaciores redditi; ad secunda aquosa, farinacea, acida, nitrosa; ad tertia ea, quae frictiones circulationis, aut ab elasticitate aut ab irritabilitate vasorum auctas, imminuunt. Prius vel deplendo vasa per venesectiones ac resoluentia, vel contextum eorum macerando per aquosa, emollientia et saponacea, obtinetur; alterum anodynis, quibus nimia sensibilitas fibrarum debilitatur.
- p. 325. *Ventilantia* vel corpora a putridis miasmatibus defendunt, vel ab iisdem, si iam

iam infecta fuerint, liberant; priora ad *prophylaxin* redeunt cum ratione loci, in quo viuimus, tum corporis ipsius; huc ergo spectant aeris puritas, diaeta, remedia prophylactica, emetica, purgantia, et nonnunquam cardiaca, imo suo etiam loco venaesectio, incisio abscessuum, scarificationes in partibus, gangraena affectis, atque auxilia alia chirurgica: posteriora continent remedia *euacuantia* per primas vias, per vrinam ac diaphoresin, inter quae tamen varia **P. 330.** genera medicamentorum referuntur, quae hic non quaesiuisses, v. c. inter diuretica herbae amarae et sub adstringentes, nec non semina carminatiua cet. Antiseptica *roborantia* causas separationis elemen- **P. 332.** torum seu partium constitutiuarum a se inuicem tollunt, vnionemque ipsarum restituant cum in solidis, tum in fluidis: diuiduntur in *acerba*, *adstringentia*, *amara* et *aromatica*, quorum differentiam proportio partium acidarum vel salinarum ad terreas cet. constituit. Amara tamen magis roborant, quam acida austera, quia altius penetrant; insignis etiam vis inest iis, quae aromatica indole gaudent, quorsum et remedia balsamica ab Auctore nostro referuntur.

Ad definiendum autem remediorum antiseptico- **P. 339.** rum vsum in morbis prius opus est cognitione variorum generum, graduum et causarum putredinis. Est itaque ea vel vniuersalis vel particularis: illa rursus vel cum materia, vel sine materia, quarum prior vel ab humoribus nostris, a miasmate putrido infectis, pendet, eaque maxime contagiosa est, vel a motu chemico seu intestino, solidas aequae ac fluidas partes mutante, quae vel multo minus praecedenti, vel prorsus non contagiosa est. Ad priorem speciem pertinent febres putridae, malignae, biliosae, dysenteria, pestis; ad posteriorem cachexia, scorbutus, marasmus senilis, virium defectus, fluxus colliquatiui in hecticis. Putredo vniuersalis sine materia

materia, a sola actione solidorum, absque materia peregrina humoribus admista, producitur, ut in febribus inflammatoriis corporis antea sani. Putredo particularis vnum tantum membrum tangens vel simplex est, vel complicata; prior tantum fluida corrumpit, ut sanguinem extra vasa missum, aquas hydropicorum, sentinam primarum viarum, saniem putridam ulcerum et fistularum; altera simul solida afficit, estque vel in cute tantum et cellulari contextu, quae gangraenam; vel in musculis, tendinibus, nervis, ligamentis cet. vita partis prorsus sub-

p. 340. lata, quae sphacelum sistit. Gradus putredinis tres distingui oportet: in primo vinculum partium constitutiuarum solutum est, sed motus earum intestinus vel nondum eas in exhalationes foetidas et contagiosas resoluit, ut in principio gangraenae humidae, vel calor partis affectae eas dissipat, antequam evolutionem, ad hos effectus producendos requisitam, subire possint, ut in gangraena sicca; in secundo partes istae adeo mutantur, ut eo tantum statu euoluantur, quo infectae redduntur, licet nondum adeo exaltentur, ut vere contagiosam indolem demonstrent, quo vulnera gangraenosa, ichorosae excretiones ex ulceribus, sudores colliquatiui, puris collectio in membranis bronchiorum et pituitaria, exhalationes putridae animales cet. pertinent; in tertio demum particulae putridae adeo subtiles redduntur, ut, quamvis odore fere non percipiantur, tamen per minima vasorum orificia nervorumque filamenta in corpus nostrum agere ipsumque contagio afficere possint. Causae generales putredinis sub initium huius tractationis iam commemoratae fuerunt, particulares autem in phlogosi, extrauasatione et acrimonia consistunt. Phlogistica putredo vel ab inflammatione et suppuratione, vel frigoris acrioris actione proficiscitur: ea vero, quae acrimoniae originem

p. 343.

ginem praebet, pro variis eiusdem generibus, cachectica nimirum, scorbutica, cancrofa, scabiofa, venerea, pestilentiali et venenofa differt, quarum fingula alios effectus, ab effectibus reliquarum diuerfos, producit.

Quod ergo curationem morborum ipforum attinet, prima classis remediorum antifepticorum, refrigerantia complexa, locum habet, vbi corpus ob p. 352. cauffas mechanicas, auctam nempe circulationem, in putredinis periculum incurrit. Inflammatio autem, et potiffimum quidem vera, vel inducitur a maiori febris impetu, qui canalibus impulsum ma- p. 355. iorem adfert, quam eorum cohaefio ferre potest, vel a rigiditate fibrarum, vel a compressis vasis, ftagnantibusque inde humoribus, qui cum motui spontaneo subiiciuntur, tum vafa ipfa erodunt. Febris maior impetus, aut a fanguine nimis abundante ac in inflammationem prono, aut a neruorum nimia mobilitate et fenfilitate inducitur, quae differentiae cum ex fymptomatibus morbi, tum ex fignis anamnefticis cognoscendae sunt: prior venaefectiones non folum ad deplendam maffam humorum fed etiam, ad derivationem ac reuulfionem eorum praeftrandam, requirit, quibus vfus antifepticorum antipyreticorum et p. 360. temperantium iungendus eft, at is pro varietate circumftantiarum varius, vt v. c. in aluo obftipata cremor tartari, in propenfione ad fudores acetum vini, rob fambuci, in iuuanda diurefi nitrum eiufque ac falis marini fpiritus, in aluo iufto laxiori ac humoribus multum refolutis adftingentia vegetabilia ac mineralia adhibeantur. Rigiditas fibrarum vel a conftitutione corporis ipfius, vel a cauffa peregrina, imprimis frigore pendet: his venaefectiones accom- p. 361. modandae sunt, et remediis iam adductis relaxantia vel iungenda, vel omnino praeferenda; frigoris autem effectus alio prorfus modo tractari debent, ne emollien-

- emollientibus applicatis, partium cohaesio et conne-
 p. 363. xio vno impetu protinus tollatur. Nimia sensibilitas
 systematis nervosi, praemissis venaesectionibus, et re-
 frigerantibus anodynorum internam aequam, ac ex-
 teriorem usum postulat. Compressio exterior facile
 cognoscitur, et, causa eius sublata, cedit; difficilior
 autem res est in causis eius internis. Venis ilia-
 cis a flatibus intestinorum vel infimi ventris com-
 pressis, distinguere oportet, num hi cum materia qua-
 p. 366. dam putrida coniuncti sint, an soli existant, et num
 in hoc casu aer tantum volumine et rarefactione, an
 compressione agat, quam per peritoneum muscu-
 losque abdominales patitur: hinc in priori casu pur-
 gantia et clysmata, in secundo clysmata roborantia,
 medicamenta tonica, frictiones et epithemata frigi-
 da, abdomini applicanda et emplastri aromatici usu
 iuuanda; in tertio e contrario emollientia, attenuan-
 tia et narcotica adhibere convenit; tristior autem
 casus est, neque ullius medellae, si compressio a
 scirrhus vel abscessu interno profecta fuerit.
- p. 367. Sicut antiseptica refrigerantia putredini, sine ma-
 teria, opponuntur, sic ventilantia eidem, cum mate-
 ria. Divisiones eorum superius iam adduximus:
 p. 371. nunc Cl. Auctor eadem prolixius considerat. Ve-
 naesectionis duplex usus est, alter, ut aequilibrium
 inter solida et fluida restituat, adeoque secretiones
 omnes moderando etiam transpirationem sustineat,
 cuius ope, quicquid contagii ingressum fuerit, ex
 corpore rursus expellatur; alter, ut, in coniuncta cum
 putredine inflammatione, huius impetus minuatur,
 actioque remediorum alterantium et euacuantium
 facilitetur. Vomitoria adversus virorum Cll. TIS-
 p. 373. SOT et DE HAEN obiectiones defendit et quam
 p. 381. maxime commendat. Inter remedia diaphoretica,
 quae corpus, iam putridis particulis infectum, ab iis-
 dem liberant, cum aeger agrypnia, vel dolore ven-
 triculi

tricoli, vel diarrhoea serosa, vna cum sudore critico praesente, affligitur, opiata v. c. theriaca, diascordium, oruietanum, praestantissima auxilia sunt. Reliqua auxilia ad constitutionem aegroti cautissime accommodari debent, et lex naturae sedulo ante oculos ponenda est, ne per colatorium amplum excernamus, quae per angustius exire poterant, adeoque in febribus pestilentialibus, cum materia putrida satis attenuata est; crisin fieri per sudores; in morbis suppuratoriis, materia crassiore, quam quae per cutim exire possit, per diuresin; sique materia peccans viscidae indolis fuerit, per deiectiones aluinas.

In antisepticiis roborantibus acerba adhiberi debent, cum febris, a miasmate putrido, in massa sanguinis disperso, inducta, cum siccitate et calore insigni ac virium debilitate coniuncta, adeoque roborantibus, quae tamen non calefaciant, opus est; qualia sunt fructus austeri, acida mineralia: in dysenteriis tamen, a resolutione sanguinis productis, cum in inflammatoriis ingens fructuum horaeorum vsus sit, praestant fructus ii, adstringentis quidem indolis, ac perfectae maturitatis, vt mespili, cydonia cet. Cum putredo humorum a resorptione ex abscessu pendet, alumen reliquis palmam praeripit, cuius grana sex, quatuor de die vicibus in forma pilulari, aegroto, phthisi pulmonali laboranti, per tres menses exhibita, qui cuius dosi vasculum decocti corticis salicis superbibebat, et saepius de die vapores suffimigiorum pulmonibus hauriebat, eum perfecte restituerunt. Vbi obstructio viscerum produxit putredinem, pauca febre praesente, acerbis tonicis ideoque aperientibus vtendum; inde sal martis adeo egregii vsus est

in cachexia similibusque morbis. Putredo scorbutica efficacissime decocto radicis lapathi vincitur. Adstringentia necessaria sunt, si ob solidorum elatorem, prorsus sublatum, fluida deprauantur: chinae

cortex in febre, inde oriunda duplicata, reliquis omni-
 p. 391. bus praestat. Amara vel salina sunt, vel terrea: priori-
 bus opus est, cum pituitosa fluidorum indoles obstru-
 ctionibus viscerum ortum praebet, et inde collecti et
 stagnantes humores putredinem contrahunt: unde
 usus salium mediorum, potissimum ex regno minerali
 depromptorum, in febribus intermittentibus et mesen-
 tericis patet. Amara autem terrea potissimum in feбри-
 bus malignis locum habent, cum fluidis consistentia de-
 bita reddenda, solidorum elasticitas conseruanda ac
 restituenda ipsique neruorum actioni succurrendum
 p. 393. est, quibus omnibus indicationibus optime cortex
 Peruvianus satisfacit, cui tamen, vbi neruosum
 potissimum systema afficitur, salium volatiliū cam-
 phoraeque inprimis usus praemittendus, in lan-
 guore circulationis serpentaria Virginiana vel con-
 trayerua, et in vermium primarum viarum suspi-
 cione cina vel santonicum iungenda sunt. Reliqua
 aromatica in putredine humorum, ab inertia vel lan-
 guore circulationis inducta, requiruntur. Quatenam
 p. 394. remedia roborantia, cum externa, tum interna, pu-
 tredo particularis postulat, ex iis, quae iam de ge-
 nerali dicta sunt, facile colligi potest.

III.

Essais sur différens points de physiologie, de pathologie et de thérapeutique, par Mr. FABRE Maître en Chirurgie, Prévôt du Collège et Conseiller du Comité de l'Académie Royale de Chirurgie. à Paris, chez P. Fr. Didot le jeune, 1770. Alph. 1. pl. 4. cum dedicatione.

h. e.

Exercitationes de variis physiologiae, pathologiae et therapiae capitibus. Auctore Cl. FABRE.

Cl. FABRE, quem orbis medicus vel ex tractatu de morbis venereis nouit, nouum eruditionis documentum exhibet hoc libro, quo, in sedecim diuiso capita, sensibilitatis, irritabilitatis, cerebri et nervorum functionis humorumque in vasis capillaribus et tela cellulosa, motus naturam ea ratione indagat, vt inde inflammationis theoriam, aliaque chirurgicae pariter atque clinicae praxeos capita illustret atque explicet.

Primo capite sensibilitatem partium, in quibus neque culter neque lens nervos detegit, quasque Ill. HALLERUS, per experimenta sensu destitutas vult, vt sunt tendines, dura mater, periosteum etc. per ea phaenomena, quae post laesionem illarum consequuntur, euincit. Harum enim partium nervos in sano statu nimis esse compressos et involutos, quam quod sentire queant; aptos autem fieri ad percipiendum, vbi laesae partes inflammantur, vel alio morbo tanguntur; habereque in vniuersum quamdam relationem ad diuersos stimulos, ita, vt neque semper, neque a quouis moueantur. Prouocat ad tendinum vulneratorum inflammationem, dolores et

Rr 2

grauia

grauia symptomata, quae, si, vt HALLERUS contendit, a nerui tantum vicini laesione orirentur, statim proditura essent. Excrefcentiae quoque fungosae, in eiusmodi partibus natae, quum vehementer doleant, irritatae, neruorum praesentiam confirmant.

p. 17. Secundo capite ostendit irritabilitatem, in eo, quod etiam, sublato cum cerebro commercio, aliquantisper supersit, a sensibilitate diuersam, a communi tamen pendere principio, nimirum non a glutine, sed a succi medullaris neruorum influxu in intimam partium fabricam.

p. 30. Hunc influxum, capite tertio, de cerebri et neruorum functione exponens, promoueri asserit per reciprocantem impulsu cerebri pulmonum motu respondentem, quem a Cl. SCHLICHTING obseruatum, per HALLERI tentamina confirmatum et a sanguine, tempore expirationis, non commode in cor influente, profectum, non solum detecta duram matre, verum etiam in integro et sano corpore semper, immo et in fetu non respirante adesse, docet, ubi leges circulationis peculiare stabilitae eandem resistantiam venis iugularibus obiciunt, quam ponit pulmo expirans hominis nati. Mutuus igitur consensus inter cor, pulmones atque cerebrum, eorumque functiones; neruique vigentes semper sunt pleni, inque tensione versantur, non qualis chordarum est, sed quae ex plenitudine prouenit. Ceterum Cl. LECAT hypothesein de spirituum animalium natura et vi motrice expansiua, nec non fabrica fibrae muscularis caua et cellulari examinat et reiiicit.

p. 50. Capite quarto irritabilitatem non ad solam fibram muscularem, sed ad omnes corporis partes pertinere defendit. Etsi enim non, vt illa, accurtantur ab irritatione, ob alium fibrarum decursum, tendi ta-

men

men observantur. Sic tenduntur membranae a stimulis; cutis frigore contrahitur; tela cellulosa oedemata dissipat, humoresque suos vrget; sperma, lac, salivae, lacrymae non compressione, sed irritatione proliciuntur. P. 60.

Capite quinto proponitur irritabilitas, seu principium actionum et motuum corporis. Duae illae causae, quibus excitatur, animus nimirum et stimuli materiales, distinctae quidem sunt, etiam quoad organa, nonnunquam tamen promiscue in omnes machinae motus efficaces sunt. Musculus v. c. voluntati parens, dissecto nervo, ad externam adhuc irritationem movetur, et ventriculi aliorumque viscerum actio, voluntati non subiecta, ab animi commotionibus tamen variatur. Videtur autem irritabilitas, eodem modo, ut sensibilitas, esse proprietatem relativam ad diuersos stimulos, quorum vno excitetur, non aequae aliis, et uti Cl. BORDEU secretionum mechanismum in affinitate particularum stimulantium et organorum secernentium ponit, ita similem affinitatem partium cum certis stimulis Noster statuit, vsus argumento euacuantium medicamentorum, quo peculiaris tantum excretio promouetur et humorum male mixtorum, qui, ut in morbis venereis, scorbuticis, scrophulosis cet. has vel illas tantum partes ag-grediuntur. P. 73.

Capite sexto motum humorum, in vasis capillari-bus et tela cellulosa fluentium, non subesse legibus communibus circulationis, sed quaquaueversus liberum et facilem esse probat. Hinc, hepate plane obstructo, sanguinem lienis, ventriculi et omenti non retineri. Frigore et repellentibus humores arceri, irritatione attrahi, tum ex vasis, tum ex contextu celluloso; vnde quidem varia, et inter haec etiam ad mentem Cl. BORDEU catameniorum et haemorrhoidum fluxum explicat. P. 97.

Capite septimo haec principia ad inflammatio-nis explicationem transfert. Causa eius non est ob-

structio, sed irritatio vasorum capillarium, qua sanguis contra leges circuli copiosius ad locum irritatum vndiquaque confluit, ibique tumorem rubrum et renitentem producit. Argumenta ducuntur ex causis, tumoris inflammatorii cita saepe genesi, et modo, quo resolutio contingit. Cessat nimirum phlegmone, repulsis fluidis, relaxatis fibris, remoto stimulo inuoluta acrimonia, imminuto per venaesectionem impulsu cerebri, applicatis remediis, quae sensibilitatem et irritabilitatem supprimunt, ut causticis, quibus ad paronychias feliciter usus est Cl.

P. 115. FOUBERT. Calorem prouocat itidem irritatio fibrarum, quae contractae et inter se inuicem collisae igneas particulas extricant, quae ex centro inflammationis quaquaversus dispersae et fluidis, per

P. 119. irritationem attractis, occurrentes ab iisdem percipiuntur et pulsationem, phaenomenon, electrico pulsui simile, excitant. Febris vero incenditur, cordi per nervos communicato stimulo.

P. 126. Capite octauo suppuratio explicatur. Nascitur pus per ignem in centro tumoris ceu foco inflammationis, accumulatum et agitatum, quo aer rarior redditus humorum moleculas intrat, disiungit, et mutat. Oedema ad tumores suppurantes ab humore aquoso, telae cellulosaee per irritationem attracto, pendet. Quo fortior inflammatio, eo citius, eo copiosius pus generatur. Excretiones purulentae, et abscessuum demigrationes in alia loca fiunt, moto per vias telae cellulosaee pure. Diuiso inflammationis foco, suppuratio est lenta, ut in scrophulis aut rara, ut in erysipelate. Eadem in abscessu, a causa interna nato, depurat, in vulnere cicatricis formationi inferuit. Cl. HAEN, qui suppurationem ceu excretionem materiae, in massa sanguinis natae, considerat, non satis distinguit suppurationem putridam et purulentam. Cl. PRINGLE vero et GABER, se-

P. 134. rum

rum sanguinis coactum pro pure habentes, experimentis, non satis dignis et leuioribus, opinionem hanc superstruxerunt.

Capite nono de vulneribus magnarum amputa-^{p. 151.}
tionum exponit. Grauia, quae his superueniunt, incommoda, non vt Cl. DAVID alique, turbatae circulationi, infarctui vasorum et plethorae, sed irritationi per vasorum ligaturam, aerem externum, lintea carpta et directam membri truncati compressionem tribuit. Hinc loco venaesectionis, ante et post operationem crebrius institutae, quae vires nimium frangit, nouam commendat methodum, quae^{p. 161.}
irritatio praecaeueatur. Sanguinem nimirum absque vasorum ligatura fisti iubet agarico et vesica bubula vel suilla ope fasciae, in circulum ductae, alliganda. Circulari enim hac compressione, a Cl. POUTEAU male damnata, et cautelis a Cl. LOUIS commendatis, et ossium denudationem auerti et melius irritationem arceri monet, quam si cum Cl. RAVATON vtrunque in amputato membro musculorum et cutis partem relinquamus. Sic, vbi euitari non potest, operatio mox institui valet, neque opus est cum Cl. BOUCHER et FAURE dubitare, vtrum mox a vulnere accepto, an tardius suscipi debeat. Vfus digestiuorum, primo necessarius, tempestiue omittatur. Caro fungosa linteis carptis siccis, inde remediis efficacioribus irritantibus, tandem et causticis compescenda.

Capite decimo et sequenti de mechanismo et^{p. 182.}
phaenomenis, quae in formatione cicatricis vulnorum et vlcerum cum iactura substantiae obtinent, differit. Carnes non regenerantur, sed partes diuisae subsident, vulnorumque dimensiones minuuntur. Id fit extenuatione, qua cutis ad centrum diuisionis propius accedit, et suppuratione, tum in partibus mollibus, tum quoque in ossibus. Cicatricis ergo

- formatio ob subsidentiam carniū exulceratarum contingit, consistitque in exsiccatione extremitatis vaforum, quae suppurando depressa, succo nutritio affluente conglutinantur. Cicatrix primo solubilis est, pellicula sensim firmiter adhaeret, et a circumferentia centrum versus progreditur. Eleuatur aliquando successu temporis, si partes subsunt extensionis et incrementi capaces. Carnea tubercula, in superficie vlcerum nata, non sunt gemmae nouae substantiae, sed tumores parui, pus continentes. Vulnera caua approximatione et conglutinatione parietum consolidari, partesque, quas regeneratas multum temere crediderunt, ut sunt glans, papilla, lingua, scrotum, per turgescientiam vicinarum partium absconditas et retractas potius, denuo in conspectum prodiisse, quam denuo natas esse observationibus comprobant.
- p. 205. Capite duodecimo demonstrat, reparationem substantiae, quandoque contingere visam, a reditu pinguedinis extendentis, vel in iunioribus, ab incremento pendere, artificialem contra naturam neque constantem esse, amissas partes cerebri, turgescientia visceris, ossium callo resarciri, membranas vulneratas spissescere.
- p. 224. Capite decimo tertio de luxatione femoris et brachii agit. Cl. DUROI femur luxatum cruris ad malleolos, brachium carpi tractione absque contra extensionem facile et prompte reponi posse docuit, quam methodum ex partium structura defensam, Cl. Auctor perficit, additis regulis, quae contra extensionem quandoque necessariam concernunt, in repositione fractorum quoque non negligendis. Non opus igitur est tanto machinarum apparatu, ad resistantiam musculorum vincendam frustra excogitato.
- p. 238. Capite decimo quarto methodum medendi morbis acutis Hippocraticam, quatenus sese refert ad irritabili-

irritabilitatem, persequitur. Vfu doctus nouerat HIPPOCRATES hos morbos vt plurimum esse a causa materiali, quae calore et motu cocta, demum naturae viribus eliminatur. Euacuationes non, nisi morbo regulari reddito, suscipiebat. Tempore irritationis seu cruditatis ptisanas dabat hordeaceas variae consistentiae, victum non plane subtrahebat, sed eius copiam pristinae consuetudini, corporis constitutioni, aetatibus accommodabat; potumque multum aquosum et oxymelle remixtum propinabat. Male ptisanis iurulenta, potui acidulato antiseptica, alcalina, resinosa, amara et balsamica a quibusdam substituta sunt. Haec enim putredinem quidem in experimentis PRINGLIi a carne mortua, non vero a partibus corporis organici, sensu et irritabilitate donati, auertunt. Venam secabat HIPPOCRATES, vt febrim moderaretur, in initio tantum morborum acutorum, non facile postmodum, nisi urgente necessitate. Inde reprehendit Cl. Auctor venaesectionum abusum, quippe quibus coctio et erisis saepius intercipiatur, neque tamen reuulsio aut deriuatio, quae a sola vasorum capillarium actione pendeat, impetretur. Clysterum lenientium et refrigerantium, frictionis, pediluuiorum, cucurbitularum, scarificationis, errhinorum, epispasticorum, cet. vfu, reuulsionem materiae morbosae a parte affecta, et febris moderamen obtinebat; et nonnunquam emetico vel purgante, in initio morbi exhibito, morbum compescebat. Valent haec in febribus, a Cl. QUESNAY stercoreariis dictis, vel etiam ob reuulsionem. In morbo regulari, per crisin terminando, cautius illa adhibebat. Reiiciuntur in vniuersum a Cl. HAEN. Profunt, si humores nimium turgent, et cordis vis excitanda est. Nocent, si nauseae, vomitus et diarrhoeae ab irritatione primarum viarum pendent, quam augere possunt, inque sub-

iectis nimium sensibilibus et irritabilibus. Crisippus HIPPOCRATES naturae committebat prudenter. Quum enim illa fiat, excitata irritabilitate colatoriorum per materiam morbi, coctione huic illiue affinem redditam, non potest ars viam praescribere. In declinatione vero morbi euacuationes non nisi remediis blandis, et quando solida relaxata sunt, cieantur.

- p. 273. Capite decimo quinto observationes de morbis chronicis proponit. Duplex illorum agnoscit principium; aduentitium aliud per causas externas natum, alterum innatum. Vltimum hoc, a Cl. LECAT fluidum causticum dictum, agens illud materiale est, quod, recte sese habens, irritabilitatem organorum nostrorum excitat, deprauatum vero, morbos producit, in diuersis aetatibus, proque sede varia, quam eligit, diuersos. Morbos a causa externa natos, ut luem venereum, natura viam curationis monstrante, ars vincere potest; non aequae illos, qui ab innato principio deprauato pendent. Hos ars lenit et mitigat, sola natura, mutata per aetatem et vitae genus fluidorum constitutione, curat. Id quod variis exemplis, imprimis a glandulis scrophulosis et morbo hypochondriaco petitis ulterius illustratur, interque omnes methodos, his morbis oppositas, nullam constantem et vniuersalem reperiri ostenditur, licet mox haec, mox illa ad symptomatum lenimen conciliandum adhibenda sit. Quum vero alimenta contineant substantias, quae indicationibus quibuscunque satisfacere possint, regimen diaeteticum his accommodandum et medicamentorum vsui praeferendum est. Sit tamen diaeta benignior, non nimis stricta, varia potius, quam simplex, nunquam palato aegrorum plane contraria. Caeterum vsus et modus agendi medicamentorum anodynorum, purgantium, resoluentium, heroicorum, nec non exercitii corporis, balneorum frigidorum,

dorum, frictionis, epispasticorum et cauteriorum ad ea principia, quae superius a Cl. Auctore stabilita sunt, diiudicatur.

Capite denique ultimo praecipua artis sanandi sy-p. 321.

stemata percurrit, quae inde ab HIPPOCRATIS morte ad nostra usque tempora extiterunt, qualia sunt ASCLEPIADIS, GALENI, HELMONTII, Mechanicorum, Chemicorum, eorum, qui haec ultima duo inter se coniungunt, dein medicorum Monspeliensium, qui sensibilitatem a capite et partibus praecordiorum profectam, Cl. BORDEU, qui telam cellulofam, vasis et nervis donatam, diaphragmatis motu agitatum, et duodeno ceu centro oscillationum suarum utentem vna cum ventriculo et intestinis; denique Cl. ROBERTI, qui diaphragma et canalem primarum viarum, ut principium actionum et motuum sani et aegri corporis proposuerunt. Tandem suum de irritabilitate systema denuo repetit et inculcat, in medicos observatores, siue potius cunctatores graviter invehitur, regulas artis circa administrationem medicamentorum in chronicis morbis adeo mancas esse conqueritur, cumque HIPPOCRATE prudentem empiriam, cognitione temperamenti, gustus, vitae generis et animi affectuum cuiusque aegri suffultam, tanquam optimam curationum ducem commendat.

IV.

Abregé de l'Anatomie du corps humain, ou l'on donne une description courte et exacte des parties, qui le composent, avec leurs usages par Mr. VERDIER, de l'Acad. Roy. de Chirurgie, et Professeur - Demonstrateur Royal en Anatomie au Collège de Chirurgie de Paris, quatrieme Edition, revue corrigée et considerablement augmentée par Mr. SABATIER de l'Acad. Roy. de Chirurgie, Professeur - Demonstrateur Royal en Anatomie, et Chirurgien Maior en survivance de l'Hôtel Royal des Invalides Tomes II. à Paris, chez P. Fr. Didot, Quai des Augustins, pres du Pont - Saint - Michel à S. Augustin 1768. 12. Tom. I. a pll. 580. Tome II. a pll. 601.

h. e.

Compendium anatomiae corporis humani, quo succincta, et accurata partium, illud constituentium descriptio traditur, Auctore Cl. VERDIER, Tom. I. et II.

T. I.

Libellus hic, a Cl. VERDIER anno huius seculi vigesimo quinto prima vice editus, tumque generalia tantum anatomiae momenta continens, ab eodem Auctore anno vigesimo nono iterumque trigesimo tertio ita auctus prodibat, vt, quae antea vnico solummodo volumine comprehendebantur, duo iam complecterentur, quorum primo ossium musculorumque doctrina, altero reliquae, quae ad viscera, vasa, nervos et glandulas spectant, disciplinae exponuntur. Quartam, quam nunc indicamus, huius libri editionem ipse Cl. Auctor vltima vitae suae aetate moliebatur, et in hac ea, quae partium

partium corporis humani fabricam attinent, ita illustrare tentabat, ut simul eam, quam praestent utilitatem, morbosque, quibus quaedam illarum affligantur, consideraret, nec non ea, quae huc usque inuenta fuerint, accuratius traderet. Quum Cl. Auctor morte ereptus hoc perficere non potuerit officium istud in se suscepit Cl. SABATIER, beati VERDIERII discipulus et in munere anatomen docendi successor. Quomodo autem id praestiterit, eorum, quae mutata, quaeque addita fuerunt, recensione facta, apparebit. Prima mutatio in recensione ossium cranii et faciei occurrit. Quum enim in postrema editione ossa parietalia et occipitale ante temporum ossa, sphaenoideum et ethmoideum exposita fuerint, in hac noua et quarta post haec ossa primum perlustrantur. Quum porro in vltima editione primum nasalium, tunc maxillarium, deinde lacrymalium, postea zygomaticorum, demum spongiosorum inferiorum, denique palatinorum et vomeris historia tradita fuerit, in hac primum maxillarium, tunc zygomaticorum, demum palatinorum, deinde lacrymalium, postea nasalium, denique spongiosorum inferiorum et vomeris recensio facta est. Perioestii fabrica et usus triplex ossium substantia, et doctrina de ossium articulationibus, quibus tertia species, amphiartrosis dicta, in vnione corporum vertebrarum locum obtinens, adiicitur, accuratius exponetur. De ossium utilitate, capitis ossea figura atque volumine diuerso, ipsorum capitis ossium situ, substantia, usu, et in fetu diuersitate ossibus Wormianis, futuris, maxillae articulo et motu, modo dentium secundorum eruptionis, ossis hyoidei situ et substantia, vertebrarum in fetu structura, in adultis figura et interna vertebrarum dorsi cauitate, copiosius ac in postrema editione, dicitur. Prima, vndecima et duodecima dorsi, atque vltima lumborum

rum vertebra in specie consideratur. Quemnam os coccygis praestet vsum, quomodo ipsum in partu tractandum sit, quaenam sit pectoris conformatio sana, quid de foramine in medio sterni interdum reperto, faciliq;ue processus ensiformis ad interiora pressione sentiendum sit, quaenam denique in obstetrices, ex apta pelvis consideratione redundet vtilitas, perspicue docet. Ossium extremorum, praeprimis femoris, situm, magis attente perpendit. Addit etiam quaedam de sceleti feminini differentiis, potissimum quoad ossa innominata animaduertendis. De sceleto fetus denique ita agit, vt primum neogeniti, tum immaturi fetus sceleton contempletur, et multa tradat, in postrema editione non exposita. In musculorum doctrina, quum in initio quaedam de modo musculos vulneratorum discindendi, futurisque tendinum, atque fabrica et vfu musculorum accuratius exposuerit, ordinem sequitur ab illo, quo musculorum historia in postrema editione tractata fuit, plane diuersum. Quum enim in illa editione diuisionis musculorum ratio a partibus, quas mouent, petita fuerit, primaque classis frontis, occipitis, auris externae, palpebrarum, oculi, nasi, labiorum, maxillae inferioris, ossis hyoidei, linguae, laryngis, pharyngis, veli palatini, uvulae, capitisque musculos; altera colli, dorsi, lumborum, coccygis, et respirationis musculos; tertia eos, qui ad artus pertinent, comprehendat, in quarta hac editione locus, in quo muscoli collocati sunt, rationem diuisionis eorum determinat, ita, vt in prima classe, muscoli, qui in extremis, in altera, qui in trunco, in tertia, qui in capite, considerentur. Musculos artuum ad normam ossium, ad eos pertinentium, contempletur. Musculos trunci diuidit in eos, qui ad spinam, siue sint posterius, siue ad latera, siue anteriorius, positi, in eos, qui ad caput, aut anteriori,

aut

aut posteriori loco deprehendendos, in eos denique, qui ad pectus pertinent. Musculi capitis sunt vel ii, qui maxillae inferiori, vel ii, qui ossi hyoideo inferuiunt. De abdominis, vesicae, ani, vrethrae, penis, veli palatini, vuulae, pharyngis, laryngis, linguae, labiorum, nasi, oculi, palpebrarum, auris externae, occipitis et frontis musculis in splanchnologia, partiumque, ad quas illi pertinent, consideratione primum agit. In ipsorum musculorum expositione aliquantum ratione numeri et cognominationis eorum differt. Musculorum pectoris historiae addit doctrinam de respiratione. Mira mutatio iterum in splanchnologia occurrit. Quum enim in posteriori editione primum integumenta communia, tunc abdomen eiusque viscera, demum pectoris, et denique capitis viscera explicentur, in hac integumenta communia primum in fine totius libelli, capitis viscera statim post myologiam et tunc demum pectoris abdominisque contenta considerantur. Quum porro in posteriori editione tomi primi finem myologia, secundi initium splanchnologia faciat, in hac tomo primo adhuc doctrina de capite, organo sensuum; cerebro, et ore atque faucibus, quae accuratius exposita est, adiicitur.

Nec minus plenior fit structurae et usus viscerum T. II. abdominis et pectoris recensio, egregieque de digestionem chylique perfectione, generatione, nutritione fetus per amnii liquorem, respiratione ipsius in utero, indeque incerto ex pulmonibus eliminando signo, disputatur. Monendum etiam est, ossicula auditus, in tertia editione in ossium doctrina exposita, in quarta hac in organorum sensoriorum historia primum considerari. In angiologia plane nulla facta est mutatio, si iniectionum, fabricae arteriarum, coronariarum arteriarum, aneurysmatis, haemorrhagiarum, valvularumque copiosiore expositionem exceperis. Angiologiae

giologiae annexa est vasorum lymphaticorum historia, in tertia editione in adenologiae fine obiter tradita, iam in quarta accuratius descripta. Tunc sequitur neurologia, in eo tantum, quod nervorum fabrica, et in sensorios, motorios et in nutritorios diuisio plenius exposita sit, aliquantisper aucta. In adenologia glandularum fabrica magis attente examinatur. In historia denique integumentorum communium, in fine libri, vt iam dictum est, adiecta de tela cellulosa, de qua in tertia editione nil pene dictum est, copiosius agitur. Adiecta est tandem Cl. VERDIER vitae descriptio.

V.

Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem X. Deels I en II Stuck. Te Haarlem. By I. Bosch, Drukker van de Hollandsche maatschappye der Weetenschappen. 1768. 8. Alph. 2. pl. 13. tab. aen. 12.

i. e.

Commentarii societatis scientiarum Harlemensis Tom. X. P. I. II.

P. I.

Continentur in prima parte:

P. 3.

1. Responsio Cl. DAV. MEESE ad quaestionem *de mediis optimis minusque pretiosis littorum maris Harlemensis decrementa impediendi*, a societate anno 1764 et 1766 iterum propositam, cui praemium monetae aureae addictum est.

P. 3.

2. Responsio Cl. WILH. DE VOS ad quaestionem: *Licetne in vitae nostrae ratione inscitiam sociorum nostrorum quaesui habere? Si licet, vbinam et quatenus?*

quatenus? Reportavit Cl. Auctor d. 21. maii 1767.
praemium monetae aureae.

3. Altera responsio; ad eandem quaestionem, p. 123.
omisso Auctoris nomine, qui in hac tractatione de
licentia, quatenus ad inscitiam respiciat, differit.

4. Tertia responsio eiusdem quaestionis Auct. p. 153.
Cl. P. FRANCK. V.D.M. in qua *de usu et abusu alio-*
rum ignorantiae agit.

5. Quarta demum responsio ad hanc quaestio- p. 359.
nem a Cl. S. FORMEY, in qua etiam *idem argumen-*
tum tractatur.

Infunt in parte secunda:

P. II.

1. Tractatus de castrorum munitionibus (*retran-* p. 3.
chementen) Auct. Cl. N. YPEY.

2. Breues annotationes de *vrina pituitosa* (*Slym-* p. 17.
graveel) Auct. Cl. IAC. VAN DER HAAR. Si-
gnum diagnosticum huius mali Cl. Auctor quaerit in
vrina alba, flava, turbida foetidaque, quae subfri-
gida magnam partem muci albi, flavi vel grisei co-
loris in sedimento ostendit, qui vasi tenaciter adhae-
ret. Cum itaque vrina talis magnis doloribus spasti-
cis excerni ut plurimum soleat, sunt, qui malum
hoc *spasmus* vel *tenesmus vesicae* dicant: alii mu-
cum hunc, puri similem, *verum pus* dici malint: alii
denique *symptoma calculi* esse asserant. Cum iis No-
ster consentit, qui morbum hunc ex copiosiori muci,
organa vropoea ab acrimonia vrinae defendentis, se-
cretionem praeternaturali oriri contendunt. Pro p. 19.
ximam huius mali causam in vrethrae parte, vesicae
vrinariae vicina, coangustata, vel vitio quocunque
Tom. XVII. Pars IV. Ss obstructa

- obstructa positam Noster suspicatur, cum signum pathognomonicum huius vrethrae partis obstructae in copiosiore muci, cum vrina exeuntis, excretionem semper inueniatur. Declarat hanc suam sententiam ex actione detrusoris et sphincteris, sibi inuicem contraria, quae huc redire videtur, ut vrina, quae, in tali statu, a detrusore non omnis in vrethram propellitur, orificio vero per sphincterem clauso, relicta iam acrior facta, detrusorem relaxatum feruet, et nouam accedentem vrinam corrumpat et acri suo stimulo glandulas vesicae mucosas valde irritet, ut inflammantur, suppurent crassae callosaeque reddantur. Ex hac irritatione continuata copiosam se et excretionem muci sequi putat, praesertim cum non raro guttulae quaedam vrinae, in carunculis et collo vesicae retentae, vesicam ad continuam contractionem mucique excretionem maiorem excitulent, ut aegri magnos interdum, interdum nullos dolores spasticos sentiant. Patere ex his, excretionem hanc muci et spasmos vesicae non morbum, sed symptoma eius esse contendit. Methodum curandi, quam alii ex lenibus emollientibus cet., alii vero adstringentibus et roborantibus instituunt, Noster non probare videtur, cereos Goulardianos potius commendans. Calculum saepius et stranguriam huius mali causam esse concedit, nec non viros solum, sed feminas etiam, haemorrhoidibus coecis inprimis obnoxias, haec incommoda experiri: Haemorrhoides enim, crebriore suo reditu, collum vesicae vehementer afficere vrethramque ad coangustationem disponere, ex Cl. Auctoris obseruationibus non improbabile est.
- p. 22.
- p. 25.
- p. 27.
- Mictum cruentum etiam, cum eidem saepius talis excretio mucosa praecesserit, ex his oriri sibi persuadet, et colligit tandem, aegros, qui, ex vesicae vrinariae collo, vrethraeque ei annexa parte coangustatis, non omnem vrinam possint excernere, huic morbo esse obno-

obnoxios; in viris eundem frequentiore esse, quam in feminis; morbum ipsum vero, non raro conspicuum, et catheteris ope et iusta ad vrinae profluvium attentione dignosci posse.

3. Brevis tractatio de natura munimentorum circa p. 30.
castella (*Bastions*) Cl. Auct. A. LIEFTINCK.

4. Tractatus alter de potentia fluidorum: aëris p. 45.
inprimis resistentia. Auctore Cl. I. F. HENNERT,
ex idiomate Francogallico translatus a Cl. I. H. VAN
SWINDEN.

5. Computum formularum quarundam, quibus p. 88.
cometae distantia a terra definitur ex quatuor observa-
tionibus per I. I. BLASSIERE.

6. Tractatio de usu botanices in commodum patriae p. 133.
eiusque incolarum a Cl. DAVID. MEESE. Vege-
tabilium, eorum inprimis, quae iuste implantata
vel radice vel trunco ramisque frugifera sese com-
mendant, usum, Nostro non ita paruum visum, bre-
vibus disquirere non dubitavit. *Fraxinum* hunc in
finem elegit, quae ex eo etiam commendanda vide-
tur, quod feminibus, quae quotannis conficit, se
ipsam, sine peculiari encheiresi, progerminare con-
suevit, vel, quod variis in locis bene crescit, et ra-
dices suas ita firmiter agit, ut solum etiam, basi hac
firma, ad resistentias et iniurias quasvis superandas
aptum reddatur. Cum vero radices suas latius p. 135
spargere soleat, hortulanos adhortatur, ut, cum
vicinis plantis omnem fere succum praeripiat, cauti
sint, ne hortis plantisque noceant. Confirmari ra-
dicibus suis 1. aggeres in viis publicis 2. fluminibus, p. 138
stagnis vel ipsi mari adiacentes 3. littora piscinarum
4. lacuum 5. munimenta castellorum 6. eas tandem

p. 143. vias profundiores et paludosas, contendit et in tabula adiecta declarat. Insertionis et tractationis modo relato, eas, autumnali tempore, in locis altioribus, in profundioribus, tempore vernali, poni debere asserit.

7. Continuatio eiusdem usus ab EODEM. Con-
p. 145. templatur hic conferuam filamentis simplicissimis, aequalibus, longissimis. Linn. Sp. Pl. Ed. III. T. II. p. 1633. no. 1. (Flap of Deekenvlag). Descriptis eiusdem plantae loco natali, modo crescendi et anni tempore, quo floret, in filamenta eius potissimum inquirens, ea, armato oculo, pellucida, multis valvulis parum a se distantibus, praedita, quibus materia crassa, viridis inesset, vidit: Obseruauit porro, ea interdum speciem quandam serpentis aquatici maculati simulare; maculas istas vero, tubercula parua, rotunda, viridia esse. Semina vera non detexit; Filamentis vero plantae maturae transuersim abscissis et in vitrum, aqua plenum, immixtis, globulos paruos, ex ostiolis virides propululantes ad fundum vidit, qui paulo post superficiem petentes primo minus conspicui, tribus diebus post longius latiusque se dispergebant, vt veram inde plantam repraesentarent. Hos verum plantae semen esse putat. Usus in oeconomiam ex ea re-
p. 163. dundat, vt, filamentis, lini in modum, tractatis, egregia inde fila possint duci, quae, cum lana camelina coniuncta, melius succedant; Iis vero, cum tertia lanae communis parte commixtis, artificibusque traditis bona accepit tela. Ad chartam papy-
p. 167. raceam producendam apta ea esse experientia Nostrum docuit. Possunt tandem ex his fila fugentia
p. 169. in lampadibus, puluinaria in rhedis, lectis cet. confici.

8. Disquisitiones quaedam de muscis, an ii sine p. 171.
 vel una vel duabus, ut in mille aliis plantis fieri solet,
 propagentur cotyledonibus? Auctore EODEM. Cotyle-
 donibus variarum plantarum ab Ill. LINNAEO Phil.
 Bot. p. 102. determinatis, iisque muscis denegatis, No-
 ster in eam rem paulo studiosius inquirens, nullum eo-
 rum sine vna vel duabus propagatum vidit cotyledoni-
 bus. Systemate super hac re formato, duobusque tra- p. 173.
 ctatis iam de forma et coloribus cotyledonum, ab Ill.
 LINNAEO determinatarum, et de numero earum,
 eruditis iam communicatis, iam paulo post tertiam
 de habitu additurus est. Examinat hic *Polytrichum*
 (commune) LINN. marem et feminam, cui minimam
 eiusdem plantae speciem adiicit. Remotis foliis ra- p. 176.
 dicalibus squamulisue multos fusciculos, membra-
 nula squamosa inuolutos, communi receptaculo in-
 ter se et cum caule communicantes, in summitate co-
 ronae detexit. Intra hoc inuolucrum squamosum
 duo, tria vel quatuor corpora cylindrica reperit, quae
 postea ouaria, femine referta, cognouit, iuxta quae
 stamina quoque conspiciebantur. Corporibus his cy-
 lindricis arenae purae et tenui mandatis, plantulas
 quasdam novas progerminare vidit, germenque ere-
 ctum, in tabula adiecta delineatum, veram cotyle-
 donem statuit: Muscos ideo *monocotyledones*, quam
acotyledones mauult. Marem postmodum contem- p. 178.
 platur. Stamina, calyptra et operculo a capitulo
 remotis operculo intus adhaerentia cum puluere vi-
 ridi obseruauit; membranula alia, subtus conspicua,
 separata pollen antherarum tenue, flauum vidit, ideo-
 que hanc speciem ad *polyandrias* LINN. refert:
 Aliis deinde partibus disquisitis, *hermaphroditam* hanc
 esse asserit, quam tamen, etsi cotyledones ob te-
 nuem fabricam in ea detegere non potuit, *acotyle-*
donem dici nonuult. Tertia species cum his fere p. 184.
 conuenit, cui modum tandem, quo plantas has tra-
 ctauit, addit.

P. 193. 9. *Nova theoria figurarum sphaericarum cum computo superficiei earum et voluminis* Auct. Cl. W. O. REITZ.

P. 245. 10. *Disquisitione de motu apparente* a Cl. W. I. G. KARSTENS ex idiomate germanico translata ab I. W. VAN HAAR.

P. 287. 11. *Tractatio de cerebro avium et piscium* Auct. Ill. DE HALLER ex latino translata a Cl. W. DEMONCHY. Hanc tractationem, cum de ea iam alio loco *) differuimus, hic omittendam putamus.

P. 314. 12. *EIUSDEM tractatus de piscium cerebris ex latino translatus per Eundem.* **)

P. 387. 13. *Observatio de ortu larvae Hemerobii* LINN. *chrysops dicti* Auctore Cl. MART. SLABBER. Convenit Noster in descriptione huius insecti cum Cl. FRISCH de Insect. P. X. p. 40. tab. 23. Quae de causa nihil de ea, nisi modum, quo Cl. Auctor insectum hoc invenit, et nutriuit, commemorabimus. In folio

P. 390. mali persici ovarium cum multis ouulis flavis, ductui, argento polito simili, insistentibus, Noster reperit. Ouulis his d. 28 iun. in lagenam impositis, orificioque eius, tenui tela et rara obiecto, colorem d. 30 ei. in griseum mutatum observavit, posteroque die animalcula exclusa. Singulorum horum fa-

P. 394. bricam et habitum, microscopii ope, examinavit. Cornua duo ex capite egrediuntur, ad sentiendum apta: Eminentiae duae, quibus nutrimentum arripit cum duobus aliis adminiculis, quibus cibum depurat. Inter eas est canalis sugens, quo, aliis insectis impresso, humores exfugit. Pedibus gaudet sex, millepe-

*) vid. Opusc. min. *Eiusd.* Tom. II. cap. 36. p. 191. Conf. comment. nostr. Vol. XVI. P. III p. 431.

**) vid. ibid.

lepedum ad instar, pilis, vti totum corpus, obsessis. Color in capite brunnus, in collo coeruleo albus, de reliquo brunneo albus vel cinereus. Pediculis ex arbore ligni rhodii nutriuit. Die 7 iul. tunica exteriore posita, praeter capitis glabritiem et coloris varietatem nihil peculiaris habuerunt. Ea d. 12 iul. iterum deposita, colorem elegantiores ostenderunt, et d. 17 eiusd. et 18. tela cinerea se incluserunt. Anni subsequents mense iul. insecta duo alis praedita vidit exorta, quae microscopii ope disquiri. Excerni humorem flavum, fetidum stercorique humano similem ab iis, obseruauit.

14. Observatio de *pediculo avium* (Vogel-Luis) *alato, triginta sex ungulis instructo* *) ab EODEM. In P. 413. vulture interfecto tria eiusmodi insecta, ungulis suis euti firmissime adhaerentia, ut nulla arte, nisi plumulis eruptis, possent abripi, inuenit, quorum caput, microscopiope, tribus partibus distinctis, posterius sibi incumbentibus, detexit: Prima pars pectori incumbit, in cuius faciei anterioris fine oculi magni octangulares conspiciuntur: Altera versus faciem cum duobus punctis eminentibus vergit: Tertia denique in duos canales cylindricos (*buizen*) longos, pellucidos, cuius usum nescit, continuatur, ex quorum medio canalis fugens (*zuiger*) quo nutritur, prodit. Pectus capiti aequale in duos processus p. 416. acuminatos antequam procedit; Posterius vero lateraliter duae eminentiae, ex quibus totidem alae exeunt, prostant: Ad alarum marginem externum truncus, ex quo quatuor vasa sanguifera egrediuntur, conspicitur. Pedes, pectori annexi quatuor articulis constant: Quartus in sex rursus subdividitur, quorum ultimus sex ungulis, utrinque divergentibus, utitur, inter quas duo tubercula totidem-

*) An non *Hippobosca hirundinis* LINN. vid. SCHAEFFERII Elem. entomol. I. 70.

que canales fugentes conspiciuntur. Abdominis inferior et posterior pars multis pilis obsessa est, quos ad anum in duobus rotunde, in vno, quem marem p. 420. statuit, acute terminatos vidit. Totum corpus admodum planum et vbiuis fere pilosum est. Color variat: In alio alte, in alio seuerè viridis: In tertii capite et pectore superius rubicundo brunnus, inferior, vti et in processibus pectoris tribusque articulis pedum flauo viridis: In processibus capitis albo flauus, oculi albo nigri, quartus articulus brunnus: Ungulae nigrescentes, canalis fugentis anterior pars p. 421. flaua, posterior alba, et alae griseae. Examinat tandem Cl. REAUMURII descriptionem, Mem. des Insectes T. IV. mem. 3. p. 144. t. 11. exhibitam, et in plurimis ab eo dissentit. Tabula aenea adiecta est.

Relationes Societati traditae:

- p. 429. 1. *Observatio de lumbrico, ex intestino in hernia inguinali procidente* Auctore Cl. N. BELKMEER. Lumbricum Noster in virgine, 36 ann. bono corporis habitu, hernia inguinali laborante, ex inguine dextro, paruo admodum orificio procidentem, obseruauit. Corruptionem gangraenosam circa orificium, intus vero duritiem, versus anulum abdominalem, vidit. Lumbricum sensim extractum octo digitos longum et canalis fistulae tabaci crassitiem aequantem conspexit, nulla subsequente ex hoc orificio excretionem. Ortum eius mali et progressum, relatione sibi ab aegra facta, Noster demonstrat. Iustis deinde remediis aegram breuifanauit.
- p. 435. 2. *Relatio de visu, celerrime amisso, per operationem restituto* Auctore Cl. G. ten HAAF. Praemissa cataractae theoria, docet, eam non semper a lenta obstru-

obstructione lentis, sed a subita interdum eius corruptione, squamularumque lentis cum eius fluidis commixtione, qua massa alba, lactea prodeat, sub nomine *cataractae lacteae* oriri. Virgo, 18 annorum, bona acie oculorum praedita, omnem plane visum paucis diebus amittebat. Cum corneae pellucis nigram partem in lacteam massam mutatam, et a Cl. DU PONT cicutae extracto iam frustra datum, cognosceret Cl. Auctor, eam non, nisi operatione, curari posse assererat. Operationem Cell. DU PONT et VINK praesentibus, in sinistro oculo instituit, incisioneque vix facta, materiam lacteam effluere vidit, qua remota, aegra quaelibet statim poterat discernere. Symptomatis nullis subsequenter, eandem paucis diebus post in dextro oculo, cum eodem successu, fecit, ut prior visus acies breui restituerentur. Colligit hinc inde 1. lentis crystallinae solutionem veram *cataractam lacteam* dici posse, breuique coecitatem inducere. 2. Eandem ex veterum methodo, acus ope, non posse operari, ideoque recentiorum methodum commendari.

p. 439.

3. Relatio de variolis ante partum a IOS. VAN IPEREN. Vxor Auctoris Cl. filium sanum, sed per totam corporis superficiem rubicundum, peperit. Maculae hinc inde, ut in variolis, cum eminentiis conspiciebantur, ut fetus iam in utero variolis laborasse videretur. His tribus hebdomadis post euantia, filius bene se habuit. Matrem sex vel septem hebdomadis ante partum, cum liberis duobus, variolis benignis laborantibus, continuo adesset, magnam spirandi difficultatem, sine aliis signis, sensisse docet, qua tamen, medicamentis aptis, liberata esset. Hinc colligit, fetum, quatuor circiter septimanis ante partum, variolis adfectum fuisse. Quaerit itaque, numne insitionem variolarum solito citius instituere liceat?

p. 441.

p. 443. 4. *Obferuatio de empyemate, per operationem curato* Auctore Cl. D. H. GALLANDAT. Aeger, 40 annorum, ex pleuritide male curatus, febre hectica cum summa debilitate laborabat. Empyema Nofter, ex symptomatis colligebat, quamuis pus in pectore non aperte posset detegere. Cl. RUPERTO in confilium vocato, operationem, vt vltimum remedium, proponebant, quam postero die methodo

p. 449. Cl. LE DRAN instituit. Incisione facta magna pars puris boni albi, cum impetu profiliebat: Cum vero multum in pectore relictum esse suspicaretur, vulnus, ne aeger animo delinqueret, emplastro, orificiis, quibus pus exire posset, pertuso deligauit. Excretionem hac puris in dies imminuta, aeger, viribus paulatim recuperatis, bonis medicamentis bonaque diaeta adhibitis, melius se habuit. Tumore oedematoso in pedibus paulo post cessante, et ichore sanioso, puris loco, effluente, iniectiones conuenientes adhibuit, et his, ad sextam hebdomadam vsque, continuatis, aeger vere conualuit. Addit tandem Cl. Auctor monita, quae huc redeunt: Aegros pleuriticos, ex empyricorum et suorum culpa empyema sibi contrahere: Empyematis vero diagnosin ex symptomatis facile posse colligi, nec medicos et chirurgos operationem eius, cum nec admodum dolorosa, nec periculosa sit, reformidare debere, praesertim cum multas eiusmodi, felici cum successu tractatas, habeamus; in multis vero eiusmodi cadaueribus intelligatur, aegros hac operatione potuisse seruari.

p. 454. 5. *Obferuatio pulueris arsenicalis, intus applicati, symptomatum singularium et lentorum*, Auctore Cl. N. HOYKAES. Vidua, 46 annorum, bono corporis habitu, puluere arsenicali, loco cremoris tartari, quem consueuerat, in iusculum, ex inscitia immisso, nausea inter edendum, anxietatibus, doloribus sum-

mis

mis cum crebriori vomitu afficiebatur. Magna p. 456.
 aquae, cum lacte mixtae, copia ab aegra largius
 sumpta, Noster, paulo serius accersitus, venenum iam
 altius penetrasse cognouit, cum destructionis
 signa in partibus oris iam apparerent. Oleo oliua-
 rum et paulo post tartaro emetico datis, veneni effe-
 tus nihilominus relinquebantur pessimi, vt malam
 inde formaret prognosin. Asthmatici insultus, d. 13 p. 457.
 emollientibus leniti, linguam siccam vocemque ob-
 scuram relinquebant. Iis d. 15 et 16 incrementi-
 bus, abdomineque duro et tenso d. 18 delirium ac-
 cessit, in quo nullum obiectum, quae omnia rubi-
 cunda sibi videbantur, nisi auditu poterat dignoscere,
 vesicatorio applicato, symptomatisque remissis, diffi-
 cultas deglutiendi restitit. His ita ad 25 d. conti-
 nuatis, crisin quandam in lingua, faucibusque humi-
 dioribus et crusta in labiis cum duabus deiectioni-
 bus aluinis, quae corruptam carnem foetidosque pel-
 les redolerent, sibi videre visus decocto corticis Peru-
 viani et elutione oris antiputrida usus est. Quatuor
 diebus post hemiplegia obseruata, laxantibusque inde
 continuatis, anxietates maiores abdomenque magis
 tumidum apparuere, vbi nec draastica purgantia opta-
 tum habebant effectum, symptomata potius, aluo
 per duos dies non respondente, crescebant. Se-
 parationem in ore usu corticis Peruviani iuuit. Sic aegra
 nunc melius, nunc peius se habens, osse sacro tandem
 gangraena citissime destructo, cum 53 dies decu-
 buisset, expirauit.

6. *Obseruatio celeris mutationis aeris*, Auctore p. 461.
 Cl. L. C. PALIER.


7. *Relatio de excretionem vermis ex dextro narium* p. 466.
orificio, Auctore Cl. M. SIABBER. Chirurgus, 52
 annorum, hemicrania dextra a pueritia ad 50 annum
 vsque

vsque laborans, dolores auctos cum vehementi capitis pulsatione eiusque torpore sensit. Sede huius mali in latere dextro, a fronte ad occiput, fixa redita, somnum aeger capturus, occipiti nunquam, temporibus semper debebat incumbere. His tandem ita incrementibus, ut, pressione nerui optici, visus etiam hebetior fieret, et anno 1767 d. 2 maii febre biliosa, pulsationibus vehementioribus, morboque pectoris accedentibus aeger, pessime se habuit, de quo omnes desperarent. D. 13 ei. mane ex capite quid ad oesophagum delabi, quod vero statim sreatu evanesceret, attendebat: Titillationem paulo post ad sinus frontales sentiens, repetita, corpore in lecto erecto, sternutatione vermem, octo digitos et octauae digiti partis longum, canalisque fistulae tabace diametrum aequantem, excretum videbat, ut postea, symptomatis statim cessantibus, breui restitueretur. Vermem hunc, ob magnitudinem, ad lumbricos refert, quem etiam in spiritu adhuc seruat. Sunt, qui eum ex ventriculo immediate ad oesophagum ascendisse asserant, cum quibus Noster non consentit, quia eiusmodi vermis non, nisi summis vomitionibus doloribusque asthmaticis, in aegro nostro non praesentibus, possit excerni. Probabilius Nostro videtur, hunc vermem a teneris iam in cauitate quadam capitis habitasse, symptomataque talia protulisse.

P. 471. 8. Relatio - - Dachs *de hydrophobia in homine, post abusum potus spirituosus, conspicua*, Auctore Cl. TH. SCHWENKE. Miles 23 annorum, temperamenti cholericis sanguinei, bonique corporis habitus, post magnam copiam spiritus iuniperi. (*Genever*) ingestam, ita convellebatur, ut ab adstantibus deberet contineri. Pulsu pleno, duro celerrimoque Noster ex adstantibus cognouit, aegrum tempore prandii

prandii de vomituritionibus conquestum, et, cum fluidi quid ori admoueretur, admodum esse connulsum, vt etiam adstantes morfu peteret, et quaecunque posset arripere, dirimeret. Larga venaesectio-
ne animo delinquentis facies aqua adspergebatur, vbi symptomata statim redibant, vt et in applica-
tione antispasmodicorum, aqua exceptorum. Cum de canis rabidi morfu nulla adesset suspicio, magna iterum sanguinis copia ex pede subducebatur, vbi simul ex brachii vena secta sponte et largiter san-
guis effluebat. Symptomatis postmodum ad quartam vsque horam per interualla faeuientibus, aeger, somno per semihorium absoluto, inscius omnium, bene se habuit, vt, nullo paroxysmo regresso, breui restitueretur. Potum spirituosum aeger solum accusabat.

9. Adiiciuntur obseruationes meteorologicae Zwanenbürgenses ad annos 1765 et 1766.



VI.

Observations on the nature and consequences of those injuries to which the head is liable from external violence. To which are added some few general remarks on fractures and dislocations. By PERCIVALL POTT F. R. S. and Surgeon to St. Bartholomew's-Hospital. London; Printed for L. Hawes, W. Clarke, and R. Collins. 1768. 8. mai. Prior tractatus absque dedicatione pagg. 276. cum tabulis tribus, aeris incisus, alter pagg. 126. cum tabulis duabus, aeri incisus, continet.

i. e.

Observationes super natura et effectibus laesionum, quibus caput, a violentia externa, subiectum est. Accedunt quaedam annotationes generales de fracturis et luxationibus. Auctore PERCIVALL POTT.

Fundamentum prioris tractatus (alter enim prorsus recens est, et licet communi cum priori titulo comprehendatur, tamen etiam peculiari gaudet, nec paginarum serie cum priori cohaeret, ut adeo separatim quoque vendi possit) in opere quodam iecisse Cl. Auctorem perspeximus, qui 1760 Londini in forma 8. mai. sub hoc titulo *) prodiit: Licet enim nec in hoc libro Cl. Auctor novam emendatamque eius editionem promiserit, nec in praesenti prioris ullam mentionem faciat, conferendo tamen utrumque inter se facile quisque videbit, librum fere eundem esse, nunc tamen mutatum
et

*) Observations on the nature and consequences of wounds and contusions of the head, fractures of the skull, concussions of the brain, etc.

et multo auctiorem redditum, additis simul iconibus ferramentorum, quibus veteres chirurgi in laesionibus caluae utebantur. Liber autem ipse sectiones sex complectitur, ex quibus nunc praecipua momenta adducturi sumus.

Sectio prima, quae recens in hoc libro accessit, de vulneribus integumentorum capitis exponit. Si ea sola laesa sunt, ac separata a calua, sine eo, ut grauiora inde symptomata metuenda sint, satius putat Cl. Auctor separatam partem conseruare et p. 6. cum sanis coniungere, quam praescindere; in quo exsequendo iustum, etiam futurae cruentae pretium haberi oportere, expertus testatur. Accidit etiam p. 8. saepe, ut exfoliatio cranii artis potius, quam naturae opus sit, neque semper sponte subsequutura fuisset, nisi arte proliceretur; satis ergo feliciter eadem supersedemus, si os, quam primum fieri possit, iterum integumentis obducatur. Alia vero res est, si ea contundendo vexata fuerint, ubi copiose signa exponuntur, quibus cognoscitur, utrum integumentis solis, an simul cranio vis illata fuerit, et in priori casu utrum, sola cutis eique substrata tela cellulosa, an simul galea et tendinea pericranium laesa sint. Cruor ab ictu, capiti illato, extra vasa missus et sub tegumentis stagnans saepe, tactum fallit, et ossis fracturam mentitur: qua in re opus est, ut p. 20. reliqua symptomata simul attendantur, ne, incisione minus necessaria, curationem protrahamus et deformem cicatricem producamus, cum tunc discutientibus remediis, inter quae solutio salis ammoniaci p. 23. crudi in aceto et aqua vel spiritu vini praestantissimum est, totum negotium absolui queat.

Sectio secunda effectus contusionum in dura p. 24. matre et partibus interioribus cranii tradit. Exhibita generali tractatione anatomica harum partium, monstrat Cl. Auctor, duram matrem ubiuis interius,

- interius, aequè ac pericranium exterius, cranio
arctissime adhaerere, miraturque, hanc adhaesio-
nem, veteribus iam satis cognitam, a recentiori-
bus vix semper satis attendi, falsamque omnino fal-
sae hypothese theoriam istiusmodi laesionum super-
structam esse. Postea effectus variarum specierum
contusionis curiose describit, et demonstrat, non
solam extrauasionem cruoris puri vel saniei produ-
cendis sufficere, nisi febris vel alia irritatio accesserit.
Quum vulnere contusae sunt externae partes,
aut os denudatum fuerit, cautus obseruator aut ex
vulneris, aut ex ossis mutato statu, subtus haerens
malum omnino cognoscere poterit: vbi autem haec
signa non suppetunt, inflammationem durae matris
et collectionem materiae intra hanc et cranium pro-
dunt tumor integumentorum eleuatus, circumscri-
ptus, doloris expers, et spontanea pericranii ab
osse separatio; quod signum vix vnquam Nostri
fessellit, si illud cum reliquis generalioribus contu-
lit. Quaecumque in his casibus auxilia ab arte ex-
spectari possunt, ad duo momenta redeunt: nimi-
rum, vt tempestiua ac larga sanguinis missione in-
flammatiò durae matris praeuertatur, aut, altius
iam progresso malo, materiei sub cranio collectae,
trepani ope, exitus paretur; quorum auxiliorum mo-
dum iterationemque, et quae praeterea sint agenda,
indiuiduum cuiuslibet aegri status chirurgum edoceat
necesse est.

Sectio tertia de separatione aut destructione
vtriusque tabulae cranii, e contusione profecta, agit,
quod tamen argumentum non, nisi casibus quatuor
adductis, illustratur: prius autem de eodem ossis vi-
tio, a causa venerea profecto, exponitur, quo ali-
quando Cl. Auctor paene totum os frontale, et alia
vice integrum os bregmatis sinistrum erosum ac de-
structum vidit. Mercurialia hunc ossium morbum
non

non sanant, quin potius, cum ille, curata etiam lue, p. 111.
 remaneat, exasperant, a quorum igitur usu hic
 aeque, ac in aliis reliquiis morbi venerei cauendum
 et potius saturato sarsaparillae decocto cum lacte,
 diaeta tenui, aere puro, et largo Peruuiani corticis usu
 negotium peragendum est. Inter additas obser- p. 117.
 vationes notabilis in primis ea est, qua femina pro-
 vectioris iam aetatis, ab ictu, capiti inflicto, per septem
 menses male se habuit, quo demum elapso tempo-
 re, vltima ossis vitiati portio, circa tertiam partem
 ossis bregmatis sistens, extracta, et tunc tandem vul-
 nus consolidatum fuit.

Quaecumque nomina veteres adhibuerunt ad di-
 versas fracturarum fissurarumque cranii species in-
 ter se distinguendas, omnia superuacua sunt et non-
 nisi memoriam onerant: duo igitur tantum harum
 laesionum genera constituit Noster, ita quidem, vt p. 123.
 in sectione quarta de iisdem absque depressione, in
 quinta, cum illa, agat. Maxime ambigua sunt signa,
 quae fractam esse caluam edoceant, quum nullum
 eorum immediate ab ipsa fractura proueniat, et p. 125.
 haec saepe adsit, nullis licet illorum praesentibus.
 Atqui multum in hac re positum est, quum inde
 curationis fundamenta depromenda sint. Rarius
 enim, quamuis simplicior fuerit fractura, trepana-
 tione carere possumus, siue eius ope symptomata, p. 130.
 a pressione humorum extraneorum oriunda, leua-
 re, siue materiam, intra caluam et duram matrem,
 praegressa inflammatione, collectam, euacuare, siue
 damnum durae matri imminens, praeuertere volue-
 rimus. Vltimus autem casus, in quo auxilium
 hoc prophylacticum dici debet, variis Auctorum dis-
 sensibus ansam praebuit, cum idem alii suadeant,
 alii vetent; vtrorumque argumentis, quae tamen hic p. 131.
 repetere breuitas nos prohibet, inter se comparatis,
 in priorum partes Noster descendit. His
Tom. XVII. Pars IV. T t ergo

- p. 145. ergo stabilitis, curationis rationem, qua veteres vsi sunt, exponit, et licet indicationes eorum eadem fuerint, quas nos sequi oportet, illorum tamen instrumenta multiplicibus incommodis ac defectibus laborasse, et descriptione eorum ostendit, et additis iconibus vltcrius illustrat. Reicit etiam methodum illorum, qui manubrium trepani ferreum efficiunt, ita quidem, vt eodem, loco eleuatorii, vtantur; difficilius enim tractatu redditur instrumentum, et praestantissimum manubrium ex ligno quodam molliori parari posset. Sollicite nunc totam operationem describit. Si integumenta incidenda sunt, hoc circulari modo fiat, ita, vt vel vulnus, si adsit, vel pars, ictu laesa, centrum incisionis efficiat: optimum etiam est, cum vulnera maiora fuerint, quicquid vitiatum est, protinus remouere. Differentiam fracturae vel fissurae a futura vel fulco arteriae, p. 162. ossi impresso, pericranium, a laesione separatum, huius margines inaequales et asperi, cum sulcus laevis sit et dispositio futurae cognita et vere diuersa p. 166. a fractura, constituunt. In apparatu ipso corona p. 194. maior minori semper praestantior est. Falsa est opinio, futuras coercere progressum fracturae: qua occasione etiam, trepanationem in ipsis futuris, urgente necessitate, non negligendam commendat, neque laesionem sinuum ab ea nos abstertere debere monet, cum ipse sagittalis sinus laesus non absolute funestam haemorrhagiam producat, et haec sanguinis receptacula pariter, ac reliqua vasa venosa iterum coalescant.
- p. 204. Quod de imperfectione instrumentorum, quibus veteres caluam perforare solebant, dictum est, idem etiam suo modo de modis eorum, fractas et depressas partes cranii eleuandi, valet, de qua operatione sectio quinta exponit. Vbi nulla alia symptomata terrent, ea sola sufficit, cum vero sub de-
- pressa

pressa ossis parte dura mater inflammatur, difficilius est negotium, tumque, trepano admoto, laesam ossis partem auferri oportet: qua ratione simul Cl. Auctor tractationem, in superiori sectione inceptam, p. 211. de iis locis, in quibus vulgo trepanatio prohibetur, p. 214. ulterius prosequitur, et eam in osse temporum, nec ob arteriae, nec ob muscoli temporalis metuendam laesionem negligi debere euincit, monstratque, fracturas huius ossis ideo tantum saepe funestas esse, quia facile ad basin caluae penetrant. Ad tractan- p. 215. dam duram matrem, ablato osse, denudatam, multipli- p. 216. cem medicamentorum farraginem, ab Auctoribus propositam, reiicit, et sola lintea sicca commendat. Tractatio etiam vulnerum ipsius cerebri tam simplex esse debet, quam fieri potest, quod etiam de fasciis valet, vti ORIBASIUS iamiam cognouit.

Vltima demum sectio de extrauafatione et com- p. 229. motione agit. Harum signa cum plerumque adeo ambigua sint, tota haec doctrina summa adhuc obscuritate laborat. Est quidem aliquod discrimen in p. 233. eo positum, quod symptomata a commotione cerebri protinus post illatam laesionem, ea contra, quae ab humore, extra vasa misso, oriuntur, elapso demum aliquo tempore, se prodant: sed posteriora symptomata saepe aequè subito adsunt, ac priora. In re adeo dubia, si ne minimum quidem signum externum indicii loco quodammodo esse possit, vnicum p. 238. remedium in euacuationibus, per crebras sanguinis missiones atque alui ductiones praestandis, situm est: si autem locus externus laesionis patet, cranium perforari oportet, quamquam certi non sumus, fluidum, p. 239. extra vasa missum auferri, hac operatione posse; quod vberius Cl. Auctor contra eos defendit, qui hoc remedium in eiusmodi casu, velut incertum, repudiant. Omnium optimum est, si humor effusus inter cal- p. 247. vam et duram matrem haeret: si inter vtramque

cerebri membranam, incisio durae matris difficiliorem omnino res est, neque adeo leuiter tractanda, quamquam eam felici successu peractam, Cl. Auctor commemorat.

- p. 254. Commotio cerebri nonnisi negatiuis signis dignoscitur, ideoque difficillima est cognitio. Communis opinio, internas cerebri partes tanto minus laedi, quanto plus cranium patitur, et vice versa, quamquam saepe vera deprehensa fuit, vniuersalem tamen regulam constituere nequit. Cum commotio sola adest, omnia, quae adhiberi possunt, auxilia in minuendis, per sanguinis missiones et purgantia humoribus, in quiete et strictissima tenuissimaque diaeta consistunt. Tandem de effectibus p. 258. trepanationis in formatione cicatricis, et de faustaeque ac infelici euentu eiusdem differitur.

- Pergimus nunc ad alterum tractatum Cl. Auctoris, de fracturis et luxationibus, qui sua sponte in tria capita diuiditur, nimirum de fracturis simplicibus, de iisdem complicatis, et de luxationibus. Potissimum autem, vt in toto opere, sic praesertim in capite primo, extremitates inferiores respiciunt. Neque extensio neque contraextensio, vulgarem in p. 13. modum suscepta, Nostro arridet: ossis enim fractae partes per se non mouentur, sed tantum musculi adhaerentibus cedunt; hinc primarius finis eo tendere deberet, vt musculis requies conciliaretur, quod p. 17. certe membrum extendendo non attingitur. Inde adeo facilis est repositio fracti humeri, quoniam aeger et chirurgus vna eo allaborant, vt brachium in statum flexionis redigatur: inde, qui femur fractum gerunt, ipsi sua sponte eum situm eligunt, quo genu flexo, et femore extrorsum collocato, musculi non agant. Hoc imprimis tunc attendendum est, cum p. 19. fracturae tumor superuenit, qui extensione musculorum non potest non augeri. Relaxatis contra musculis

scul

sculis, relaxatio protinus, neque adeo multo temporis requisito, succedit.

Inter medicamenta, parti laesae applicanda, p. 20. emplastra sic dicta roborantia prorsus reiicit: siue autem illa sub forma cerati, siue epithematis adhibeantur, eo tamen respiciendum est, ut semper commode tolli possint sine eo, quod membro indovllo modo vis inferatur.

Fasciae triplicem ob finem applicantur, ut nempe fractura rite contineatur, fluxus humorum reprimatur aut praevertatur, et callus regularem formam consequatur: sed eae ipsae, quamquam necessariae omnino sunt, tamen non praecipuum, sed accessorium tantum auxilium praebent, et in illarum applicatione, quod primum momentum spectat, sedulo omnino cura habenda est, ne membro ipsi oneri sint, aut saepius renouandae coalitum ossis impediant. Quod ad secundum attinet, tumor omnis, licet aliquem eius gradum admittant chirurgi quidam, omnino alienus est ac noxius. Quoad calli formationem, eius excrescentia non a solo nimio affluxu succi nutrientis, in os conuertendi, pendet, sed ab indole fracturae ipsius, ab eius iam reductae inaequalitate, et a situ incongruo partis laesae. Fascia octodecim capitum, aut alia ei similis, in simplici etiam fractura optima est: melius tamen est, si illa cum hac, quae longitudinaliter sub eadem parti fractae immediate apponitur, angulos acutos, quam rectos, format; quod et addita icone illustratur. p. 25. p. 26. p. 32. p. 33. p. 37.

Ferulae breuiores, et paullum tantum supra et infra laesionem eminentes, non nisi linteorum comprimantium vices gerunt, neque hoc adeo bene, cum iis duriores sint: verum quia usus earum is esse debet, ut totum membrum firmum teneatur, neque tamen fractura vilo modo comprimatur, longiores

- effici debent, et non nisi duae, in utroque latere una, applicari, ita quidem, ut femore fracto altera earum a coxa ad malleolum externum, altera paullo
p. 43. breuior ab inguine ad malleolum internum; in crure fracto utraque a genu ad malleolum externum et internum, protendatur.
- Maxime necessarium momentum in situ membri, repositione iam facta, positum est, qui idem esse debet, quam sub repositione ipsa, nimirum in statu flexionis, musculis relaxatis. Hoc postmodum cubiti, femoris et cruris vel alterutrius ossium huius exemplis demonstratur. Copiose postmodum hanc methodum
p. 44. contra obiectiones, ipsi faciendas, Noster defendit, eiusque imprimis utilitatem eo in casu ostendit, ubi fractura fibulae cum luxatione tibiae coniuncta est, quod etiam iconae adiuncta clarius redditur. Duo
p. 57. tamen casus sunt, in quibus flexio membri laesi adhibenda non est, nempe fractura olecrani et patellae. Sed uterque in eo respondet iis, quae hucusque diximus, quod, extensione membri facta, musculi, parti fractae adhaerentes, relaxantur. Rigiditas genu, post fracturam patellae relicta, non extrauolato nimia copia succo nutritio, callum praebenti, sed longius protractae quieti articulationis ipsius, iniuriae, ligamento illatae, et indoli fracturae ipsius
p. 64. adscribi debet.
- Denique paucis notionem partis prominentis ossis fracti exponit Noster. Certum est, in osse fracto alteram partem prominere, alteram deprimi: ergo scire oportet, priorem situm naturalem seruare, neque igitur deprimi debere, sed posteriorem in statu praeternaturali versari, atque ideo chirurgi operam in eo ponendam esse, ut membro, in iustum
p. 66. situm collocato, pars depressa eleuetur, adeoque, disiunctis partibus, debita aequalitas reddatur, quod primo clauiculae exemplo docetur, et postmodum ad pedis fracturas applicatur.

Progredi-

Progreſſimur ad tractationem de fracturis complicatis, in qua primo ea exponuntur momenta, P. 73.
 quae amputationem exigunt, quae tempeſtue fieri debet, antequam gangraena altius ſerpens, et fractae aegri vires eandem ſucceſſu ſperato priuent: nimis enim rara, ex mente Cl. Auctoris, ſunt exempla, in contrarium adducta, quam quibus cum aliqua ſpe proſperi euentus inniti poſſimus. Si vero ſpes aſſulget, nos huic operationi ſuperſedere poſſe, reſpoſitio fracturae vel facilior vel difficilior eſt, cum ob generalem huius laeſionis naturam, tum ob particularem diſpoſitionem oſſis ratione coniuncti vulneris. In fractura obliqua rarius, et nonniſi ſumma urgente neceſſitate, opus eſt, partem acutam protruſi P. 79.
 oſſis ferra reſcindere: duo alia auxilia ſaepe reſpoſitionem fracturae melius iuuant, nimirum ſitus membri fracti mutatus, qui relaxationi partium faueat, (omnino enim et huic conuenire, quae prius de fractura ſimplici dicta ſunt, facile quiſque perſpicit), et ubi hoc non ſuffecerit, dilatatio vulneris. In cura P. 86.
 fracturae compoſitae non eadem ſemper remedia applicanda ſunt; cataplaſmata enim emollientia, quae partibus laeſis, multum cum dolore tumentibus, egregiam opem ferunt, neceſſariamque tunc temporis ſuppurationem excitant, in mitiori vulneris ſtatu aliena ſunt, ubi potius diſcutientibus opus eſt, iunctis ſimul venaeſectionibus et regimine anti-phlogiſtico; ut, quantum fieri poſſit, impetus inflammationis auertatur; qua methodo ipſe Cl. Au- P. 98.
 ctor uſus ab eiusmodi fractura feliciffime conualuit. Prolixè poſtea totam curandi methodum, ſi ſuppurationis accedat, deſcribit, et caute monet, ne regimine anti-phlogiſtico et remediis relaxantibus iuſto P. 97.
 diutius inhaerentes, corpus nimium exhauriamus, ſed opportune ad roborantia tranſeamus.

- Tristior et casus, vbi gangraena aut sphacelus accedit; vbi, gangraena iam praesente, amputationi nullus amplius locus est, siquidem ne vnum quidem euasisse Cl. Auctor vidit: videndum potius, vtrum natura vlllo modo, in separanda parte demortua, iuuari queat, quod pro diuersitate corporum, vulneris, caussarum gangraenae cet. variis omnino remediis efficiendum est, de qua ergo re particularia praecepta exhiberi non possunt. Antisepticorum stimulantium applicationem et scarificationes partium, quibus gangraena imminet, Noster reiicit.
- p. 102.
- p. 106. Ex his tandem, quae copiose disputauit, tria esse momenta temporis, colligit, amputationi idonea, nempe, vel immediate post illatam laesionem, priusquam inflammatio inualuerit; vel, cum, gangraena et sphacelo subsequutis, partes mortuae perfecte separantur; vel, cum larga suppuratio vires exhaurire lentamque febrim inducere minatur: quae momenta rite inter se distingui et ad administrandam operationem caute obseruari oportet.
- p. 108. Eadem principia, quae in doctrina de fracturis adeo insignis vsus esse monstrauebat Noster, etiam ad doctrinam generalem de luxationibus refert, ostendendo, musculorum adhaesionem et actionem praecipue in iis attendendam esse, quibus tamen considerationem ligamentorum, cartilaginum et partium earum, quae synouiam suppeditant, accedere oporteat. Postmodum generalia quaedam axiomata, ad doctrinam de luxationibus pertinentia, stabilit, quae tamen omnia recensere non possumus. A ligamentorum capsularium, quae multum cedunt extendique se patiuntur, priusquam rumpantur, laceratione non adeo multum incommodi metuedum esse monet.
- p. 115.
- p. 116. In reponenda luxatione tota res eo debet redire, vt omnis vis in hac operatione adhibenda ad alteram extremita-

extremitatem ossis luxati ipsius applicetur, neuti- p. 116.
 quam vero extremitati luxatae ipsi, aut ossi sano ad-
 iuncto. Ultima regula haec est, eaque omnino at- p. 124.
 tentione dignissima, ut quaecumque violentia ad re-
 ponendam luxationem requisita fuerit, non nisi per
 gradus adhibeatur et intendatur. Omnia haec axio-
 mata multis exemplis, ab auxilio tam manuali, quam
 per machinas, huic fini destinatas, praestito, petitis, ex-
 actissime illustrantur.

Summo cum iure huic operi Cl. POTT aliud
 recentius, aliud itidem celeberrimi Anglorum chirur-
 gi subiungimus, quod huius primarius finis ille vi-
 detur fuisse, ut varia, quae prior proposuerat, accu-
 ratius examinarentur; imo suo modo refutarentur;
 quod tamen ita quidem factum esse fateri debemus,
 uti virum doctum et ingenuum decet. Est autem
 is eius titulus:

VII.

Observations upon Mr. POTT's general remarks on fractures, etc. in three letters to a young surgeon intending to settle in the Country. With a postscript, concerning the cure of compound dislocations; in which the usual method of treating wounds of the tendons and ligaments is briefly considered. By THOMAS KIRKLAND, Surgeon. London, Printed for T. Becket and P. A. De Hondt 1770. 8. mai. pagg. 90. sine introductione.

i. e.

Observationes super Cl. POTT annotationes generales de fracturis cet. in tribus epistolis, ad chirurgum iuniorem, sedem fixam in patria sibi constitutum, directis, cum postscripto de cura luxationum complicatarum, in quo simul methodus, usu recepta, tendinum, ligamentorumque vulnera tractandi, breuiter consideratur.

p. 1. **I**n epistola prima non, nisi de nouitate vel antiquitate doctrinae Cl. POTT de fracturis, disseritur; et quamuis varii Auctores eandem iam indicauerint, imo iisdem quoque principiis, in tractandis laesionibus, usi fuerint, iusta tamen illi laus denegari nequit, eum totam hanc doctrinam omnium primum, methodo scientifica, proposuisse.

p. 8. In secunda epistola doctrina eius, de amputatione in fracturis complicatis grauioribus, protinus instituenda, impugnatur. Cl. Auctoris argumentum hoc est: gangraena extimescenda vel localis est, vel vniuersalis;

vniuersalis; prior curari poterit, membro simul ser-
uato; posterior aegrum trucidat, licet quoque
membrum amputatum fuerit. In duabus ergo istis
gangraenae et subsequenteris sphaceli speciebus, rite
inter se distinguendis, totius cardo rei positus est.
Sphacelum ab iniuria externa, quantacumque eademp. 17.
fuerit, ortum, sanationem admittere, praeter alios
effatum Cl. GOOCH post quadraginta annorum in
arte exercitium testatur: quod autem Cl. POTT
hoc adeo raro contingere viderit, dispositioni ae-
grorum in nosocomiis adscribendum est, qua faci-
lius, ob non satis renouandum aerem compluresque
alias causas, resolutioni humorum morbisque putri-
dis obnoxii redduntur, quam aegri, extra nosocomia
versantes; qua etiam occasione varia monentur, de p. 21.
moderandis sanguinis missionibus et nimio diaetae ri-
gore, quibus saepe adeo facilis resorptio puris, a vi-
tio locali, adscribi meretur.

In tractatione, de deligandis fracturis complicatis p. 22.
Noster ea, quae Cl. POTT dixerat, supplet,
docens, qua ratione vulnus in hac vel illa regione
partis laesae, v. c. extrorsum, deorsum cet. existens
tractandum sit, quo neque membrum sub quauis de-
ligatione moueri debeat, neque pus, profundius ser-
pendo, sinus formet, sed libere exire possit: quae ta-
men regulae ex praesuppositis generalibus satis
patent.

Immediatus coalitus vulneris rarissime euenit, sed p. 29.
frequentissimum est suppurationem excitari, quae lin-
teis ficcis, vti Cl. POTT suaferat, non adeo bene adiu-
uatur, quam balsamis digestiuis, statui aegri accomoda-
tis, tunc autem, cum suppuratio stabilita est, lintea sicca
vel sola, vel ex tinctura myrrhae leuiter expressa, melius
omnino conducunt. Quo fasciarum apparatus pu- p. 34.
rus feruetur, neque pus copiosius deligationem, cre-
brius suscipiendam, exigat, Cl. GOOCH lintheum ce-
ratum

raturum in parte exteriori pannorum comprimentium applicari iussit, cui Noster spongas tum supra, tum infra vulnus addit, quae pus emanans fugendo, attrahant.

- p. 35. Ferularum vsum in principio curationis saepe suspectum reputat, et non, nisi sub finem, eiusdem prosperum effectum iis tribuit. Vbi pars affecta roboranda est, plus a fasciis, sensim arctius adstringendis,
- p. 36. quam a medicamentis roborantibus solis expectat, et postea illius remedii vsum in praecauendis sinibus declarat, ac denique illam epistolam annotationibus quibusdam generalioribus admonitionibusque utilissimis omnino, ad iuniores chirurgos directis, ut theoriae artis plus operae impendant, neque in solis addiscendis *operationibus* sic dictis *capitalibus* acquiescant, claudit.
- p. 47. In epistola tertia doctrina Cl. *POTT* de luxationibus iustis itidem laudibus condecoratur, et consensus eius cum aliorum celeberrimorum chirurgorum praeceptis declaratur, memorat nonnullis exemplis prosperarum curationum in eiusmodi casibus
- p. 57. ab Auctore Cl. ipso peractarum. Luxatio femoris, sursum et retrorsum facta, rarissima est, si vquam possibilis, et forte scriptores, qui eiusdem mentionem fecerunt, nonnisi *HIPPOCRATEM* exscripsisse existimandi sunt, qui tamen eam potius ex ingenio finxisse, quam ipse observasse dicendus
- p. 60. erit. De luxatione humeri fuse differit Noster, et varia, in eodem reponendo, observanda proponit, quae vero omnia ex theoria, prius proposita, facili negotio fluere videntur. Idem quoque de luxationibus aliarum partium, brevius additis, patet.
- p. 63.
- p. 68. In postscripto Cl. Auctor primo in loco quodam Cl. *POTT* haeret, ubi ille de luxatione complicata, seu cum vulnere partium exteriorum coniuncta, per quod malleolus internus protruditur, differit,

differit, qui casus non raro fatali gangraena terminetur, ne amputatione quidem, licet tempestiva, praecauenda. Cum autem haec nonnisi localis esse possit, eadem hic valere Noster monet, quae superius, de hoc argumento, proposuerat. Licet omnino Cl. ГООСН adstipuletur, luxationes complicatas peiores esse fracturis eius generis, felici tamen cum successu amputationem euitari posse arbitratur, si P. 70. ex mente eiusdem viri protrusa ossis pars ferra resecari queat: cuius asserti veritatem obseruatione, a se ipso facta, confirmat.

Disputat denique de noxiis effectibus olei terebinthinae et similium in ligamentorum ac tendinosarum partium laesionibus, hacque occasione in notiones, quas veteres vocibus *nerui*, *tendinis*, *ligamenti* cet. tribuebant, inquit, easdemque inter se comparare studet, ostendens simul, quam perniciosos in medendo effectus peruersa harum vocum interpretatio, atque inde enata confusio, produxerit. Quae tamen omnia, etsi lectu iucunda et scitu vtilia, nunc tamen recensere non possumus, cum in id tantum alloborandum nobis esse duxerimus, ut potiora huius libelli argumenta Lectoribus nostris exhiberemus.

VIII.

Diff. inaug. de vsu salutari extracti aconiti in arthritide, obseruationibus comprobato, Praeside PHILIPPO ADOLPH BOEHMERO Medicin. Anatom. et Chirurg. Prof. P. Ordin. etc. Auctore *Ioanne Friderich Andrae*. Hal. ad Salam. 1768. 4. pl. 4¹.

Variis rebus, ad Stoerckiana *) medicamenta pertinentibus, praemissis et controuersis nonnullis

*) v. secundae dec. comment. nostr. supplem. I. p. 46 sq.

nonnullis contra ea commemoratis, ad aconiti, quod tiam Cl. STOERCKIUS*) disquisiuit, vires in arthritide, perscrutandas sese Cl. Auctor accingit. Ad hanc rem efficiendam viam sibi pandit tribus exemplis, ex quibus aconitum salutare esse remedium in arthritide elucet.

p. 10. Facta sunt haec experimenta in collegio clinico, quod Halae ad Salam floret, duce b. JUNKERO. Exhibebantur nimirum tribus aegris, arthritide laborantibus et extremitatum usu potissimum destitutis, pulveres, ex concharum praeparatarum drachmis quinque et totidem extracti aconiti granis compositi, quibus accuratae mixtis, et, in triginta doses aequales diuisis, mane et vesperi vna deglutienda erat ab aegro dosis. Elapsis vix octodecim diebus, arthritis imminuebatur, et aeger sanitatem pristinam nanciscebatur. Alterum exemplum erat aegra, quadraginta et quatuor annorum, quae post infelicem febris catharralis decursum, arthritide vexabatur graui ac per aliquot iam annos saeviente et vehementer dolente cum tumoribus colli aliarumque corporis partium. Variis medicamentis frustra adhibitis, horum pulverum viginti propinabantur, arthritis fiebat remissior et tumores subinde discutiebantur. Ob febris lentae autem ortum et sudoris copiam, diuturniori aconiti usui non inhaerere quidem potuit, attamen arthritis tanta cum molestia non rediit. Tertius aeger erat vir, viginti quatuor annorum, qui, vagis arthriticis doloribus ante quatuor annos perpeffis atque curatis, dirissima corripiebatur arthritide cum tumoribus et articulorum contracturis, quae diaphoreticis, diureticis, alexipharmacis, moderantibus, antispasmodicis, antimonialibus parum mitigata est. His vero sepositis, per hos pulveres aeger ita sanitati penitus restitutus est, vt, praeterlapsis duabus septima-

*) v. comment. nostr. Vol. XI. p. 237. seqq.

septimanis, omnibus suis negotiis interesse posset. Quod ad effectus attinet, hi commemorantur: largus sudor, anxietas quaedam cum leuamine, interdum diarrhoea.

Quamquam adhuc plura in promptu habet Noster exempla, de salutari aconiti usu in arthritide, tamen haec sufficere ad probandam sententiam: aconiti extractum, parca licet in dosi datum, breue intra tempus arthriticos sustulisse dolores ac tophos, ac potius id quaerendum esse arbitratur: num aconitum in omni arthritide conducat? Quapropter arthritidem Cl. Auctor contemplatur, eamque ita definit, vt sit dolor articulorum acutus, non tamen inflammatorius, a causa proxima interna ortus. De sede arthritidis inter medicos disputatur quidem, a Nostro tamen illa verissima iudicatur, quae adscribitur isti membranae nerueae, quae ligamenta et tendines obtegit. p. 13.

Causa itaque arthritidis, in irritanda hac substantia neruea, a Nostro ponitur et cernitur in congestione humorum sola, eorum spissitudine, acrimonia multiplici, acrimonia humorum, cum spissitudine coniuncta, et consensu partium. His pertractatis, ad aconiti vires, cum causis arthritidis conferendas, progreditur. Ac primum quidem vires considerat. Aconitum solida irritat absque tamen eo, vt, si interne exigua dosi datur, dolorum hinc aut prouentus aut incrementum sit metuendum. Aconiti vis est resolutoria. Varias mouet excretiones ac nervorum actionem imminuit, quae in primis ex anxietate, quam aegri post aconiti usum sentiunt, elucet, et a Cl. Auctore ex HELMONTII obseruationibus probatur, nec non aconiti vires, opio analogas, arbitratur. p. 17.

Iam vires aconiti cum causis arthritidis non diu multo ante commemoratis contemplatur Cl. Auctor. Nos hic de vltima causa huius morbi, quae in consensu p. 21.

sensu partium spectatur, videamus. Est vero ea arthritidis species, quam primarum viarum excitat consensus. Non negat quidem Cl. Auctor emetica et laxantia hic conducere, putat tamen his posse narcotica adiungi. Consueta narcotica aut opium non eligit Noster, quoniam primarum viarum vim infringunt, et earum excretionem languidam reddunt. Quod si vero narcoticum tale exhibetur, quod opio analogum est, nec primis viis nocet, suadet Noster eius usum. Ac cum aconitum hoc praestet, praetereaque impuritates per aluum educat, illud et huic arthritidis speciei conuenire annuit Cl. Auctor.

p. 29. Quamquam autem hic intelligitur, aconitum ita in corpus agere, ut caussis arthritidis generalibus omnibus propellendis inferuire queat, licet non in aequali gradu, tamen cuiuscunque arthritidis curatio ab aconito non expectari potest. Nam in haereditaria, senili, aliisque arthritidis speciebus nihil praestare, quid, quod nocere posse, Noster autumat. Quemadmodum itaque Cl. Auctor aconitum non omnium naturam ferre lubenter largitur, sic tanto excellentius hoc remedium habendum esse arbitrat, quanto certius est, illud non solum causas arthritidis tollere, sed et eiusdem reliquias, e. c. topfos partiumque immobilitatem superare. Quapropter et quaerit Noster, nonne aconitum inueteratae podagrae atque rheumatismo, colicae pictonum accedenti, conducat?

p. 31. Tum ad alia, quae non omittenda et usui aconiti iungenda sunt, auxilia Noster progreditur. Haec sunt, habita tamen aegrorum et variae arthritidis ratione, venae sectiones, scarificationes, hirudines, emetica, purgantia, massam humorum depurantia et diluentia, roborantia aliaque.

p. 32. Tandem Cl. Auctor monita quaedam circa usum aconiti addit. Ac primum quidem parca dosi, quae subinde

subinde augeri potest, fit ab initio propinanda, ne anxietas intolerabilis, febres aliaque incommoda inde nascantur. Haec enim si accidunt, a diuturniori illius vsu desistendum esse Noster putat. Dein inter eius vsu, omnia, quae digestionem reddant difficilior, ut oleosa, pingua, acidaque, sunt euitanda et iuscula tenuia, mucilaginosa, decocta resoluentia, copiose suadenda. Porro aere tepido, ad diaphoresin conseruandam, aegri sunt tenendi. Ac si forte inter vsu aconiti nimis increaserent anxietates, aut sudoris nimia fieret profusio, quaerit Noster, an non liceat emulsionem et alia oleosa interponere, atque Ill. LINNAEI mentionem facit, qui ex aconito, cum pauxillo olei commisto, nullum obseruauit detrimentum.

IX.

SAMUEL ABRAHAM. REINHOLD diff. inaug. de aconito napello Argentorat. 1769. 4. pgg. 42.

Aconiti antiquitate, etymologia atque botanica p. 2: descriptione generis aequae, ac specierum eiusdem praemissis, chemicam illius disquisitionem addit Cl. REINHOLD. Ac cum ob raritatem huius plantae impeditus sit, quo minus cum diuersis eiusdem partibus institueret experimenta, in foliorum praecipue succum et extractum aconiti Cl. STOERCKII chemice inquisiuit.

Foliorum succus expressus atro rufus, vnguino-p. 14. fus, viscidus, ingrato odore et leniter adstringente et aliquantis per, austero vrenteque sapore praeditus, nec cum variis alcalinis nec cum diuersis acidis et fortioribus efferuescit. Quo cum oleo tartari per deliquium ad partes aequales mixto, plurimae vnguinosae, saponis ad instar, ex viridi flauae lamellae formabantur permanentes insimulque odorem florum

berberum hircosum, vase aperto autem, euanescentem, spargentes. Ex huius succi expressi vnciis circiter viginti et duabus leni igne ad syrapi spissitudinem extractum Noster parauit, quod colore, odore atque sapore parum differebat. Tum illud redigit ad extracti vegetabilis soliditatem, quod et molli-
tiem viscidam, colorem ex fusco rufum et saporem salsum, leuius acrem et nauseosum, odorem sat fortem, aliquatenus virosum et tritae plantae odori similem, prodebat. Hoc, hypocaufto et vasi vitreo, haud arcte clauso, commissum, hebdomade vix elapsa, humiditatem aeris adeo copiose attraxerat, ut magma badium, tenax et viscidum, ut prius olens et sapiens, deprehenderetur. Ad huius magmatis extractum aquosum obtinendum sumsit Noster eius vnciam dimidiam, cum totidem aquae, saepius et tam diu denuo affusae, quam haud amplius tincta foret, et tam diu quoque lente digessit. Color huius erat atro rubens, sapor leniter falsus parum acris et adstringens, odor sat nauseosus, parum foetidus et virosus. Nostro videbatur. Post colaturam et euaporationem fugaces cuticulae sese formabantur et post inspissationem et exsiccationem in massam lentam splendentem, fuscam abiit, et exhibuit gummosi fatui et vix olidi, aeris humiditatem sibi vnientis, scrupulos quinque et fere dimidium. Residuum a tinctura, cum alcohole denuo satis dilutum, digestum et eius colatum, per abstractionem exsiccatum, dedit resinosi tenacis, insipidi et haud olentis, aere vix deliquescentis, inflammabilis circiter scrupulos tres cum dimidio. Remanens pulvis aequabat drachmam dimidiam forte, sapore, odore et sumtus omni effectu destitutus. Idem obtinuit Noster ex extracto **STOERCKII**.

p. 16.

His expositis, ad vires aconiti considerandas Noster progreditur. Ac primum quidem diuersas aconiti partes earundemque vires, a plerisque pro
summe

summe venenatis habitas a primis vsque ad ST O E R-
C K I I tempora persequitur, multorumque Aucto-
rum sententiam de huius plantae viribus addit atque
definit. Dein asserit, extractum napelli esse egre-
gium, validius agens et morbos quosdam breui de-
bellans, remedium, quod primum vasorum orificia
atque tractus penetrat, solida leniter stimulat, irritat,
fluida incidit, resoluit atque attenuat; dein vero se
et excretionum negotium promouet, auget, neruo-
rum et fibrarum irritabilium vim et motum ordinat,
imminuit; tandem quoque humoribus motum et te-
nuitatem iustam conciliat eosque depurat, fibris di-
uersis variam laxitatem tenuitatemque seu rigidita-
tem ac densitatem, pro structurae diuersitate et virium
ratione, inducit, quoniam spissitudines, stases, quid
quod acrimonias fluidorum mutat, abigit, viscerum
infarctus et obstructions incipientes potissimum ex-
pedit, tollit, dolores sedat, impedit ac perspiratione
aucta vel sudore, vrinae aut alui fluxu morbosa eli-
minat. Id quod a Nostro partim ex Cl. ST O E R-
C K I I de aconito obseruationibus et ex dissertatione,
quam paulo ante breuiter indicauimus, partim ex
aliis Auctoribus probatur, iisque quaedam obserua-
tiones, de aconito ab Argentoratensibus medicis non-
nullis collectas, adduntur, quas breuiter adhuc nostris
Lectoribus trademus.

Prima obseruatio est Nostro tradita a Cl. G U E- p. 30.
R I N et arthritidem attinet, quae cum saccharo
mixti extracti primum decem granis, dein viginti inter-
diu bis, interpositis laxantibus, penitus sublata est.
Perspiratione atque excretionem alui in primis aucta,
iudicari, depurari et sanari videbatur hic morbus.
Altera agit de femina, arthritide nodosa vehementissi-
ma laborante, a Cl. E H R M A N N cum Nostro com-
municata. Extracto aconiti exhibito, cuius dosis,
quinque septimanarum spatio, ad grana duo aucta
V v 2 quotidie,

quotidie, omnia in melius vergebant, cum excretion-
nes per sudorem, vrinam et aluum vna copiosissime
promouebantur cum leuamine.

P. 32.

A Cl. EHRHART sequentes Noster accepit ob-
seruationes. Femina hysterica, catamenia aegre
fluentia, multis praegressis doloribus, experta, vri-
nam spasticam atque parcius reddens, et aluo mox
fluida, mox constipata laborans, palpitationibus va-
riis, femorum tremore ac spasmis abdominalibus
vexata cum insigni horum malorum leuamine, quae
nullis remediis, multis quamuis adhibitis, cedebant,
vsa est extracto aconiti in pilulis ita, vt penitus haec
aegra sanitati sit restituta. Huic similem adiungit
morbi historiam Cl. EHRHART ac asserit, hoc ex-
tractum aconiti interdum, cum aliis remediis coniun-
ctum ac circumspecte datum hystericis, et hypochon-
driacis saepius esse proficuum. Alios duos arthriti-
cos ex Baccho et Venere curauit cum extracto aco-
niti fluidiori per saccharum lactis in pilulas redacto,
atque excretiones, supra iam commemoratas, cum
leuamine et in his est expertus Noster.

P. 35.

Sacerdos iunior, literis et lucubrationibus ni-
mis deditus, ex hypochondriis laborabat et biliosa
febre maligna cum dysenteria corripiebatur, qua non
potuit liberari a medicis. Ad hunc plane emacia-
tum, perpetuo febricitantem, sero delirantem,
omnia nauseantem, dysenteria et malo ischiadico ad-
latus sinistrum dire excruciatum, lectulo affixum,
missis adhuc aliis molestiis, vocabatur Cl. EHR-
HART. Cum roborantibus et leniter nutrientibus
hic potissimum opus esse indicaret, iis quoque vte-
batur, et ad nutriendum inprimis laudat serum lactis
tenuius, paucarum amygdalarum dulcium mucila-
gini et oleo nuptum, quod et huic aegro multum
praestitit. Nihilominus tamen malum ischiadicum

faeuire

faeuire definebat, imo vires aegri recuperatas, febre inde iterum excitata cum noctibus infomnibus, sopiebat illud. Rebus aegri itaque sic se habentibus atque in deteriora iterum ruentibus, constituit Cl. EHRHART fecum, ad aconiti vsum confugere, cum decocto graminis pro potu quotidiano. Ac cum successu felicissimo et hic illud adhibuit. Ad solitas excretiones, quae aconito promouentur, et ex antecedentibus patent, accedebat et hoc, quod decimo octauo die, inter vsum aconiti, aegri epidermis, vndique fissa, a toto corpore decederet absque vilo dolore in membranis albis, pellucidis, teneris et latis.

Tandem quoque veritati deuotus non silentio praeteriit Cl. EHRHART, se quoque hoc extractum in arthritide, rheumatismo et malo hysterico incassum quidem, attamen absque malis et incommodis, dedisse.

Tandem hic leguntur Cl. RIBE obseruationes p. 37. cum aconito in arthritide. Quibus, cum non differant a praecedentibus, curatius excerpendis, hic susperfedemus. Hoc vnum autem addemus, Cl. RIBE, cum curationem per aliquot dies interrompere oporteret, ob penuriam medicamenti, digitorum rigiditates ac dolorum reuersionem in aegra obseruasse, qui quidem, propinato iterum aconiti extracto, paulo post cessarunt; nec vnquam in hac aequae ac in reliquis aegris sunt reuersi.

His denique addit Cl. REINHOLD monitum p. 41. a Cl. EHRHART datum: extracto aconiti vten-
tibus infusa aut decocta simplicia copiose et eccopro-
tica quandoque omni octauo die esse exhibenda, in-
terdum et bis, atque vt plurimum tenuem, diluen-
temque diaetam esse vtilem.

Ex his omnibus autem concludit Noster, 'aco- p. 41.
niti radices et folia, in primis recentia, esse plantarum

venenum facile princeps, atque etiam exsiccata remedium infidum, draſticum, viroſum. Succus vero foliorum ita, vti ſupra cum Cl. REINHOLD monuimus, in extractum mutatus, ſubinde aegrotis porrectus, penetrans, leniter irritans, potentius incidens, reſoluens, diaphoreticum, ſudoriferum, diureticum, aluum ſoluens, antſpasmodicum et anodynum eſt remedium, commendandum atque ſecurum.

X.

Traité pratique de l'hydropiſie, et de la jauniffe developpé par l'experience. Auquel on a joint quelques obſervations anatomiques et pratiques de quelques médécins ſur d'autres maladies, par Mr. MARQUET doyen du Collège Royal des médécins de Nancy, revu par Mr. BUCHOZ aggregé auſſi du dit Collège. à Paris chez Humblot, 1770. 8. mai. plagg. II.

i. e.

Commentatio practica de hydropo et ictero, experientia duce expoſita; accedunt obſervationes quaedam anatomicae et practicae ſuper aliis morbis a medicis quibuſdam factae. Auctore Cl. MARQUET. Denuo edidit Cl. BUCHOZ.

Tres ſectiones, vti vel titulus edocet, liber hic complectitur, quarum prior, eaque ampliffima, varias ſpecies hydropiſ pertractat, et copioſas obſervationes practicas ſuper hoc morbo ſubneſtit; altera ſimili modo de ictero, vtpote morbo prioris ſaepe prodromo, exponit, ſubiunctis itidem obſervationibus.

vationibus; tertia obſervationes miſcellas anatomico
practicas, a medicis Lotharingiae conſcriptas, continet.

In hydropis conſideratione nouem capitibus agi-
tur de anasarca et leucophlegmatia, hydrocephalo,
hydrope pectoris, pericardii, aſcite, tympanite,
hydromphalo, hydrope vteri et ouarii, ac denique
hydrocele et hydrope labiorum externorum puden-
di in feminis.

Anasarca et leucophlegmatia gradu inter ſe dif-
ferunt, ideoque haec faciliſſima eſt curatu, quam illa:
Producitur vterque morbus a copioſiſſimis cauſſis,
quibus miſtio humorum deprauatur et ſolidorum
robur tollitur: indicationes in eo curando ad id re-
ſpiciant, vt aquae euacuentur, fibrae roborentur,
et viſcerum integritas reſtituatur, ne morbus recru-
deſcat. Si morbus vſui apozematum purgantium
remediorumque tonicorum et reſoluentium, pur-
gantibus ſubiunctis, non cedit, balneum vaporoſum
ex herbis aromaticis adhiberi debet, et poſt eius
vſum aeger fricari pannis aſperioribus, qui ſuffimi-
gia ex ſuccini et aethiopis mineralis aequalibus por-
tionibus ſuſceperunt, et bibere ptifanam diaphore-
ticam, haecque auxilia pro re nata ſemel iterumque
de die repeti; ſeruanda praeterea eſt caute diaeta,
et, morbo etiam ſuperato viſo, tonicorum et purgan-
tium moderatus vſus continuandus. Hydrocephala-
lus, ſiue externus ſiue internus fuerit, pro cauſſa
proxima effuſum in hac illaue parte capitis ſerum
agnoscit, ſiue haec effuſio a dilatatis vltra modum,
ſiue a ruptis vasis lymphaticis pendeat: cauſſae re-
motae omnes eae ſunt, quae liberum reſluxum ſan-
guinis ex exterioribus capitis partibus aut ceruice
verſus venam cauam impediunt, v. c. tumor qualis-
cumque glandularum colli, nimia conſtrictio capi-
tis, contuſiones, exoſtoſes cet. Internus oritur
etiam ab intercepta reſorptione humoris in cauitati-
bus

bus cerebri. Externus cognoscitur ex tumore molli, indolente, inaequali, si immediate sub cute est; vel magis aequali, elastico et doloroso, si inter pericranium et cranium haeret: internus vero ex proclivitate in somnum, intumescencia capitis infantilis, turgente facie et flaccescente reliquo corpore; aucto malo palpitatione cordis, difficultate respirandi, et nonnunquam abolitione visus accedentibus. Hic plane insanabilis est: exterior, si sub cute haeret, facilius curatur, quam, qui sub cranio sedem figit. Resoluentibus et euacuantibus pro conditione aegrorum variis opus est: neque externa auxilia negligi debent, inter quae cataplasma ex limacibus contusis vel per se, vel ex decocto radicum petroselini, eryngii, ononidis coctis, saepius renovandum; epithemata roborantia et adstringentia; inunctiones cum oleo chamaemeli, commendantur. Paracenthesis in vtraque specie hydrocephali externi locum habere potest; in interno autem inutilis, imo noxia iudicari debet. In externo etiam scarificationes, vesicatoria, setacea, aut, ad observationem CAROLI PISONIS cauteria laudantur.

p. 17. Hydrops pectoris interdum vtramque, interdum alterutram eius cavitatem, interdum pericardium, de qua specie postmodum, interdum duplicaturam mediastini, interdum spatium inter pleuram et costas occupat. Causa eius proxima in ruptura vasorum lymphaticorum seu chyloforum sita est, quae a nimium distentis vasis sanguiferis maioribus pendet: hic effectus potissimum a lentore humorum, aut obstructione glandularum lymphaticarum proficiscitur, quae mala innumeras fere causas agnoscunt. Diagnos morbi difficillima est, isque saepe cum asthma et catarrho confunditur: praecipua autem signa sunt situs horizontalis in lecto plane impossibilis ob suffocationis metum: somnus brevis

brevis, ob eandem causam subito iterum turbatus; necessitas sedendi inclinato antrorsum corpore, quo melius respirent; sensus angustiae pectoris et difficilior versus vesperam respiratio: in progressu morbi tussicula et febris exigua, tumor pedum, doloris sensus in parte anteriore et inferiore pectoris, ad diaphragmatis adhaesionem se extendens; denique paucis ante mortem diebus manus inflantur: vrina per totum morbum non mutatur, neque appetitus perit. Lentus ut plurimum morbus est, nonnumquam tamen subito suffocans. Difficillime etiam curatur: si in principio paracenthesis instituatur, spes aliqua superest, morbum cathartici et diuretici vitum iri: nonnullae tamen Cl. MARQUET observationes felicem eius medelam demonstrant, priori etiam auxilio non in usum vocato.

Hydrops pericardii causis generalibus iisdem, a p. 22. quibus aliae species nascuntur, originem debet: oritur post pleuritidem, asthma, phthisin et inflammationem membranae huius: cognoscitur ex palpitatione, tremore, animi deliquio, respiratione difficili, si corpus potissimum lateri incumbit, tussis dolore et oppressione circa partem anteriorem pectoris, pulsu plerumque duro et forti, et sub ipsa palpitatione sensu fluctuationis inter tertiam et quintam costam. Solum auxilium in paracenthesi pericardii, intra tertiam et quartam costam sinistri lateris instituenda positum est.

Ascites lacteus seu chylosus rarior morbus est, p. 23. frequentior serosus: causa proxima itidem in nimia dilatatione vel disruptione vasorum lymphaticorum quaerenda, cuius praecipuae causae ad scirrhus viscerum abdominalium, ad nimiam copiam potulentorum aquosorum assumptam, ad impeditas excretiones sudoris, transpirationis insensibilis, sanguinis per haemorrhoides vel menstrua, ac denique ad

compressa vasa maiora redeunt. Nimis dilatata vascula lymphatica in sectione cadauerum saepe, sub specie hydatidum, in conspectum veniunt. Symptomata praecipua ascitis sunt tumor oedematofus pedum, femorum, genitalium ceterum. venter constipatus, vel ob defectum bilis, vel ob tenacitatem muci intestinalis; diarrhoea in aliis, aut ob chylicationem laesam, aut ob acredinem succi intestinalis a bile abundante; sitis ingens ac tussis sicca, ob salivam tenaciorem et falsiorem; respiratio, sub situ supino, difficilis; vrina parca et saturata; macies insignis partium superiorum, inflatis inferioribus. Signa incipientis ascitis sunt inflatio pedum, vesperi aucta, mane dissipata, sensim ad abdomen usque ascendens, quod tunc percussum, fluctuationis sensum tactu et sono prodit; confirmato morbo, accedit febris lenta, somnus parcissimus, appetitus nullus. Inter signa, quae eum incipientem annunciant, haemorrhagiae etiam pertinent: differt a grauiditate, quod in ascite tumor ventris non est elasticus, et vbiuis aequalis, secus ac in illa. Diarrhoea in principio morbi accedens eum saepe leuat, et bonum signum est: quae autem eidem inueterato superuenit, relaxatas tunicas intestinorum futuramque gangraenam demonstrat. Ad curandum morbum opus est, ut primo vasa obstructa referantur, quo liber circulus humorum restituatur, posteaque humores, extra vasa missi, educantur. Prius aperientibus et resoluentibus praestatur, posterius hydragogis, iisque in subiectis robustis fortioribus: tandem ad tonica, v. c. rheum, in aqua absinthii infusum, progrediendum est. Diaphoreticis in hac morbi specie nullus est locus. Calor, febris et tussis saepe in usu aperientium et purgantium attentionem insignem postulant, ne morbus iis exacerbetur. Paracentesis in eo inprimis morbo utilis est, qui a suppressa vrina enascitur, quam-

quamquam raro absque aliis remediis morbum tollit.

Tympanites ab ascite in eo differt, quod venter p. 33.
durior paulum est, et percussus, sonitum, tympani
ad instar, percipiendum praebet, neque pedes in-
flantur: reliquum corpus magis macilentum est,
ventrisque dolor acerbior. Obnoxii huic morbo
sunt, qui flatibus aut vermibus vexantur, quibus
haemorrhoides non rite fluunt, aut, qui febribus
male curati sunt: item feminae, abortum passae. Olei
amygdalarum dulcium internus et clysterum emol-
lientium cum foeniculi vel anisi feminibus externus
usus, applicato simul super abdomen emplastro fa-
ponato BARBETTI, curationem auspicari debent:
quibus non sufficientibus, ptisana emolliente uten-
dum est, et aluus, purgante medicina, ex folliculorum
senae drachmis tribus, pulueris cornachini drach-
ma dimidia et syrupi de spina cerui vncia dimidia, du-
cenda, continuatis simul remediis externis; tandem
neque inde minuto tumore, abdomini imponenda
aqua gelidissima vel glacies, quo aer condensatus
spatium minus occupet. Vitanda sunt alimenta fla-
tulenta, et morbo quoque superato, omni mense al-
vus purganda. Hydromphalus cognoscitur infla- p. 35.
tione umbilici, adeo, ut cutis pellucida sit: absentia
doloris, inflammationis, incarcerationis, nauseae
cet. eum ab hernia umbilicali distinguit. Pertun-
denda est cutis foraminibus minoribus, quo stag-
nanti humori exitus paretur, et fots calidus adhi-
bendus ex aqua calcis, in qua lapis medicamentosus
CROLLI solutus fuerit, aut emplastrum Norim-
bergense. Alii speciei hydropis superueniens non-
nisi hac curata tollitur. Hydrops vteri distinguitur p. 36.
ab ascite, quod tumor non integrum abdomen, sed
inferiorem tantum partem occupat; neque vultus
adeo pallet aut marcescit, neque siccitas linguae sitis-
que

que tanta est, et in genere omnia symptomata leviora sunt. Menstrua quidem aequae suppressa sunt, ac in grauiditate, sed defectus lactis in mammis, quae collapsae sunt et molles, sensus nullus motus infantis, sed tantum fluctuantis aquae, dolor et pondus maius in abdomine, tensio aequalis abdominis, et color faciei peior, quam in grauiditate, sufficientia signa distinctionis praebent. Cura eadem est, quae ascitis. Hydrops ovariorum difficilius cognoscitur: ubi adest, semper hydropem vteri coniunctum habet. Medela etiam cum medela ascitis conuenit, nisi quod lenioribus remediis opus sit, iisque non adeo diu insisti oporteat. Hydrocele saepe, si viscerum nulla subest labes, sola paracenthesi tollitur: aliis speciebus hydropis accedens, iisdem remediis, quibus hae, curatur; sin a nullo morbo primario pendeat, aqua secundaria calcis in epithematibus applicanda et aeger ptisana leniter resolvente tractandus est; conducunt etiam emplastrum de cumino, saepius de die renouatum, et lintea spiritu matricali calido imbuta: his non sufficientibus, aeger purgandus est, et ne hoc quidem remedio discussa inflatione, ad paracenthesin progrediendum. Hydrops labiorum externorum pudendi in feminis iisdem remediis leniter resoluentibus indiget, ac denuo incisionibus in ipsas partes factis, tollitur; potissimum grauidis hic morbus molestus esse solet.

P. 41. Pars secunda huius tractationis de hydrope tria capita complectitur, quorum prius sistit quadraginta quinque obseruationes Cl. MARQUET, alterum duas consultationes EIUDEM, et tertium duas obseruationes Cl. BUCHOZ, quae omnes morbi huius species concernunt, et quidem ordine chronologico, non ad nexum doctrinae, ordinatae sunt. In his recensendis breuitate uti poterimus, cum eo
prolixius

prolixius iam methodum medendi, qua Cl. MAR-
QUET vsus est, in ipsa morborum recensione de-
clarauerimus. Frequenter vtitur puluere hydrago-
go ad purgandos hydropicos, qui constat ex turpe-
thi vegetabilis, mechoacannae, hermodactylorum,
radicis ialappae, ac diagrydii singulorum drachmis
duabus, et cremoris tartari vncia vna; dosis a di-
midia drachma ad quatuor scrupulos, vel per se, vel
adiuncta manna, sicut etiam proportionem horum
ingredientium inter se inuicem nonnumquam mu-
tat. Alterum remedium purgans, eidem fini infer-
uens, ex librae aqua vitae Occitanienfis consistit, in
qua vncia vna radicis ialappae digeruntur, additis
nonnumquam aromatibus quibusdam et cremore
tartari; sub finem vel saccharum, vel syrupus vnus
aut alter, interdum etiam aqua cinnamoni adduntur,
huiusque remedii vnciae duae ad tres pro varietate
circumstantiarum exhibentur. Decoctum illecebrae
vel solum vel melle temperatum, remedium exter-
num efficacissimum est ad vlcera cacoethea et ipsam
gangraenam. In hydrope vniuersali iam dicta tin-
tura ialappae; addito syrupo capillorum veneris
gratior reddita, cum quarto quouis die ad vncias
duas fumeretur, altera iam dosi exhibita, taeniae par-
tem quatuor vel quinque pedum longitudine, et cum
post octiduum demum eadem dosi repetita fuisset, rur-
sus aliam partem longitudine vlnae Parisiensis, sic et tres
subsequentes doses iterum partes eiusdem expulerunt,
ita, vt pars, quae vltima vice excerneretur, duas cum
dimidia vlnas longitudine aequans et extemplo mor-
tua, croceum colorem et figuram admodum irregu-
larem referret: reliquae partes antea excretae par-
tim mortuae erant partim, etsi capite destitutae, vi-
uentes: singula articulatio peculiari motu gaude-
bat, adeo, vt vero simile videretur, vermem istum
nonnisi

nonnisi ex pluribus minoribus inter se cohaerentibus constare.

- p. 102. Anasarca cum symptomatibus grauissimis, haemorrhagiam vteri sequuta, indicationum inuentionem difficillimam reddidit, cum hic morbus adstringentia et consolidantia, ille e contrario aperientia et euacuantia postulet: coniunctis tamen remediis adstringentibus et diureticis, nempe ptisana ex fructibus cynosbati, radicibus altheae, bistortae, tormentillae, symphyti et glycyrrhizae: ex aqua minerali martiata coctis, interposita per intervalla drachma vna pulueris hydragogi, supra descripti: diuresis restituta et largior reddita fuit, et
- p. 110. aegra conualuit. Grauissimus etiam anasarcae status in femina, partui proxima et ad incitas iam redacta, Nostrum permouit, vt forfice in partibus exterioribus vaginae incisiones quasdam faceret, quibus insignis copia aquarum stagnantium effluxit, infans ex vtero exiit, et femina conuenientibus remediis seruata fuit. Infans quinque annorum itidem morbos contrariae curationis complicatos inter se ostendit, ex dysenteria vehementissima in anasarcam, marasum, lienteriam, famem caninam et hydrocelem delapsus; quare eidem mane grana viginti pulueris millepedum ex pauco vino vel iusculo, et vesperi conseruae cynosbati tantum, quantum nucem auellanam aequat, exhibita sunt, strictissima diæta obseruata, et pro potu ordinario aqua martiali data; quibus post longam curationem ille denique conualuit.
- p. 123. Progredimur ad tractatum de ictero. Signa eius facilia sunt cognitu. Distinguitur essentialis, qui ab obstructo vel vitiato hepate pendet, ab accidentali, quem aliae corporis mutationes inducunt. Obstructio hepatis aut a solidis aut a fluidis enascitur; quicquid ergo aut nimis constringit, aut relaxat vias bilis

bilis, icterum efficere potest: idem etiam valent omnes eae causae, quae bilem aut condensant, aut acriorem reddunt. Ad curationem necessaria est p. 125. cognitio causae, et quem ea effectum in hepate bilisque viis exseruerit: his ergo constrictis, prima indicatio eo tendat, ut partes tensae relaxentur. Inde venaesectio in brachio instituenda, et, pro causae morbi varietate, repetenda; postmodum danda emollientia, et fomenta ac balnea eiusdem indolis adhibenda; ubi purgantia nimis acria eum produxerunt, frequenter oleum amygdalarum dulcium exhibendum. Si aeger somno frui nequit, neque medicamenta satis cito effectum exserunt, vesperi anodynum ex vini cochleari, aut dimidia drachma theriacae propinanda sunt: exterius etiam applicare convenit linimentum ex theriaca, spermate ceti, oleo nucistae, croco et camphora confectum; vñus etiam est insignis clysterum, eorumque repetitorum, ex aqua fluuiatili cum tertia parte olei oliuarum, non numquam cum lacte calido et balsami tranquillantis vna alteraque drachma. In ictero essentiali curan- p. 127. do duae indicationes ante oculos medentis versari debent, ut nimirum obstructiones in viis biliariis tollat, et circulationem sanguinis, a cuius lentore obstructiones existant, restituat, primum obtinetur ptisanis resoluentibus, quibus apozemata purgantia leniora iungenda sunt, ut tertius quisque dies ab iis immunis sit; his remediis adhibitis, utendum est aquis Sedlicensibus, quibus sub finem curationis sal DE SEIGNETTE et parca dosis terrae foliatae tartari addatur. Postea balneis domesticis per sex vel octo dies, et, iis finitis, pilulis ex cremore tartari, coccionella et sapone veneto, aut si his malum nondum cedat, aliis ex sapone veneto, croco, gummi ammoniaco, aethiope minerali et croco martis aperitiuo utendum est. Neque aquae minerales in curationis

rationis decursu posthabendae sunt, quae si naturales haberi nequeant, arte parari possunt, coquendo aquae fluuiatilis vel fontanae libras quinque cum tartari martialis solubilis et salis GLAUBERI singularum vncia vna, donec quinta pars consumpta fuerit; postmodum vas ab igne remouendum, liquor colandus et frigidus in vsum seruandus est. Per omnem curationem aeger omni hebdomade purgandus, imo duobus granis tartari emetici, ceteris paribus, vomitus ciendus est. Finem curationis roborantia, in principio leniora, postea fortiora, cum conueniente diaeta et corporis exercitio, absoluunt.

p. 131. Haec omnia subiunctae octo obseruationes, a Cl. MARQUET factae, excipiunt et vltius confirmant.

p. 144. Accedimus nunc ad obseruationes anatomicas et medicas nonnullorum aliorum Auctorum, quae tertiam partem libri huius constituunt. Prima est a Cl. BAGARD de vtero duplici. Femina quadraginta octo annorum, viuuda alias, quatuordecim liberorum, quorum tamen nonnullos praemature enixa est, mater, ante quoduis puerperium magnam sanguinis iacturam passa, atque post eadem semper male habita, tabe glandulari pulmonum extincta est. Cadaueris sectio exhibuit vterum insignis magnitudinis, qui curatius disquisitus, duplex inuentus est, ita, vt fundus vtriusque ad pollicis distantiam separatus ab altero, collum vero coniunctum conspiceretur, et vterque orificio interno communi gauderet; figura, structura et crassities naturalis; tuba fallopiana, ouarium, ligamentum rotundum singulo vtero singula adhaerebant. Orificium internum commune apertum cavitatem intus politam ostendebat, in cuius medio, superiora versus, eminentia quaedam erat, quae duas profunditates intersepiebat, ad orificia, cuius vtero propria, ducentes: cuiusuis vteri
cavitas

cauitas oliuae capax erat. Ex hoc exemplo superfetationis possibilitas clare patescit, quandoquidem et ipsa haec femina dicebatur, vno post abortum gemellorum, quibus vna placenta fuerat, mense fetum sex hebdomadam edidisse; memoratur etiam exemplum alius feminae, quae fetum maturum enixa, cum post 40 dies in publicum prodiisset rursus, elapsis inde sex septimanis, fetum trium circa mensium peperit; in qua igitur itidem duplicis vteri suspicio enascitur.

2. De morbo Nanceii anno 1757. grassato, re-P. 150
latio, ex schedis Cl. MARQUET petita. Peripneumoniam fuisse, febris, pectoris oppressio, tussis et sanguinis excreatio euincebant. Causa remota sita erat in aere hiberno frigido, circulum sanguinis in pulmonibus impediante, vnde, ruptis vasculis tene-rioribus, sanguis in vesiculas pulmonales effundebatur, et causam morbi proximam constituebat. Ad febrim, inflammationem oppressionemque pectoris minuendam, venaesectio in brachio, eaque tertium vel quartum administrata fuit: vsus postea est ptisanis pectoralibus, tepide haustis, atque in quibusdam aegris iulapiis pectoralibus et sudoriferis, adiunctis pulueribus anthelminticis ac diacodio; in aliis tartaro emetico, manna atque itidem anthelminticis. Fluxum ventris, vix non omnibus solemnem, mox in principio cum diascordio, tum adstringenti cohibuit; prout enim aluus euacuatur, pectus magis oppletur, cohibitaque expectoratione sanguis, in pulmonibus haerens, tristissimos effectus causatur. Declinante morbo, infusa theiformia herbarum vulnerariarum et potio purgans, anthelminticis sociata, profuerunt.

3. Cl. BAGARD de sanguine in pericardii caui-P. 153.
tate effuso. Femina sexaginta annorum, sana et alacris ceteroquin, subito dolorem et oppressionem

circa sternum sensit, quam ex instanti oppressio pectoris cum suffocationis metu, anxietate summa, pulsu magno, pleno, duro, frequente, rubore genarum, sudore ardente quasi in facie et pectore, et summa corporis inquietudine et iactatione exceperunt. Protinus in brachio vnciae duodecim sanguinis mittebantur, quod, hora elapsa, repetebatur, intra quod tempus frequenter utebatur potione vulneraria; symptomata inde pacari visa, vesperi eadem, qua ante, vehementia recrudescebant; sanguinis missiones in brachio ac pede oppressionem tantum ac suffocationem minuebant: reliqua symptomata per noctem diemque insequentem durabant, pulsu perpetuo intermittente; denique elapsis, a principio morbi, quadraginta octo horis syncoptica moriebatur. Aperto cadauere, hepar insignis molis inuentum est, adeo, ut spatium septem inferiorum costarum occupans diaphragma sursum vrgeret: in cavitate sinistra thoracis, vitrum circiter feri limpidi, et pulmo dexter in superficie maculis nigris, lentis magnitudine, obsitus. Pericardium autem loco feri offerebat circiter sequilibram sanguinis coagulati, cor plane ambientis: cor flaccidum, vnguibus facile lacerandum, in apice multas maculas nigras, gangraenosis similes, ostendebat; in ventriculo sinistro nihil, in dextro aliquantum sanguinis nigri et coagulati. Causam huius collectionis sanguinis, licet probabilem tantum, Cl. Auctor solum in disrupto, versus apicem cordis, venae coronariae ramo quaerit, quam laesionem constricto saepius ac postmodum multum dilatato cordi, ob tristes animi affectus, adscribit. Cum haec femina sterilis fuisset, in eius status causam inquirens, inuenit Cl. Auctor orificium vteri internum durissimum et clausum, atque in vtero ipso corpus glandulosum, rotundum, compactum, intus substantiae corticali cerebri simile,

sed

sed durius, multis in locis vtero adhaerens, ipsumque exacte replens, vnius circiter vnciae pondus aequans; ouaria minimae molis, alba, dura.

4. Auxilium vitae diu protrahendae, ex schedis p. 159.

Cl. MARQUET, in eo consistit, vt cubantes pedes plus eleuemus, quam reliquum corpus, capite et pectore exceptis.

5. Cl. BAGARD de incarceratione intestini p. 160.

recti, a pessario inducta. Causa isthaec post mortem demum detegebatur, quae morbum atrocissimum duodecim dierum insequuta fuerat, incassum adhibitis venaesectionibus, narcoticis, demulcentibus et emollientibus, intus sumtis et extus applicatis. Cadauer verum tympanitem, intra peritoneum existentem ostendit, quo vix inciso, aer maximo cum sonitu ac summo foetore exiit: intestina ter circiter naturali statu ampliora, hinc inde perforata, sanguine farcta, inflammata et gangraenosa, potissimum in ea parte, qua mesenterio adhaerebant: ventriculus ac duodeni principium flaccida, pallida: rectum ad sex circiter vel septem pollicum distantiam ab orificio, summe contractum, ac si ligatum fuisset: scybala nec in recto, nec in coeco, sed omnia regressa in colon. In fundo vaginae, immediate sub vteri orificio, haesit pessarium rotundum et solidum, marginibus nonnihil extenuatis: inde comparuit, hoc instrumento sensim constrictum esse intestinum rectum, vt nec scybala flatusque egredi, nec clysteres ingredi possent. Solum remedium, quod, cognita hac causa applicari potuisset, in cereo longo et rotundo, oleo amygdalarum dulcium inuncto, positum fuisset, qui in anum, et, si vmquam fieri potuisset, supra constrictam vsque partem ingeri debuisset.

6. Relatio de porco monstroso, Metis decimo p. 166. sexto seculo in lucem edito, ab AMBROSIO PA-

REO conscripta; qui octo pedes, quatuor aures, caput caninum, corpus, posteriora versus vsque ad ventriculum diuisum ac postea vnitum, linguas duas, transuersim in gula positas, quatuor dentes maiores superius et inferius in vtroque latere, sexus partes distinctas, offerebat.

p. 167. 7. Cl. BAGARD in cadauere feminae, ex illustri prosapia oriundae, inuenit ventriculum versus hypochondrium sinistrum situm, et in eius fundo, prope pylorum, scirrhum duorum ad minimum pugnorum magnitudine, in tota substantia exulceratum, posterius et inferius pancreati, quod totum corruptum erat, adhaerentem, cuius pondus ventriculum ad regionem lumbarem vsque, versus renem sinistrum, descendere coegerat; cohaerebat idem etiam cum lobo maiori hepatis, eo in loco exulcerato, et cum visceribus pluribus vicinis. Sanies carcinomatosa, paucis ante mortem diebus, ex hoc scirrho in peluim descenderat, et serum, in cauitatem abdominis effusum, viridescenti et lacteo colore imbuerat. Idem tumor positus erat supra aorta, arteria coeliaca, emulgente sinistra, splenica et mesenterica superiore, quarum pulsationes, ipsi communicatae, aneurysmatis praesentiam mentiri in corpore viuo poterant.

p. 169. 8. De paralyti, per febrim putridam soluta, Auctore Cl. HARMAN. Aeger, post ictum solis, febre vehementissima affectus conualuit quidem, sed hemiplecticus remansit. Post biennium febre putrida maligna laborauit, qua sedata liberum membrorum motum atque vsum recuperauit; paucis tamen annis post purpura scorbutica eum inuasit, quae octodecim circa menses perdurans, eum phthisicum reddidit et exanimauit: vxor eius eodem morbo, per contagium affecta, minus, quam annuo spatio hydrope extincta fuit.

9. De

9. De tumore scirrhuso carcinomatico prope in-P. 171.
 fertionem oesophagi in cardiam, Auctore Cl. B A-
 GARD. Oriebatur a particula femoris columbae,
 sub prandio deglutita, et aegram, ob denegatam
 prorsus alimentorum assumptionem post quindecim
 menses tabidam mori cœgit, ita extenuatam, vt
 corpus antea vltra centum et sexaginta libras pon-
 dere aequans, post mortem viginti septem demum
 ponderaret, vixque libras tres sanguinis offerret.
 Tumor, duos pollices ab cardia remotus, in oesopha-
 go haerebat, magnitudine oui minoris, crassitie di-
 midii pollicis in ambitu, parca portione in ipsam
 vsque ventriculum penetrans, qui ita contractus
 erat, vt intestino tenui similis esset: in oesophagum
 immissa iniectio prorsus non penetrabat ad ventri-
 culum, sicut et in viuo corpore omnia vomitu do-
 lorosissimo reiecta fuerant.

10. De empyemate, post exfoliationem partis p. 176.
 cuiusdam costarum verarum sanato, Auctore Cl.
 CAESTRYCK. Miles viginti octo annorum, ante
 aliquot iam annis bis abscessibus ad sternum affectus,
 iisque incisis et depuratis, sanatus, pleuritide labo-
 rabat, et post nonnullos dies versus mammam dex-
 tram, tumorem emphysematicum et fluctuantem
 offerebat, quo inciso, per musculos intercostales, a
 pure corrosos, puri exitus patuit. Febre, vt decet,
 tractata, puris tamen copia semper aucta fuit, donec
 portio quartae vel quintae costae vera exfoliatione
 separata exiret, quo facto omnia melius cesserunt, et
 aeger optime curatus est.

11. Cl. DORON refert, iuuenem febre conti-P. 180.
 nua affectum die decimo quarto sudorem criticum
 expertum esse, ab hoc autem ad vigesimum vsque
 tantum in digitis vtriusque manus sudasse, vt gut-
 tatim sudor perpetuo destillaret, imo iuscula talia,
 qualia assumserat aeger, paullum tantum falsiora
 X x 3 gustu,

gustu, neque adeo pingua, redderet. Lene autem purgans extraordinariam hanc excretionem tollebat.

p. 181. 12. IDEM in femina haemorrhagiam vteri, per octo menses durantem, et aegram summe debilitantem ptisanæ, leniter carminatiuæ et laxantis, clysteris emollientis et iulapii ex aqua plantaginis, syrupo limoniorum et diacodii intra sex vel septem dies restituit: elapsis autem quinque hebdomadibus, eadem infantem perfectum et sanum in lucem edidit, licet ipsa grauidam se esse nesciisset.

XI.

Noui Commentarii Academiae scientiarum Imperialis Petropolitanae. Tom. XI. pro anno 1765. Petropoli a. 1767 typis academiae scientiarum 4 mai. 3. Alph. 3. pl. 17. tab. aen. Tom. XII. pro anno 1766. et 1767. ibid. a. 1768. 3. Alph. 6. pl. 14. tab. aen.

In classe scriptorum physico-mathematicorum voluminis vndecimi continentur:

T. XI. 1. *Supplementum de figura dentium rotarum.* Auctore L. EULERO. *)

p. 232. 2. *De motu fluidorum, a diuerso caloris gradu oriundo.* Auctore EODEM. Cel. Auctor in dissertatione hac non de eo motu intestino, qui fluidorum elementis a calore inducitur, loquitur, sed mechanicae principiis inhaerens, in eos fluidorum motus inquirat, qui in eorum tota mole a diuerso caloris gradu produci debent.

3. *De*

*) vid. Nov. Com. Acad. Petropol. Vol. IV.

3. *De admirando frigore artificiali, quo mercurius p. 261.*
seu hydrargyrus est congelatus. Auctore L. A.
 BRAUNIO. *)

4. *Dissertatio, continens partim additamenta noua p. 302.*
et supplementa ad dissertationem de congelatione mer-
curii siue hydrargyri, partim in alia corpora frigoris
artificialis insignioris novos effectus. Confirmat hac
 dissertatione Cl. Auctor pluribus experimentis ea,
 quae de mercurii congelatione, frigoris artificialis
 ope peracta, in commentario superius commemorato
 olim proposuit. Punctum congelationis mercurii
 intra 640-650 gradum est, (ad quem gradum, arte
 producendum, ad minimum frigoris naturalis gradus
 175 scalae Delilianae requiritur). Spiritus nitri
 Glauberianus optimum est fluidum ad frigoris gra-
 dum, quo congelatio contingit, producendum. Ex-
 perimenta, cum oleo vitrioli et spiritu salis instituta,
 successu caruerunt, frigoris tamen naturalis gradu
 200 in aere existente, mercurius, licet imperfecte,
 massa frigorifica ex niue et spiritu vini rectificatis-
 simo adhibita, congelatus est. Nix recens lapsa
 niui veteri omnino praefenda est, quod et de spi-
 ritu nitri, recenter parato, valet, qui maiorem vim
 soluendi niuem possidet. Mercurius purissimus
 vulgari difficilius congelatur. Mercurius congelatus
 magis flexilis Cl. Auctori, quam plumbum et aurum pu-
 rum visus est. In fine huius dissertationis occasione li-
 quorum non congelabilium (qualia olea aetherea, lixi-
 vium muriae cet. sunt) Cl. Auctor monet, non existere
 fluidum per se et absolute incongelabile, nec aerem et
 ipsum aetherem per se incongelabilem haberi posse.

5. *Observationes meteorologicae. anni 1742 Tiu. p. 320.*
meni, Turinii, Werchoturiae et Solikamii in itinere

Xx 4 potissimum

*) De hac dissertatione quae seorsim impressa iam a.
 1760 prodiit, vid. Comment. nostr. Vol. X. p. 212.

*potissimum, a GMELINO institutae. Potiora momenta exerpfit et in ordinem redegit, I. A. BRAUN-
NIUS. Obseruationes alias meteorologicas in Sibi-
ria a GMELINO institutas iam in nouis com-
mentariis Petropolitanis *) Cl. Auctor proposuit.
Hic itaque traduntur aliae, quas in itinere ex Sibiria
Petropolim versus idem Cl. Auctor instituit.*

6. *Epitome obseruationum meteorologicarum anno
p. 350. 1761. Petropoli institutarum, cum conscriptariis, Au-
ctore I. A. BRAUNIO.*

7. *Obseruationum meteorologicarum anni 1762,
p. 368. ft. v. epitome cum conscriptariis inde deductis, Auctore
EODEM.*

8. *Obseruationum meteorologicarum, Petropoli
p. 382. factarum, epitome per singulos menses anni 1763. ft. v.
cum conscriptariis, et in eas considerationibus, Auctore
EODEM.*

In Classe physica varia tantum Cl. KOELREU-
TERI scripta reperiuntur.

I. *Insectorum musei Petropolitani rariorum Ame-
p. 401. ricae potissimum meridionalis incolarum descriptio-
nes, Auctore I. F. KOELREUTER. Sunt ea: 1)
Scarabaeus thorace utrinque in cornu antrorsum produ-
ctum, capite in cornu recuruatum ac tridentatum defi-
nente (scarabaeus actaeon LINN.) Varietates quo-
que nonnullae huius insecti describuntur. 2) Scara-
baeus thorace tricorni, intermedio longiore, subtus bar-
bato; capite in cornu bifurcatum definente. Haec
Scarabaeo Simson L. affinis est. 3) S. thorace turrato
inclinato, bicorni; capite in cornu modice recuruatum
ac bidentatum definente. Noua species, aut a SWAM-
MERDAM-*

*) Vol. VI. p. 425.

MERDAMMIO tantum descripta est. 4) *S. Hercules* LINN. In hoc insecto elytra materia pellucida albicante obducuntur, pluribus punctis nigricantibus et lineis pertusa vel conspurcata, de quarum origine dubius adhuc Cl. Auctor loquitur. Synonymon SWAMMERDAMMII a LINNAEO ad hanc speciem relatum, ad sequentem pertinet. 5) *S. scilicet thorace in cornu imberbe subincuruum antrorsum prolongato; nasi cornu unidentato, subrecuruo; extremitate utriusque bifida.*

2) *Descriptio fuci foliacei frondibus fructificantibus* P. 424. *papillatis.* Auctore EODEM. Est *fucus ceranoides* LINN. Ex mari albo allata est haec species, eam tamen et mari mediterraneo communem esse, et ad *lichenes* sic dictos *foliaceos* accedere in historia Academiae huic volumini praefixa *) notatur. Superficie huius fuci plura corpuscula elliptica insident, quae vel semina vel puluerem masculum esse Cl. Auctor suspicatur.

3. *Aves Indicae rarissimae et incognitae,* Auctore P. 429. I. F. KOELREUTER. Prima avium harum, (a BRISSONIO, cuius liber ad Nostrum tunc temporis nondum peruenerat, maxima ex parte iam descriptarum) est *merops fuscus*; *ani regione flava; cauda ex incano nigricante, longissima.* (an *Merops cafer* Linn. syst. ed. X. et XII.) In historia huius voluminis **) annotatur in nouissimo systemate hanc speciem a BRISSONIO *promeropem* vocari, a LINNAEO vero in nouissima seu duodecima editione referri ad *upupas* et in SEBAE quoque thesauro rudem eius figuram existere. Patet exinde *meropem castrum* LINN. et *upupam promeropem* EIUSD. vnam eandemque avem esse; 2) est: *Certhia corpore supino viridi; gula lutea; pectore abdomineque ex viridi et luteo variegatis* (*certhia Cayanensis* viridis

Xx 5

viridis

*) p. 40.

**) p. 38.

viridis BRISSON. 3. *Passer e violaceo nigricans*, fronte, mento, gula, pectore abdomineque saturate flavis. (*Tanagra violacea* LINN.) 4. *Fringilla viridis*, capite spadiceo, pectore abdomineque cyaneis; basi alarum flava. (*Tanagra gyrola* L.) 5. *Curruca nigra*, fronte alba; abdomine croceo; uropygio cyaneo. (*Pipra serena* L.) 6. *Fringilla coerulea*, mento, gula, alarum basi, dorsique parte antica nigris. Est *Certhia cyanea* LINN. 7. *Cornix atra*; capite, collo pectoreque flavis. Est *Oriolus icterocephalus* LINN. 8) *Lanius* capite, collo pectoreque e violaceo nigrantibus; digitis duobus anticis totidemque posticis. Est *Trogon Currucui* LINN. 9) *Loxia atra*, uropygio flavo seu *Loxia Capensis* LINN. 10) *Turdus niger*; fascia capitis longitudinali, uropygioque luteis; basi alarum alba. Est *Lanius tyrannus*, LINN.

Tomus duodecimus, qui ad annos 1766 et 1767 pertinet, sequentes continet commentarios:

T. XII. In classe physico mathematica.

p. 129. 1) *Methodus facilis motus corporum coelestium utcumque perturbatos, ad rationem calculi astronomici revocandi.* Auctore CL. L. EULERO.

p. 166. 2) *Disquisitio de vera lege refractionis radiorum diversicolorum.* Auctore EODEM.

p. 195. 3) *De nouo microscopiorum genere, ex sex lentibus composito.* Auctore EODEM.

p. 224. 4) *De telescopiis, quatuor pluribusue lentibus instructis eorumque perfectione.* Auctore EODEM.

5) *De*

5) *De rotatione solis circa axin, ex motu macularum apparente, determinanda.* Auctore Cl. I. A. EULERO.

In classe physica.

1) *De caloris communicationis exceptione phaenomena noua, experimentis elicitata, et explicationes,* Auctore Cl. I. A. BRAUN. Obseruauit Cel. Auctor, quod iam a KICHMANNO repertum erat, aquam aut spiritum vini rectificatissimum, vasi infusum, in quo alii vasi, aqua ebulliente impleto, impositum, quantumuis aucto calore ignis nunquam tamen ebullire, sed calorem, puncto ebullitionis in thermometro novem gradibus inferiorem, perpetuo seruare. Secus tamen euenire deprehendit, si vasa clausit, aut aquae loco vinum oleumue adhibuerit. Huius rei causam in eo latere putat, quod aqua ebulliens definitum caloris gradum non transgrediatur, vasa vero impediunt, quo minus iis contenta fluida pari calore afficiantur, cum vinum et oleum, vt et aqua in vasis clausis multo maiorem calorem recipiant, ideoque cum imposito vase etiamsi non totum calorem, tantum tamen eius communicare possint, quantum ad ebulliendum sufficiat.

2) *De electricitate barometrorum disquisitio,* Auctore F. V. F. AEPINO. Excitarunt Cel. Auctorem ad explorandam theoriam electricitatis barometrorum duo phaenomena, dudum iam a physicis obseruata, quod nimirum in quibusdam, si noctu agitetur mercurii superficies, colluceat, deinde, quod filum e talium barometrorum summa parte suspensum, descendente mercurio, attrahatur, ascendente, repellatur. Vtrumque explicat e theoria electricitatis generali et praesertim posterius nouis experimentis

mentis confirmat, institutis ope barometrorum, quorum summam partem foliis metallicis circumdederat, quibus electrica materia retineatur, quam excitata frictione mercurii positiua electricitas inferioris superficie per vitrum agit. Ad illustranda phaenomena negatiuae electricitatis descendente mercurio, conspicuae, tetigit summitatem barometri corpore non per se electrico, ne materia electrica vitri, a vi interioris repulsa, in extrema superficie accumuletur, sed potius inde in corpus admotum transeat.

P. 325. 3) *Examen theoriae magneticae*, a Cel. TOB. MAYERO propositae, Auctore EODEM. Cel. MAYERUS duas regulas proposuerat, quibus problema, de vi corporis magnetici in aliud, quacunque distantia remotum ad calculum integralem reuocabat. Hae cum veritate consentiant AEPINUS Cl. experimentis explorauit, variasque hic contra illas dubitationes proponit.

P. 351. 4) *Descriptio noui phaenomeni electrici detecti in chrysolitho siue smaragdo Brasiliensi*. Auctore EODEM. Notum est Cl. WILSONUM a Cl. MENDEZ DE COSTA ante aliquot annos accepisse lapidem quendam, qui, quoad electricas proprietates cum Turmalino lapide conuenit, quamuis genere longissime ab eo differat *). Est vero proprie species lapidis corneicrystallisati viridis WALLERII, quam nostri metallifossores Schörl seu Schirl vocant atque in Brasilia in fluuiis reperitur. Color eius colori vitri viridis vilioris notae similis est. Cum huius lapidis aliquot fragmentis, a WILSONO Cl. transmissis, Noster varia experimenta instituit, atque non solum electricitatem huius lapidis, turmalino penitus analogam esse, obseruauit, sed et cum WILSONO deprehendit:

*) vid. Philos. Transact. Vol. LII. P. II. p. 443. Comm. nostr. Vol. XIII. p. 6.

deprehendit: directionem fluidi electrici, se in hoc lapide mouentis, sequi directionem striarum siue columnarum, ex quibus constat haec crystallus, vno harum columnarum extremo semper positivam, altero negativam acquirente electricitatem. Porro crystallum eiusmodi Cl. Auctor ita diffregit, vt fracturae planum ad strias crystalli esset normale, atque invenit partes in lapide integro contiguas, in diffracto contrarias possidere virtutes, et hac in re summam esse inter hunc lapidem et magnetem similitudinem.

5) *De vitro fossili naturali siue de achate Islandico.* p. 359.
 Auctore Cl. I. G. LEHMANNO. Lapis hunc, quem Cl. CRONSTAEDT *achatem Islandicum nigrum* vocat et inter scorias vulcanorum refert, est lapis satis durus, coloris primo nigri, vbi vero in tenuiores finditur lamellas obscure bruni, in igne per se facile fluens, cum chalybe percussus, scintillas edens et polituram elegantem admittens. Plura cum eo experimenta Cl. LEHMANNUS instituit, viditque nullum menstruum siue acidum siue alcalinum vim solvendi in eum exercere: fusiones vero cum variis corporibus declarare, partes nonnullas metallicas et quidem martialis indolis ei inesse. Nulla tamen ratione ferrum, quod minima tantum copia adest, in metallica forma obtinere potuit. Cum vitro autem satis conuenit et sine additamento moderato igne, in vitrum iam abit. De origine mirandi huius lapidis suspicatur, esse illum vitrum per ignes subterraneos ex aliis lapidibus productum, et forte vnum eundemque esse lapidem, quem PLINIUS hist. nat. L. XXXVI. Cap. 26. *lapidem obsidianum* vocat, quo nomine alii putarunt gagatem et samothraciam (seu lignum fossile bituminosum nigrum intelligi *). Oritur vero achates Islandicus ex Nostri Auctoris opinione

*) Alii ad marmora referunt.

nione inprimis ex lapidibus amyanthinis et asbestinis. Sub speculo enim caustico lapides hi in simile vitrum mutantur *) et scoriae achate Islandico satis similes Olonitzi ex furnis fusoriis profluunt, in quibus minerae ferri, quarum matrices ex asbesto et amiantho constant, coquuntur.

- P. 368. 6) *De cupro et orichalco magnetico*, Auctore E. O. DEM. Orichalcum magneticum esse ante aliquot annos Gallus quidam observauit, Cl. vero Auctor per vltiora experimenta cognouit, hunc magnetismum a partibus martialibus, lapidi calaminari, ex quo cum cupro fuso orichalcum praeparatur, immixtis, et in praeparatione orichalci per phlogiston reductis, pendere. Plura deinde experimenta cum lapidis calaminaris variis speciebus, cadmiis fornacum, pseudogalenis variis cet. instituit, easque materias zincinas cum cupro anatica proportionem commiscuit et observauit: magnetismum cupri et inde parati orichalci a partibus martialibus lapidi calaminari, cadmiis fornacum, pseudogalenis cet. admixtis dependere; orichalcum, ex cupro et zinco purissimo elaboratum nullum magnetismum, monstrare; quo magis materiae zincinae martialibus partibus abundant, eo maiorem esse magnetismum atque, quo fortius et diutius lapides calaminare cum phlogisto absque eo calcinentur, si tantum vitrificatio euitetur, eo maiorem magnetismum eos acquirere: mineras contra et cadmias zinci, pseudogalenas cet. ferro destitutas nullum magnetismum monstrare. Quo vero pateat, qualis esse debeat proportio ferri ad cuprum, si illud magneticum reddere volumus, varia experimenta fecit eaque in tabulam aliquam redegit, ex qua patet, quindecim iam grana chalybis duodecim drachmas cupri magneticas reddere, ideoque $\frac{1}{48}$ ferri,

*) vid. Hamb. Magaz. T. V. p. 278.

ferri iam sufficere. Occasione tutiae sic dictae Ale-p. 381.
xandrinae monet Cl. Auctor eximiam eius quantita-
tem a Iudaeis aliisque in Polonia praeparari, eosque
ad hunc laborem flores zinci, tectis ustrinarum, in qui-
bus orichalcum praeparatur, adhaerentes, colligere, at-
que ex iis et lapide calaminari griseo cum terra pin-
gui tubulos formare.

7) *Specimen oryctographiae Stara-Ruffiensis et* p. 391.
lacus Ilmen, Auctore EODEM. Variarum obseruatio-
nes mineralogicae, in hac regione a beato Auctore
factae, hic exhibentur. Describuntur in primis sali-
nae Stara-Ruffienses et aquarum examen exhibetur,
ex quo patet, illas praeter salem communem, sal quod-
dam medium sali mirabili analogum, continere. Cir-
ca opidum Stara-Russa ubique terra reperitur nigra
et pinguis, quae fortissimum hepatis sulphuris odorem
spirat, qua occasione Cl. Auctor variis argumentis
probat, nullam salis natrii fodinam aut muriae scatu-
riginem reperiri, quae non vestigia sulphuris et acidi
vitriolici exhibeat.

8) *De formatione intestinorum praecipue, tum et* p. 403.
de amnio spurio aliisque partibus embryonis gallinacei,
nondum visis, obseruationes in ouis incubatis institutae.
Auctore C. F. WOLFF, P. I. et II. Cl. Auctor
iam olim in eleganti et multo studio scripta disserta-
tione, qua *theoriam generationis* exhibuit et de qua
alio loco ad lectores retulimus, asseruit *): nihil
praexistere in corpore animali et vegetabili quod ru-
dimentum eius sit; omnia ex minimo puncto etiam
inorganico organica fieri per *ἐπιγένεσιν*; ad illa
vero

*) Prodiit Halae 1759. vid. Comment. Vol. X. p. 217.
Confer. quoque de Cl. WOLFFII theoria Ill. HAL-
LERI *Elem. Physiol.* T. VIII. p. 113. et Suppl. huius
voluminis p. 118. nec non EIUUSD. *Opuscula* T. II.
P. I. p. 54. et P. II. p. 312. vid. Com. nostr. Vol. XIV. p. 529.

vero efficienda maximopere requiri *vim* quandam *essentialem* quam vocat, ab attractione, aëre cet. diversam, quae cum *solidescencia* succi, ceu alia vi, totam formationem perficiat. Hanc theoriam etiam nouis, in ouis incubatis factis, experimentis confirmat, atque cum partes corporis non in ouo praeexistere, sed sensim formari vis essentialis ope putet, hic rationem describit, qua in ouo incubato intestina formari vidit. Describit vero primum singulare pulli inuolucrum, quod magnam cum amnio similitudinem habet eidemque exterius circumducitur, quod *amnium spurium* vocat; *aream vasculosam* eiusque vasa; venam scilicet terminalem, quae circumferentiam areae describit, et quam HALLERUS *circulum venosum* vocat, venam adscendentem, quae ex caua superiori pulli, descendente, quae ex ima embryonis parte, laterales, quae ex vena portae oriuntur cet. *areolamque pellucidam*, peculiariae interstitium inter vtramque areae vasculosae membranam, in quo embryo continetur. Die incubationis secundo finito, in hac areola amnium spurium formatur et deinde areola pellucida euanescit. Deinde vero intra amnium hoc spurium amnium verum oritur et amnium spurium resoluitur. Quod vero ad intestinorum formationem attinet, Cl. Auctor asserit, interiores amnii spurii partes ad embryonem produci et ipsa intestinorum primordia sistere. Est enim in ea amnii spurii parte, quae cardiaca regioni in fetu respondet, fouea quaedam, quae orificium speluncae cuiusdam sistit, quae ventriculum refert, vt itaque ventriculus sub primo initio anterieus apertus sit. Ab hac fouea deorsum rima continuatur, etiam a membranae amnii spurii media parte formata, quam intestinorum tubum esse contendit. Hic primo rectilineus est, deinde vero, dum crescit, in varios gyros flectitur. Est vero semper versus anteriorem partem

hic

hic tubus apertus et inferius fouea terminatur, quae
intestinum rectum refert.

9) *Observationes et descriptiones botanicae.* Au-p. 508.
Auctore SAMUEL GOTTLIEB GMELIN. Non
solum plantas varias iam cognitae Cl. Auctoris suis ob-
servationibus illustrat; sed et nouas quasdam pri-
mus describit. Sunt eae: 1) *Scandix infesta*, femini-
bus exterioribus hirsutissimis, interioribus glabris.
Quae planta a Cl. FORSKOEHL in Aegypto lecta, ex eius
observatione venenatam proprietatem et vim nervos
obtundentem habet. 2) *Bunias Aegyptiaca*. 3) *Pi-
per longum arboreum*. Hanc plantam SLOANEUS
iam, sed minus accurate delineauit; nouam itaque
descriptionem et figuram ad siccam plantam exara-
tas Cl. Auctor hic communicat. 4) *Triumfettae*
LINN. genus examini vltiori subiicitur et in plu-
res, quam a LINNAEO factum est, species distin-
guendum illud esse, probatur. 5) *Asplenium lamai-
cense* PLUKENETII, vt nouam speciem a LINNAEO
omissam, describit Noster. 6) Duas *Osmundae* spe-
cies, quas alii varietates *Osmundae lunariae* vulgaris
esse putarunt, vt singulares species proponit atque *lan-
ceolatae multifidae*que nominibus insignit. 7) Duas no-
vas *pteridis* species, a STELLERO missas, Auctor
exhibet, P. scilicet STELLERI et *argenteam*; tan-
demque 8) *Liquidambaris asplenifolii* varietas deli-
neatur.

10) *De proprietatibus plantarum ex caractere bo- p. 512*
tanico cognoscendis. Auctore EODEM. Characteres
illos euidentes, quos natura plurimis plantis impressit,
ad medicam eorum vim eruendam vtilissimos esse,
Cl. Auctor probat pluribus exemplis. Sic *byssi*, *con-
feruae* et *fuci* vim saponaceam et deobstruentem ha-
bent: *lichenes* salino-resinosum, acre, fixum et cum
Tom. XVII. Pars IV. Yy phlogisto

phlogisto intime coniunctum principium continent, vimque incidentem, calidam et stimulantem possident: *musci* austeri sunt et adstringentes: *filices* gummosas partes, cum resinosis mixtas, quibus terra et ferri partes pro basi inferuiunt, vimque roborantem, incidentem, aperitiuam habent: *graminum* femina emolliunt et nutriunt, folia et radices resoluunt et demulcent. *Leguminum* femina nutriunt, radix, folia et flores abstergant, resoluunt et diuresin promouent. *Lilia* aperiunt, variasque excretiones promouent. *Scitamina* aethereum oleum continent et aromatica, *umbelliferae* vero calidae et sudorificae, et quae ad aquas crescunt plerumque venenatae sunt. *Compositae* omnes resoluentes sunt, et *radiatae* quidem aegros leniter, *capitatae* intensius, et *corymbosae*, propter calidum innatum, vehementissime afficiunt. *Cucurbitaceae* mucilaginosaе et refrigerantes sunt: *orchides* calidae, aphrodisiacaе, sed simul nutriendae: *coniferae* balsamicae: *amentaceae* adstringentes: *maluae* emollientes: *solana* venenatae narcoticae, cum quibus *asclepiadeae* conueniunt. *Oleraceae* vim digestivam emollientem et temperantem, similemque *asperifoliae* habent, quae tamen magis mucilaginosaе sunt. *Gentianis* virtus tonica et aromatica: *anagallidibus* analeptica, refrigerans et excitans: *ringentibus verticillatis* aromatica et restaurans: *personatis* resolvens, abstergens, diuretica et tonica et *nasturtinis* antiscorbutica inest. Exempla et exceptiones nonnullas omittimus.

P. 549. II) *De glacie mariae Ruthenica*, Auctore EODEM. *Micae lamellis magnis parallelis* CRONSTÄDTII historiam ex GMELINI senioris et STELLERI itinerariis exhibet Cl. Auctor. Reperitur ea potissimum in ea Sibiriae parte, quae ad Witimum fluuium sita est, in rupibus ingentibus vmbrosis et

et irriguis. Versus omnes plagas occurrit, sed in ea quae septentrionem respicit optima gignitur, in meridionali vilior et rubiginosa. Non in venis, sed in nidis sparsis crescit. Teguntur illi vel circumdantur materia quadam, inter micam et talcum media, friabili, quam *Bargam* vocant. Situs stratorum variat. In vertice montium rarissime eiusmodi nidus occurrunt; optimae glacies in medio aut circa radices reperitur. Varietates deinde plures huius glaciei Noster describit, et in fine suam de origine huius corporis fossilis sententiam ita profert, ut doceat, formari illud ex substantia terrea, a gypsea non multum abludente eamque ab humiditate subterranea ita emolliri et solui, ut leuiiores partes cum acido sursum emergant, et in laminas glaciei concrecant. Quae de modo effodiendi, pretio cet. habet, ne nimis longi simus, omittimus. Vetusta et rubiginosa glacies purificatur vapore lixiui e cineribus parati.

12) *Descriptio tubulariae fungosae prope Wolodi. p. 565. merum mense Iulio 1768 observatae.* Auctore P. S. PALLAS. Noua haec tubulariae species omnia zoophyta, quae aquis dulcibus insunt, magnitudine superat et ad marina potius accedit. Conuenit satis cum *tubularia gelatinosa* Auctoris (vid. Elench. zoophyt. p. 85.), differt tamen in eo, quod in maius volumen excrescat, solidior sit, et semper in glomeres collecta, fungoidea crusta conchylia obuoluens, reperta sit. Ratione structurae cum *fungitis* vulgo dictis *petrefactis* satis conuenit; ut petrefactum hoc, vel ex ipsa hac tubularia, vel ex simili zoophyto marino ortum duxisse verosimile sit.

XII.

Plantae cryptogamicae florum Gottingensis, collegit et descripsit FRID. GUILIEM. WEIS, M. D. Gottingae sumtibus Viduae Abr. Vandenhoeck. 1770. 8. pl. 22. tab. aen. 1.

Iam anno 1769 libello sic inscripto Cl. Auctor specimen ad honores doctoris, in academia Gottingensi obtinendos, edidit in quo cum omnia ea, quae in libro, quem nunc Lectoribus commendamus, a pagina 1 ad 35 repetita inueniuntur, hoc indicasse sufficiat. In hoc vero libro Cl. Auctor ex vasta illa copia plantarum, in agro Gottingensi sylvisque Solingenfibus prouenientium, plantas tantum cryptogamicas, quae ab Ill. HALLERO et b. ZINNIO in enumerationibus plantarum eiusdem agri, antea editis, haud indicata fuerunt, fusius descripsit, ita, ut et hanc partem botanices difficillimam, explanationibus suis aliorumque selectis vberrimisque, unicuique generi et speciei adpositis, aliquomodo tiro-nibus faciliorem redderet et usum earum medicum oeconomicumque ostenderet. Annos fere tres et quod excurrit adiuncto sibi socio Cl. RULINGIO practico Nordheimensi Noster in iis colligendis, examinandis, describendisque consumpsit, tribusque classibus ordine Linnaeano, quem tamen in specialiori descriptione non ubique observauit, in qua partim Ill. HALLERUM partim SCOPOLI secutus est, omnes comprehendit, exceptis fungis, quos cum Ill. LINNAEO *) et Generosiss. Lib. Barone de MUNCHHAUSEN **) potius pro artificialibus productis et habitaculis insectorum, quam plantis veris habet, cum

P. 3.

*) vid. diss. mundus inuisibilis. Holmiae, 1767. p. 12. et Amoen. Acad. Vol. VII. p. 385.

**) Der hausvater T. II. p. 751.

cum etiam per experimenta horum virorum constet, puluerem ex lycoperdis agaricisque, tepidae per aliquot dies aquae commissum, in vermiculos degeneratum fuisse, qui primum globulos paruos mobiles exhibuere, deinde in fungos veros intumescere, quam ob rem Cl. Auctor in ea sententia perseverat, ut putet, eos prorsus ex regno vegetabili excludendos esse.

His praemissis, ad ipsam iam descriptionem plantarum cryptogamicarum progreditur, ubi classe prima, quae tertia secundum Ill. LINNAEI systema est, p. 9. Algae enumerantur, ad quas pertinent byssus, conferua, vlva, tremella cet. quae sunt plantae, veris staminibus et petalis destitutae, et eorum loco tantum quibusdam corpusculis, quae farinam seminalem siue semen ipsum continent, praeditae, quae, quoad partes fructificationis, plantis perfectioribus analogae sunt. Substantia praeterea gaudent vel pulverulenta, lanuginosa, filamentosa, foliacea vel gelatinosa, caloris impatiente; radicibus vero vel scutiformibus aut filamentosis, caulibusque in plerisque, a foliis non distinctis; vitam perennem habent diuque exsiccatae; affusa aqua, pleraeque denuo reuiviscunt, omnique anni tempore, praecipue vero decrescente autumno et per hiemem verisque initio, vigere solent; loca amant pleraeque umbrosa et vda, nonnullae ipsam aquam, aliae in aridis locis, saxis, arboribus aliisque plantis crescunt. Virtute medica, quamvis paucae adhiberi soleant, gaudent, deobstruente, purgante, anthelmintica, mucilaginisosa, pectorali et roborante. In oeconomicis nonnullae pannis variis, coloribus tingendis, inserviunt. Quod ad mutationes in hac classe occurrentes, attinet, notamus, Cl. Auctorem byssi genus duabus speciebus, ab Ill. LINNAEO nondum observatis, nempe byssop. 18. aeruginosa et cellari auxisse; byssum *Flos aquae*, L. vero, quam summi botanici hucusque retinuerunt,

- nec ad hoc genus nec ad plantas viuas pertinere contendit, cum secundum Nostri sententiam hoc nihil aliud sit, quam collecta materia e particulis putredine destructarum plantarum aquaticarum, ob leuitatem summam aquae petentibus superficiem. Vluam *granulatam* L. generi tremellae adnumerauit. Tremellam *Auriculam* L. quae iam *Peziza concaua rugosa auriformis* *) dicitur, ad fungos pertinere, nec non tremellam *purpuream* L. initium tantum agarici cuiusdam esse monet. Charam, quam Cl. SCHREBERUS monoeciam monandriam **) detexit, huc denuo reuocauit, quia nec potuit eius flores nec antheras nec stigmata detegere. Conferuam *gelatinosam* L. ponit nouam speciem charae, quae dicitur chara *batrachosperma*, caule ramoso, filamentoso; ramis foliaceis, capillaceis, in glomeres lubricos geniculatos articulatim circa caulem dispositis, praedita, quam etiam subiuncta figura, ad viuum picta et aeri incisa, a b. BUTTNERO Cl. Auctori communicata hic sistit; fusius describitur. Tremellam *Lichenoidem* L. ob scutellas, quae feminis milii magnitudinem habebant, in ea repertas, ad lichenes amandauit et lichen foliaceus gelatinosus foliorum segmentis capillaceis scop. flor. Carn. dicitur. Lichenis *laciniati* tres varietates α . saxatilem, (qui L. *saxatilis* L. est) β . arboreum, γ . physodem (qui L. *physodes* L. est) constituit, ad lichenem caninum quoque L. *aphthosus* L. vt varietas, refertur. Scyphiferos vero omnes ad vnicam speciem reduxit, quae omnes reliquas, vt varietates, comprehendit. Mnium, foliis distichis, pinnis subtus auriculatis L. *Iungermannia cochleariformis* ab eo dicitur.

Classe

*) vid. Linn. Syst. N. ed. XII. no. 1215. et Comment. nostr. Vol. XVI. p. 108.

**) vid. LINN. Syst. N. ed. XII. p. 613, et Mantiss. p. 23. et Comment. nostr. Vol. XVI. p. 124.

Classe secunda muscos vti *mnia*, *brya*, *hypna* p. 135.
 cet. complectitur; quorum postquam structuram,
 modum florendi et propagationem, de qua eandem,
 quam Cl. MEESE *) et NECKER **) fouet sen-
 tentiam, exposuit, genera et species, secundum has
 notas disposuit, scilicet *Mnia* dicit, *omnes muscorum* p. 143.
species, quae duplices surculos habent, alios stelligeros,
alios capsuligeros, capsula, calyptra laevi instructa; Po-
lytricha, quae item gaudent duplicibus surculis aliis
stelligeris, aliis capsuligeris, capsula vero, calyptra pi-
losa; Brya, quae solas capsuligeras proferunt setas in-
ferne nudas; Hypna, quae item solis capsuligeris setis,
inferne perichaetio cinctis, instructae sunt. Quam di-
 stinctionem Cl. Auctor minus difficilem esse credit,
 cum quivis cognitam speciem facile possit ad genus,
 quod illi magis placeat, referre. *Mnium, calyptra* p. 173.
villosa L. ad *polytricha* refert, et *polytrichum, capsu-*
la cylindrica erecta, surculis simplicibus, breuissi-
mis, foliis ferrulatis praeditum, dixit; nec non bryum p. 175.
striatum L. ad hoc genus amandavit. *Mnium pur-* p. 198.
pureum L. *bryis* et *bryum caespitium, capillare,*
glaucum, murale, Hypnoides, scoparium, heteromal-
lum nec non *mnium setaceum* et *cirrhatum*, LINN.
hypnis associavit. *Hypnum rusciforme* species est p. 225.
 noua, nondum a LINNAEO descripta.

Classe tertia filices enumeravit, quae, cum veris p. 277.
 distinctis feminibus propagentur, propius ad perfe-
 ctiores plantas accedunt quam *algae* et *musci*. At-
 tributa eorum generalia haec sunt: Plurimae sunt suf-
 frutices, annuae et arborescentes, quarum maxima pars
 regiones Indiae vtriusque calidiores, pauciores Eu-
 ropae incolit; ex radice firma sublignosa surgunt
 frondes foliaceae, solitariae aut plures, cauliculo
 Yy 4. inniten-

*) vid. Comment. nostr. Vol. XVII. p. 645.

**) vid. Acta academiae Theodoro-Palatinae. Tom. II.
 P. 423.

- innitentes longo, qui proprie *stipes* vocatur, in plurimis triquetro, interius sulcato, inferne squamulis furfuraceis in iunioribus obsito, per aetatem decidentes. *Fronde*s eorum nunc ex uno simplici folio, integro, (*fronde*s simplicissimae) vel in lobos plures, (*fronde*s lobatae) aut pinnulas, basi cohaerentes, dissecto; (*fronde*s pinnatifidae, subpinnatae) nunc e pluribus foliis, quae pinnae dicuntur, constant, (*fronde*s pinnatae) nunc in minores fronde
- p. 278. *l*aterales lobatas, aut pinnatas, ramorum instar, diuisae, (*fronde*s subbipinnatae, semi bipinnatae, bipinnatae) quae iterum aliquando in minores lobos aut pinnulas distinctae sunt, (*fronde*s compositae) et ulterius repetita ramificatione (*fronde*s decompositae, supra decompositae) nominantur. Fructificationes omnes e copiosis capsulis constant, quarum nonnullae annulo elastico cinctae sunt, et in auersa parte pinnarum frondis collectae, sub forma punctorum, aut linearum totum dorsum frondis occupant, vel spicam peculiarem sub nomine *scapi florigeri* formant, in quibus semina vel solitaria vel plura, similia tenuissimo pollini colorati continentur. Quod ad interiora filicum attributa, saporem nempe, odorem, viresque medicas attinet,
- p. 281. Cl. Auctor haec refert: sapor varius, quarundam austerus, subadstringens, amaricans, aliarum subdulcis, plerarumque nauseosus. Odor permultarum specierum, praecipue recentium, grauis, nauseosus, foetens, sensus ad tempus obtupefaciens, cephalalgiam produciens. Vi medica gaudent pituitam incidendi et eliminandi, neruorum sensibilitatem nimiam infrigendi et placandi, in qua indicatione, recentibus vtendum; ob amarum vero principium vermibus enecandis et expellendis inseruire possunt. Mutationes, a Cl. Auctore hac in Classe susceptae, praecipue hae sunt: *Osmunda spicant* L. peculiare genus *Struthiopteris* Ill. HALLERI auctoritate
- p. 287.

ritate constituit, cuius speciem dixit struthiopterin frondibus sterilibus, pinnatifidis, pinnulis densis, oblongis, falcatis; fructificantibus maioribus, laxius pinnatis, angustioribus. Acrostichum *Thelypteris* L. Polypodiis adiunxit. Polypodium *Filix femina*, quatuor varietates constituit, nempe α . *crenatam* *) β . *dentatam*, (quae P. Filix femina L. est) γ . *spinosam*, δ . *cristatam*, (quae an sit P. cristatum L. dubitat Noster, cum frondes subtripinnatas habeat.) Polypodium *fragile* et *rhaeticum* L. ut varietates ad polypodium p. 319. quod *fumarioides* appellat, refertur, primaque dicitur polypodium frondibus bipinnatis, pinnis remotis suboppositis, pinnulis obtuse lobatis, fructificationibus dense confertis; altera pariter frondibus p. 326. bipinnatis: pinnis remotis suboppositis, pinnulis vero acute laciniatis, et fructificationibus laxioribus.

Equiseta Cl. Auctor prorsus e filicum numero exclusit, dum inquit: *non potui commode ad hunc ordinem referre. Affine quidem videtur equisetum, ob spicas florales, a reliquo caule distinctas, Osmundae, et crura florum equiseti mobilia, pollen alterna contractione et dilatatione explodentia, similitudinem quandam habent cum annulis elasticis capsularum quarundam filicum, sed reliquus habitus tam diuersus est, ut immediata coniunctio locum non habeat.* Hinc Cl. Auctor equisetum cum b. BUTTNERO generi Ephedrae, donec aliquid certi a summis botanicis de hoc genere decernatur, proximum ponit. Ceterum libellum hunc, ob descriptiones et obseruationes bonas, cuius speciei adiunctas, tironibus vtilissimum censemus.

*) Hoc est Polypodium (*molle*) frondibus subbipinnatis pinnulis lanceolatis obtusiusculis apice crenulatis SCHREBERI; vid. eius *Spicileg. Fl. Lips.* no. 1027.

Noua physico Medica.

Praemium 1771, quaestioni: de legibus retardationis, quam patiuntur fluida in canalibus etc. *) destinatum, ab Academia scientiarum, inscriptionum et elegantiorum literarum *Tolosana* adiudicatum est Cl. abbati BOSSUT.

Cum vero haec eius elaboratio canales solummodo attineat apertos, eandem ad praemium 1774 reportandum non potuit non Academia ita proponere: *ut leges retardationis, quam patiuntur fluida in canalibus clausis, quoad peripheriam et angulos determinantur. (d'éclaircir les loix du retardement, qu'éprouvent les fluides dans les conduites dont les tuyaux sont fermés sur tout dans ceux, qui font des contours et des angles.)*

Quod autem praemia 1772 et 1773 spectat, quoniam huius quaestio ad nos non pertinet et illius, **) quod inoculationem concernit, iam mentio facta est, mittimus, nec legibus enarrandis, quae in mittendis commentariis sint obseruandae, cum iam aliquoties a nobis sint repetitae, immoramur.

Quamquam ab Academia regia scientiarum *Burdegalsi* duplex praemium 1771, moneta nimirum aurea trecentarum et argentea totidem librarum, quaestioni de sacchari coctura ***) dicatum, distribui potuerat, tamen hoc non factum, sed eandem quaestionem 1774 usque dilatam esse Academia vulgavit. Omnino enim *Eadem* iustam ac integram huius rei explanationem non breui posse expectari, sed annos potius, ad experimenta, accurate atque assidue instituenda, requiri, bene intellexit. Quapropter cum Academia eandem repetimus.

Optat

*) vid. Comment. nostr. Vol. XVI. p. 707.

**) v. ibid.

***) vid. Comment. Vol. XV. p. 707.

Optat nimirum Ea, ut quis *simpliciore* minusque sumtuosam, ac constet, methodum, saccharum coctura optimum reddendi, tum qualitate, cum quantitate, persequatur. (qui donneroit un procédé plus simple et moins dispendieux, que ceux, qui sont connus et qui, d'ailleurs fût le plus soû pour obtenir par le raffinage le sucre de la plus belle qualité et dans la plus grande quantité possible.)

Quaestio 1771 proposita est haec: Vult nempe Academia, ut exhibeantur notiones clarae et distinctae virtutum medicarum regni animalis, ut species verae medicamentosae eruantur, ac potissimum in vipera, cancro fluviatili, testudine et spermate ceti, singularum harum specierum analysis chemica addatur, et morbi, quibus adhiberi possunt, attente obseruentur ac describantur. (Que l'on donne des notions claires et précises des propriétés médicinales du regne animal, que l'on indique les espèces vraiment médicamenteuses et qu'en particulier on étende ses recherches sur les vipères, les écrevisses, les tortûes et le blanc de balaine; qu'on donne l'analyse chymique de chacune de ces substances et qu'on l'appuye d'observations exactes et faits avec soû dans les maladies pour lesquelles on les aura employées.)

Caeterum 1772 tria praemia distribuit Eadem Academia, quorum duo a nobis sunt commemoranda. Vnum illudque duplum, quaestioni 1770 propositae: quaenam optima methodus mari metiendi celeritatem seu cursum navium etc. *) dictum est; alterum praemium pertinet ad quaestionem hanc: quaenam sint alimenta hominibus potissimum conuenientia (quels sont les alimens le plus analogues à l'espèce humaine.)

lis, qui his de rebus cum Academia elaborationes sunt communicaturi, ante 1 diem aprilis 1772 commen-

*) vid. Comment. nostr. Vol. XV. p. 173.

commentarii sunt mittendi. Quomodo et cui sint tradendi, supra *) iam narrauimus.

Praemium ducentarum librarum Gallicarum Academiae scientiarum *Vesontiensis* 1772 adiudicabitur ei, qui declaraturus est: *quaenam vegetabilia in annonae caritate iis, quae solito hominibus praebeant nutrimentum, possint substitui, et quaenam eorum sit praeparandorum methodus?* (qui indiquera les végétaux, qui pourroient suppléer en tems des disette à ceux que l'on emploie communement à la nourriture des hommes et qu'elle en devroit être la préparation?)

Reliquas ab *Eadem* virorum eruditorum examini subiectas quaestiones, cum a nostro instituto sint alienae, hic non curabimus, hocque vnicum praeterea addemus, quod commentarii ante diem 1 maii 1772 Cl. DROZ, qui Academiae perpetuo ab epistolis est, ita sint tradendi, vti aliis Academiis solent.

Moneta aurea trecentarum librarum Gallicarum, praemium Academiae scientiarum elegantiorum literarum et artium, quae *Ambiani* floret, et quaestioni, quae spectabat relationem morum Gallicorum ad eorum sanitatem etc. **) dicatum, Cl. MARET Academiae scientiarum, artium liberarum et elegantiorum *Diuionensis*, secretario, cuius elaboratio digna est iudicata, quae praemio condecoraretur, est distributa.

Directorium regium *Berolinense* generale redituum supremum tres quaestiones 1772 eruditorum virorum subiecit examini.

Ac prima quidem sic se habet: *possuntne in regionibus Borussicis lapides tales produci atque reperiri,*
qui

*) vid. comment. nostr. Vol. XV. p. 443.

**) vid. comment. nostr. Vol. XVI. p. 709.

qui *Markersbacensibus* vel meliores vel similes, sunt apti ad *substructionem* (*Futterung* vel *Vordersteine*). Qui, nisi reperiri possint, expectatur compositio eiusmodi, huic vsui accommodata. Praemium huius quaestionis constat ducentis imperialibus, ac distribuetur post 30 diem iunii 1772, quo explanationem huius quaestionis directoribus iam traditam esse oportet.

Alterà quaestio ita est comparata: *quaenam sit optima siphonis species, ad flammam exstinguendam apta, quae in terra continenti et utilissima et commodissima sit, nec pretium centum imperialium excedat, simul cum descriptione de eius usu et conseruatione.* Praemium est idem et terminus die 30 sept. 1772.

Tertia tandem quaestio eo redit, vt declaretur *modus, quo ferrum ex arenosa et (brandigen) sic dicta alba minera ferri ortum et fusum facillime et ita corrigendum sit, vt eius tenacitas et inflexilitas (Kaltbrüchigkeit) tollatur atque necessaria malleabilitas, ductilitas et flexilitas acquiratur.* Terminus est idem, praemium mille imperialium.

Respicendum autem est ei, cui hanc in rem inquirere placebit, ad minerae praeparationem, quae huic vsui est conuenientissima, porro ad furni fusorii dispositionem, et ad fluxum necessaria maximeque idonea additamenta; dein ad flammae (*Frischfeuer*) huius formandae, excitandae atque dirigendae rationem, malleique grauitatem, eamque, qua ille incidit, altitudinem. Ac potissimum quidem quod flammam concernit, id videndum est, vt ferrum depuratum (*Stabeisen*) tribus octauis vel vna tertia impuri ferri parte tantum deperdita, nec nisi centum et decem modiorum vel centum nonaginta duorum pedum cubicorum cum dimidio carbonum, ad quinque centenarios adhibito, sumpta perficiatur.

Nuper

Nuper retulimus ad nostros Lectores de noua Societate physico experimentalis cum priuilegio statuum Belgicorum *Bataua* ab amico quodam artium atque scientiarum fundata *Roterodami*, *) cuius instituti rationem, quantum nobis tunc temporis constiterat, ibi dedimus.

Iam is quaedam, quae postea legimus relata, addemus. Ac primum quidem ille amicus, et huius foundationis Auctor est STEPHAN HOOGENDYK peritus mechanicus, horologiorumque faber eiusdem ciuitatis. Dein summa pecuniae, cuius partem vnā Societas iam accepit, et alteram post eius obitum nanciscetur, constat 150000 florenis *Batauis*.

Viennae ab Augustissimo Imperatore Academia artium ac scientiarum fundata est, sub protectione Celsissimi Principis KAUNITZ, cuius instituti rationem quamquam nondum experiri potuimus, hoc tamen interea narrabimus, Cl. RIEDELIUM, Professore Erfordensem ibi esse vocatum et sodalem huius Academiae cum annuis redditibus ac dignitate esse electum; qui quoque Erfordiam iam reliquit et hoc munus adiit.

Hamburgi, Cl. P. D. GISEKE Cl. WOLFIO physices, poeseos et historiae naturalis professori die 17 decembris 1771 successit.

Erfordiae, IOANNES CAROLUS OETTINGER, medicinae doctor nuperrime medicinae Professor Extraordinarius est designatus.

Gieffae, Cl. CHRISTOPHORUS LUDOUICUS NEBEL medicinae doctor professionem medicinae extraordinariam obtinuit.

Non

*) Comment. nostr. hoc Vol. p. 345.

Non successisse *Lugduni Batauorum* Cl. GUALTIER VAN DOEVEREN b. BERNARDO SIEGFRIEDO ALBINO, uti retulimus *), sed fratrem eius FREDERICVM BERNARDVM ALBINVM, qui quoque nouum hoc munus adiit die 30 aprilis 1771 oratione *de ambulatione de eaque utili et necessaria*, experti sumus.

Cl. DOEVEREN, vero, eodem tempore in hanc Academiam *Lugdunensem*, vocatus, ac quoque professor medicinae ordinarius nominatus, orationem aditalem die 6 maii 1771 *de recentiorum inuentis, medicinam hodiernam, veteri praestantior*, reddentibus habuit.

In *Eadem* Academia Cl. EDVARDVS SANDIFORT anatomiae et chirurgiae professor extraordinarius *) est designatus, qui die 22 maii 1771 *de optimo anatomico* verba fecit.

Exeunte iunio 1771 obiit *Amstelaedami* TOLCARDVS SNIP medicinae doctor atque anatomiae et chirurgiae professor, cui successit ANDREAS BONN medicinae doctor.

Patauii, 5. nouembris die 1771 anno octuagesimo nono aetatis IOANNES BAPTISTA MORGAGNI de Forli vitam cum morte commutauit, cuius memoriam ut in posterum tradamus, omnem nauabimus operam.

Londini IOANNES BEVIS cognitione stellarum earumque cursus in primis clarus die 26 nouembris 1771 desiit viuere.

Dublino die 5 nouembris 1771 Experientissimus CAROLUS LVCAS. qui artis pharmaceuticae gnarus

*) Comment. nostr. h. vol. p. 163.

**) v. Comment. nostr. l. c.

rus primum, dein medicinae sese dicauit summos-
que in ea obtinuit honores, ac potissimum in examine
aquarum, quas et accurate descripsit, et de aquis
simplicibus, medicatis et balneis naturalibus egit *)
versatus est, ex hac vita discessit,

Parisiis Rex Galliae nouum ordinem noua cum
dignitate Directoris obseruatorii regii cum stipendio
annuo trecentarum librarum Gallicarum in vsum
Cl. CASSINI AB THURN constituit. Filius pa-
tri succedet.

Hamburgi aedes Eimbeckianae theatro publico
anatomico sunt destinatae, quod die 10 decembris
1771 cadauere infanticidae, omni, qua par est, so-
lemnitate a Cl. IOACHIM. FREDERIC. BOL-
TEN oratione adituali: *de necessitate, vt medici et chi-
rurgi sint anatomici et obstetrices eiusdem artis peritae*
celebratum est. His rite peractis, a Cl. BOLTEN
cadaueris anatomia est incepta.

Altdorfi memoria aedificii publici vniuersita-
tis, quae ibidem floret, die 30 septembris 1571
constituti ac per duo secula omni, incolumitate
conseruati, eodem die 1771 a GEORGIO AN-
DREA WILL est renouata peculiari libello
ita inscripto, **) in quo multae res, initia huius Aca-
demiae concernentes, simul continentur.

Parisiis vir quidam aetate prouectus lethargia ita
afficiebatur, vt vere mortuus videretur et sepeli-
retur.

*) vid. comment. nostr. prim. decad. suppl. I. p. 7.

**) Gedächtniß des vor zweyhundert Jahren den 30 Sept.
1571 gelegten Grundes des vortreflichen Collegien-Ge-
bäudes der Universität Altdorf, erneuert am 30 Sept.
1771. von GEORG ANDREAS WILL. Altdorf, 4.

retur. Sepulcro autem octo diebus post iterum aperto, locus, vbi cadauer nuperrime inhumati depositum esset, vacuus, corpus ipsum vero longe abhinc linteaminibus, quibus investitum fuerat, sanguine plenis tinctisque inueniebatur atque brachiis demorsis.

Non possumus non alicuius pulueris, contra pestem effectum, qui profecto omnem meretur attentionem et cuius veritas magnopere exoptanda est, hic annunciare. Relatum nimirum nuperrime in variis publicis nouellis legimus, vbi de Russia quaedam res proponebantur, esse ibidem medicum, qui puluere quodam, ab eodem inuento, homines contra pestem tuetur. Id quod ab eo viginti et quinque exemplis probatur atque illustratur. Hi enim erant malefici, quos, sumto hoc puluere, non solum lectulis, in quibus peste laborantes sunt mortui, affixit, sed etiam linteaminibus ac vestimentis peste demortuorum inuoluit sine vlla omnino pestis infectione. Cum vero multi sint, hunc morbum pestis nomine insigniendum esse dubitantes, qui ibidem grassatur, nec medici, qui hoc expertus est, nobis sit notum, nomen totaque res non omni omnino dubitatione vacare videatur, aliquam inter legendum subdubitandi rationem, quam non nisi experimentorum, tam feliciter institutorum, continuatio est sublatura, nobis fuisse enatam fatemur.

XIV.

Continuatio indicis scriptorum physico - medicorum, quae anno 1769 prodierunt.

Treatise on the cause and cure of the gout. By
JOHN CAVERHILL. Lond. 8. mai.

Moral and medical dialogues. By CH. COLIGNON. Cambridge, 8.

Eiusd. medicina politica. ib. 8.

Traité de la vérole et de toutes les maladies vénériennes, par Mr. COSTE iun. à Paris, 8.

HENR. IO. NEPOM. CRANTZ stirpium Austriacarum Pars I. continens fasciculos tres cum figuris aeneis. Edit. alter. auct. Vienn. 4.

Eiusd. stirpium Austriacarum Pars II. continens fasciculos tres, cum figuris aeneis. ib. 4.

Eiusd. classis cruciformium emendata in necessarium institutionum rei herbariae, supplementum Lips. 8. mai. c. fig. aen.

Eiusd. de duabus draconis arboribus botanicorum Vienn. 4. mai. c. fig. aen.

A plain account of the diseases incident to children with an easy method of curing them. By JOHN CROKE. London, 8.

A treatise on the structure and formation of the teeth. By R. CURTIS. ib. 8.

REN. DAHÜRONS vollständiger Gartenbau. Achte Auflage. Weimar, 8. m. K.

Vergleichung der natürlichen und eingepfropften Blättern nach Vernunft, Erfahrung und Religion angestellet von IOHANN FRIEDRICH DANNEIL Consistorialrath und Pastor in Quedlinburg. Quedlinb. 8.

HENR. FRID. DELII de vultu sereno morientium oratio, quae piis manibus GHPH. IAC.

TREW

TREW Academiae Fridericianae Erlangensis nomine parentavit. Erlang. 4.

A letter to Dr. R. HUCK on the construction and method of using vapour-baths by THOM. DENMANN. Lond. 8.

Agriculture, Vol. II. By ST. DICKSON. ib. 8.

THOM. DIMSDALE nytt och för tiden antagit hoppymprungs sätt iänte några förfök som wisa at samma methoden med framgång bliswit nyttiad i naturlige kopper. The Stokholm, 8.
(*Haec versio facta est ab ABRAHAMO BAECK*)

Raadgevinge om de inentinghe der ziekte van t' rundvee op eene gemaakkelyke, onkostbaare en voordeelige manier te doen, uit eigene ondervindige opgemaakt door G. VALT. VAN DOEVEREN Med. D. en Professor te Groningen. Te Groningen, 8.

Méthode pour cultiver les arbres à fruit et pour les élever en treille. Par les Sieurs DE LA RIVIERE et DUMOULIN. à Paris, 12. Vol. I.

I. B. EBERENZ *erste Gründe der Wasserbaukunst an reißenden Flüssen, theoretisch und practisch beschrieben. Frankf. am Mayn, 8. m. K. 2 Theile.*

IO. PET. EBERHARD *Gedanken von dem Nutzen der Mathematik und ihrem Einflusse in den Staat. Halle, 8.*

IO. THEOD. ELLERS *Physiologie und Pathologie herausgegeben von D. I. L. ZIMMERMANN 3te vermehrte Auflage. Altenburg, 8. mai.*

Einleitung in die Vieharzneykunst von IO. CHRISTIAN POLYCARP ERXLEBEN. Göttingen und Gotha, 8.

CHRIST. EHRENF. ESCHENBACH *Observata anatomico chirurgico medica rariora.* Rostoch. 8. c. f. Editio altera aucta.

I. A. EULERS *Briefe an eine deutsche Princessinn über verschiedene Gegenstände aus der Physik und Philosophie. Erster und zweyter Theil.* Leipzig, 8. mai.

An essay on the medical virtues of acids. By SAMUEL FARR. Lond. 8.

IO. FRIDR. FASELI *gerichtliche Arzneygelahrheit. Zwote verbesserte Auflage.* Budissin, 8. mit Kupf.

FRANC. RIGAIL FELIX *diff. inaug. de intestinorum intusufceptione.* L. B. 4.

Elements of the practice of physic. By GEO. FORDYCE. Vol. II. London, 8. (*Volumen primum anno 1770 demum prodiit.*)

Eiusd. Grundsätze der ausübenden Arzneygelahrheit. Die Geschichte und Behandlungsarten der Fieber und innerlichen Entzündungen. Nach der zwoten und verbesserten Ausgabe, übersetzt aus dem Englischen. Kopenhagen, 8.

Rariores observationes medico practicae anatomicae a CASPARO M. FORLANI editae. Decas prima. 8. c. f.

Cours d'hippiatrique, ou anatomie physiologique et pathologique du cheval: Ouvrage enrichi d'environ 60 planches en taille douce, dessinées d'après nature et gravées avec soin. Par Mr. LA FOSSE. à Paris, fol.

Observations et experiences sur le charbon malin avec une methode assurée pour le guérir par Mr. FOURNIER médecin pensionné de la ville de Dijon. à Dijon, 8. mai.

Experiments and observations on electricity made at Philadelphia in America. By BENIAMIN FRANKLIN

LIN. To which are added letters and papers on philosophical subjects. The whole corrected, methodized, improved and now first collected into one volume and illustrated with copper plates. Lond. 4.

DAV. FRENZELS *Verzeichniß der Edelgesteine, Fossilien, Naturalien, Erdarten und Versteinerungen, welche in den Bezirken der Stadt Chemnitz in Meissen gefunden und bemerkt worden.* Chemnitz, 8 mai.

GEORG. ALBR. FRIED *der Arzneygelahrtheit Doctors und Geburtshelfers der Stadt Strasburg, Anfangsgründe der Geburtshülfe zum Gebrauche seiner Vorlesungen.* Strasburg, 8. m. Kupf.

PET. ADRIAN GADD *diff. de originaria corporum mineralium electricitate.* Resp. B. Iacob Ignatius. Abo, 4.

Eiusd. *diff. om akta safran och des splantering,* ib. 4.

Eiusd. *diff. de infectis piscatoribus, in maritimis Finlandiae oris, noxiis.* ib. 4.

Eiusd. *diff. om siöfogels wärd och ans.* ib. 4.

Essays sur la putrefaction des humeurs animales, sur la suppuration et sur la coëne inflammatoire, traduits du latin de différens auteurs. Par 108.

IAC. GARDANE. à Paris, 12.

The practical gardener and gentlemans directory for every month in the year. By IAC. GARTON. Lond. 8.

A reply to Dr. SAUNDER'S pamphlat relatice to the dispute concerning the Devonshire cyder. By FR. GEACH. ib. 8.

IO. AUG. PHILIPP GESNER *).

A treatise on continual, intermitting, eruptive and inflammatory fevers, with observations extracted from the writings of the most eminent practitioners,

*) v. supra p. 555.

ners, both ancient and modern and confirmed by the Author's own experience in the course of twenty years practice. To which is added an account of epidemic fevers from HIPPOCRATES SYDENHAM and LANCISI. By JOHN GIBSON. London, 8 mai.

10. GOTTL. GLEDITSCH *Betrachtung des Bienenstandes in der Mark Brandenburg, nebst einem Verzeichnisse von Gewächsen, aus welchen die Bienen ihren Stoff zum Honige und Wachse einsammeln. Riga und Mietau, 8.*

Eiusd. *alphabetisches Verzeichnis der gewöhnlichsten Arzneypflanzen, ihrer Theile und rohen Produkte, welche in den größten deutschen Apotheken gefunden werden, vor die Anfänger in der Arzneywissenschaft, Wundarzney und Apothekerkunst entworfen. Berlin, 8.*

Treatise on the effects and various preparations of lead, translated from the French. By Mr. GOU-LARD. Lond. 8.

10. IACOB. GREINER *diff. inaug. de vesicatoriorum praestanti in variolis usu, magno pro extirpatione argumento. Praemissa inoculationis historia. Argentorat. 4.*

10. IAC. GRIESINGER *Stadtorganisten in Mün-
singen, vollständiges Bienenmagazin, in welchem von der Bienenpflege überhaupt, der Bienen natürlichen Generation, Ursprunge und Präparation ihres Honiges und Wachsbaues, deren Gebrechen etc. aus eigener und anderer gegründeter Erfahrung, durch Exempel mit ganz neuen Entdeckungen erläutert, auf das vollständigste gehandelt wird. Mit vielen Kupfern. Ulm. 8.*

FRANC. ANT. GUERIN *diff. inaug. de fontibus medicatis Alsatie. Argentor. 4.*

*Traité sur les maladies des yeux, contenant un nou-
vel*

vel instrument pour faire l'opération de la cata-
racte. Par Mr. GUERIN. à Lyon, 12.

Nouveau choix de récréations physiques et mathe-
matiques. Par Mr. GUYOT. à Paris, 4. c. f.
Vol. 4.

ANT. DE HAEN ratio medendi. Tomus sextus par-
tem XI. complectens: Accessere tractatus varii,
scilicet historia morbi miri, incurabilis; de deglu-
titione et de methodo inoculandi variolas. ib. 12.

*Physikalische Betrachtungen über die Weidenwiesen und
die in Preußen sechszehn befindlichen Weidenarten,
von IO. HEINR. HAGEN Königl. Hofapothe-
ker. Königsb. 8.*

ALB. DE HALLER nomenclator ex historia plan-
tarum indigenarum Helvetiae excerptus. Bern, 8.

*Eiusd. Erster Umriss der Geschäfte des körperlichen
Lebens. Aus dem Lateinischen übersetzt. Berlin, 8.*

Traité général de pêches et histoire des poissons,
quelles fournissent tant pour la subsistance des
hommes, que pour plusieurs autres usages, qui
ont rapport aux arts et au commerce. Par Mr.
DUHAMEL DU MONCEAU et Mr. DE LA
MARRE Sect. I. II. à Paris, fol.

Philosophical essays on the following subjects 1) on
the ascent of vapours, the formation of clouds, rain
and dew and on several other phaenomena of air
and water 2) observations and coniectures on the
nature of the aurora borealis and the tails of co-
mets 3) on the principles of mechanics. By
HUGH HAMILTON Edit. 2 improved and en-
larged. Lond. 12.

GEORG. ERHARD. HAMBERGERI elementa
physiologiae medicae, denuo edita et nonnullis
adnotationibus locupletata a C. F. MAYERO.
Ienae, 8.

PETR. IMMANUEL HARTMANN diff. inaug.
Zz 4 sistens

sistens cautiones nonnullas, ad liquoris mercurialis Plenckiani vsum spectantes. Resp. *Christ. Jacob Sommer*. Franc. ad Viadr. 4.

Eiusd. diff. inaug. expendens controuersias, de exanthematum acutorum ortu nuper motas. Resp. *I. H. Pietzsch*, ib. 8.

Eiusd. diff. inaug. de salice laurea odorata LINNAEI pertandra. Resp. *Christ. Henric. Speckbuck*, ib. 4.

Two papers on the use of olcum asphalti in ulcers of the intestines, lungs and other viscera taken from the verhandeligen van de Maatschappye te Harlem, translated by TH. HEALDE. London, 8.

Obseruatio transitus veneris ante discum solis d. 3. iunii, 1769 a R. P. MAXIMIL. HELL e. S. I. Wardoehus. et Hafn. 4. c. f.

CAR. FRIED. CHRIST. HENNEMANN diff. inaug. de obliquitate uteri et positura infantis obliqua et iniqua. Gotting. 4.

* HELSHAMI physica experimentalis Newtoniana ex edit. 3. Londin. Anglica in latinum translata a GEORGIO MEZBURG e S. I. Vindob. 4. c. f.

IOACH. FRIEDR. HENCKELS *neue medicinische und chirurgische Anmerkungen mit Kupfern erläutert. Erste Sammlung. Berlin und Stralsund.* 8.

IOH. FRIEDR. HENCKELS *kleine mineralogische und chymische Schriften mit Anmerkungen von C. F. ZIMMERMANN. Wien, 8. m. K.*

IO. IAC. HENR. HERRMANN diff. inaug. de variis causis infanticidiorum. Lips. 4.

IO. DAV. LUD. HERZOG diff. inaug. de morbo articulari, speciatim venereo, praesertim de arthritica quadam feliciter sanata. Helmst. 4.

Apologie de la nouvelle méthode d'inoculer par Mr. HEWIT. à Breme, 8 mai.

The

The vegetable system or a Series of experiments and vations tending to explain the internal structure and the life of plants their growth and propagation. The number, proportion and disposition of their constituent parts with the true course of their iuices: the formation of the embryo, the construction of the seed and the encrease from that state to perfection including a new anatomy of plants. The whole from nature only.

By JOHN HILL M. D. Lond. 4. c. f.

Eiusd. Hortus Kewensis secunda editio. Lond. 8.

Eiusd. The vegetable system or the internal structure and the life of plants, their parts and nourishment explained, their classes, orders, genera, and species ascertained and described in a method altogether new comprehending an artificial index and a natural system. with figures of all the plants designed and engraved by the Autor; the whole from nature only. Vol. XIV. et XV. fol.

Eiusd. herbarium Britannicum, exhibens plantas Britanniae indigenas, secundum methodum floralem nouam digestas, cum historia, descriptione, characteribus specificis viribus et vsibus; tabulis aeneis illustratum. Vol. I. Lond. 8. mai. c. f.

Eiusd. the family practice of physick or a plain intelligible and easy method of curing diseases with the plants of our own country. The asthma with bitter-sweet. The gravel with uva ursi. The dropsy with bark of elder. Bleedings with iuice of nettles. And other disorders with simple medicines prepared from such plants, which are safe and effectual in any hands, to be had at a small price in all places in town or country; and accompanied with such directions that any person may use them successfully for himself or his family: saving to all the danger of rough medicine

eines, and to the poor the expence of physicians and apothecaries. ib. 8. mai.

Polipody. The ancient doctrine of the virtues of that herb tried and confirmed. By I. HILL. Lond. 8.

Eiusd. a method of curing the iaundice and other diseases of the liver by the herb agrimeny taker in sue manner of tea. ib. 8.

Briefe über verschiedene Gegenstände aus dem Reiche der Arzneywissenschaft von IO. LEONH. ELIAS HIRSCHEL. Zweyter Theil. Berlin, 8.

Eiusd. Gedanken von der Starrsucht oder Catalepsis nebst einigen Zusätzen zu den Gedanken von der Heilungsart der hinfallenden Sucht. ib. 8.

I. M. HOFFMANN'S Med. Doct. zu Franckfurt am Mayn, unpartheyische Nachricht und Beurtheilung an das vernünftige Publicum, von den berüchtigten TISSERANT und dessen Bemühungen kröpfte, Taube, Stumme, Bucklichte, Lahme, mit der hinfallenden Sucht behaftete und dergleichen mit seinen Händen zu heilen. Fr. am Mayn, 8.

Examen des principales méthodes d'administrer le mercure dans les maladies vénériennes par Mr. DE HORNE. à Paris, 8. Vol. I.

PHILIPP D'HUCQUETS Arzney und Chirurgie der Armen, oder allgemeines und nützliches Hausarzneymbuch. Aus dem Französischen. Augsb. 8.

Dissertation sur le farcin, par Mr. HUREL. à Paris, 12.

IO. HUXHAMS Sammlung medicinischer Schriften. Zwote vermehrte Auflage. Bremen, 8.

CHRIST. FRID. JAEGER diss. inaug. de cantharidibus, earumque actione et usu. Resp. Christ. Ferdinand. Kayser. Tubing. 4.

Eiusd. diss. inaug. sistens experimenta de submersis cum subiuncto examine phaenomenorum, in iis obseruandorum. Resp. Eberh. Gmelin. ib. 4.

Practi-

Practical thoughts on the prevention and cure of the scurvy especially in the British navy. By WILL. JERVEY. Lond. 8.

A new system of midwifry in four parts; founded on practical observations, the whole illustrated with copper plates. By ROBERT WALLACE JOHNSON M. D. London, 4 mai.

10. IONSTONI historia naturalis de arboribus et plantis libri X. tabulis centum triginta septem, ab illo celeberrimo MATTHIA MERIANO aeri incisus ornati, ex scriptoribus tam antiquis, quam recentioribus maximâ cura collecti, quos ob raritatem denuo imprimendos suscepit. Tom. II. CXXXVII tabulas exhibens. Heilbrunn, fol.

Traité des lésions de la tête par contre coup et des conséquences pratiques par Mr. DUPRE DE L'ISLE. à Paris, 12.

Mémoire sur la culture de l'Esparcette ou sainfoin par Mr. RIGAUD DE L'ISLE. à Valence en Dauphine, 8.

Eiusd. traité des maladies de la poitrine connues sous le nom, de phthisie pulmonaire, ou l'on développe les causes, qui concourent à les produire, les accidens, qui en résultent, et la manière de les traiter dans les différens degrés. ib. 12.

FRID. CHRIST. JUNKER diss. inaug. de arthritide suppuratoria. Resp. C. L. Wagner, Hal. ad Salam, 4.

Eiusd. diss. inaug. de spasmo febrili, Resp. G. F. S. Cramer, ib. 4.

Eiusd. diss. inaug. de morbi ac symptomatis notione vera, Resp. C. O. Stegemann, ib. 4.

Eiusd. diss. inaug. de inflammatione pedis et abscessu femoris, sub curatione fracturae fibulae ortis, Resp. I. C. Rock, ib. 4.

Eiusd. diss. inaug. de chirurgiae, medicinae et philosophiae

phiae superstructae praestantia, Resp. E. S. Uhse, ib. 4.

IACOB KAAS diss. inaug. observationes quaedam de borace, inprimis de eius sale narcotico. Traiect. ad Rhon. 4.

ABRAH. GOTTH. KAESTNERS *Anfangsgründe der höhern Mechanik der mathematischen Anfangsgründe, vierten Theiles zweyte Abtheilung.* Göttingen, 8 m. K.

Lehrbegriff der gesammten Mathematik aufgesetzt von WENCESLAUS IOH. GUSTAV KARSTEN *III. und IV Theil.* Greifswalde, 8. m. K.

FRANC. ANTON KELLER diss. inaug. de empyematis singularis historia et epicrifi, Argent. 4.

SIMON HEINR. ADAM KEISERS *Versuch einer theoretischen und practischen Einleitung in die allgemeine und besondere Geschichte der Blattern oder Pocken,* Lemgo, 8.

IO. CHRIST. KERSTEN sermo panegyricus, ad augendum incolarum in Russia insufficientem numerum pro ruricolis plebeiis maxime monita et praecepta medica diaetetico-therapeutica. Moscuæ, 4.

Reply to Maxwell's answer by way of dialogue. By T. KIRKLAND. London, 8.

IO. THEOD. KLEINII *oryctographia Gedanensis oder Beschreibung und Abbildung der in der Danziger und umliegenden Gegend befindlichen Versteinerungen, nebst 14 illuminirten Tabellen.* Nürnberg. fol. min.

Vergnügen der Augen und des Gemüths in Vorstellung einer allgemeinen Sammlung von Schnecken und Muscheln, welche im Meere gefunden werden, herausgegeben von GEORG WOLFGANG KNORR *und dessen Erben in Nürnberg.* 4. 4ter Theil.

ANTON KOZLIANS *Prüfung der Ursachen von*
der

der Hornviehseuche mit dem Vorschlage, auf was Art derselben am sichersten Einhalt gethan werden könne. Wien, 8.

Supplementum florae Gryphicae, herbationibus accommodatum scripsit ALEXANDER BERNH. KÖLPIN. Gryphiswald. 8.

L. S. KOREFF diss. inaug. de causis febrium intermittantium autumnalium. Hal. ad Salam, 4.

G. F. KORDENBUSCHENS *Bestimmung der denkwürdigen Durchgänge der Venus durch die Sonne 1761. Nurnb. 4. mai. mit illuminirten K.*

CHRIST. GOTTL. KRATZENSTEIN diss. inaug. de duplici febrium indole. Auctor et Resp. Io. Clemens Tode. Hafn, 8.

Verzeichniß der vornehmsten Schriften von der Electricität und den electrischen Curen gesammelt von D. IOH. GEORG KRÜNITZ Leipz. 8.

IGNAT. XAVER. EMERIC. LACHAUSSE diss. inaug. sistens obseruationum bigam. Argent. 4.

Récherches sur la cause de la pulsation des artères, sur les mouvemens du cerveau et sur la coeune du sang par Mr. DE LAMURE Doyen des Professeurs Royaux. à Montpellier, 8.

Du passage de venus devant le soleil en 1769. par Mr. DE LA LANDE. à Amst. 4.

IO. IOACH. LANGENS *Anweisung zur mineralogia metallurgica mit Anmerkungen* IOH. CHR. MADIHNS. Halle, 8.

IO. COAKLEY LATTSOM diss. inaug. sistens obseruationes, ad vires theae pertinentes. L. B. 4.

LEHMANN V. SAGE

H. B. L. LEMBKEN'S *Beantwortung der Schrift des Herrn D. I. I. WALLBAUMS die Beschwerlichkeiten der Geburtshülfe aus Beyspielen erwiesen. Lübeck und Leipzig, 4.*

LEBR. FRID. BENI. LENTINI obseruationum medicarum fasciculus III. Cellae, 8.

C. F. LEUTNER diss. inaug. de nonnullis circa sudores frigidos in febre acuta attendendis. Hal. ad Sal. 4.

Précis de la médecine pratique contenant l'histoire des maladies et la manière de les traiter avec des observations et remarques critiques sur les points les plus interessens par Mr. LIEVTAUD. à Paris, 8. Voll. 2.

Eiusd. synopsis vniuersae praxeos medicae. Edit. noua multo amplios et accuratior. ib. 4. Voll. 2.

CAROL. LINNAEI systema naturae per tria regna naturae, secundum classes, ordines genera, species cum caracteribus et differentiis. Tom. I. II. III. Hal. ad Sal. 8. mai.

Eiusd. amoenitates academicae seu dissertationes variae physicae, medicae, botanicae antehac seorsim editae nunc collectae et auctae cum tabulis aeneis. Vol. VII. Holm, 8 mai.

CHRIST. GOTTL. LUDWIG institutiones medicinae clinicae praelectionibus academicis accommodatae. Ed. 2. Lips. 8.

Eiusd. progr. de lucubrationis damnis, in memoriam Sylversteinianam. ib. 4.

IOH. GOTTLIEB LEHMANNS *kurzer Entwurf einer Mineralogie zum Gebrauche der Vorlesungen, 3te Auflage.* Nürnberg. 8.

Lezioni di chirurgia dette da IPPOLITO ANDREA LOMI Fiorentino. Date alla luce dal Dottor LUCA GHERARDINI. In Firenze, 4.

A. C. LORRY *von der Melancholie und melancholischen Krankheiten. Aus dem Lateinischen übersetzt von M. C. A. W. mit einer Vorrede von D. CARL CHRIST. KRAVSE.* Franckf. 8 mai.

ANT. LOVIS de methodi Hawkinsonianae in calculosorum sectione praestantia positiones anatomicae et chirurgicae. Resp. Petr. Faguer, Paris, 4. c. f.

G. LVCAS *Versuch von Wassern 3ter Theil, von natürlichen Bädern. Aus dem Englischen übersetzt.*
von IOH. ERNST ZEIHERN. Altenb. 8. mai.

Astronomical observations made in St. John's college Cambridge in the years 1767. and 1768 with an account of several astronomical instruments.
By M. LINDLAM. Cambridge, 8.

Procédés chymiques rangés méthodiquement et définis: on y a joint le précis d'une nouvelle table des combinaisons ou rapports pour servir de suite aux instituts de chymie par Mr. DE MACHY Apothicaire des académies Impériale des curieux de la nature et Royale des sciences de Prusse. à Paris, 12.

Mémoire sur l'inoculation de la petite vérole, par Mr. MANGIN. à Paris, 8.

CHPH. ANDR. MANGOLDI opuscula medico-physica collegit et edidit ERNEST. GODOFR. BALDINGER. Altenb. 8.

Mémoire sur la manière d'agir des bains et d'eau douce et d'eau de mer et sur leur usage, qui a remporté le prix en 1767. au jugement de l'Académie Royale de belles lettres, sciences et arts de Bordeaux par Mr. MARET. à Paris et a Bordeaux. 8.

Viaggi per l'isola di Cipro e per la Syria e Palaestina fatti da GIOVANNI MARITI Fiorentino dall a. 1760 al 1768. in Lucca. 8 mai.

Nouvelle méthode facile et curieuse pour connoître le pouls par les notes de la musique par feu Mr. F. N. MARQVET; seconde édition augmentée de plusieurs observations et reflexions critiques et d'une dissertation en forme de thèse sur cette méthode, d'un mémoire sur la manière de guérir la mélancholie par la musique et de l'éloge historique de Mr. MARQVET. Par PIERRE IOSEPH BUCHOZ, à Amsteam et à Paris, 8.

Pratique

Pratique de l'hydropisie et de la jaunisse, développée par l'expérience, auquel on a joint quelques observations anatomiques et pratiques de quelques médecins sur d'autres maladies par Mr. F. N. MARQUET; révisé par Mr. BUCHOZ. à Paris, Vol. 1.

Neues systematisches Conchylien - Cabinet geordnet und beschrieben von FRIDR. HEINR. WILH. MARTINI Der Arzneigelahrtheit Doctor und Practicus in Berlin, und unter dessen Aufsicht nach der Natur gezeichnet und mit lebendigen Farben erleuchtet. Erster Band. Nürnberg. fol.

Zweytes Dutzend Beobachtungen, welche das Hirn betreffen von FERDINAND MARTINI. Kopenhagen. 8.

I. H. MAUCLÈRE nomenclatura critica morborum ocularium, or a critical index to the distempers of the eyes. Lond. 8 mai.

Expositio de transitu veneris ante discum solis die 23. maii 1769. Auctore CHRIST. MAYER. Petropol. 4. c. f.

10. FRID. MAYERS Fürstl. Hohenloh. und Waldenburg Schillingsfürstlichen Pfarrers zu Kupferzell Beyträge und Abhandlungen zur Aufnahme der Landwirthschaft nach den Grundsätzen der Naturlehre und der Erfahrung entworfen. Frankf. am Mayn. 8.

F. C. MEDICVS von dem Bevölkerungsstande in Churpfalz vorzüglich in Mannheim. Frankfurt und Leipzig, 8.

FRANC. CAROL. MELZER diss. inaug. de hernia crurali incarcerata. Argentorat. 4.

Medicinische Abhandlungen von den Vorbauungsmitteln nach den Tissotischen Grundsätzen entworfen, von CHRIST. IACOB MELLIN. Langensalze, 8.

Manière

Manière d'agir des bains d'eau douce et d'eau de mer par Mr. MERET Médecin à Dijon. Pièce qui a remporté le prix de l'Académie de Bourdeaux. à Paris, 8. Vol. 1.

10. FRID. MEYERS *Lehre vom Gypse, als einem guten Dunge zu allen Erdgewächsen. Anspach, 4.*

Elementa physiologiae medicae Hambergeriae, in usum praelectionum academicarum concinnata edidit CHRIST. THEOPH. MEYER, M. D. Ienae, 8.

De l'éducation des enfans tant physique que morale par Mr. THEO. SALOM. DE MEZA Médecin Portugais et Practicien à Copenhague depuis 16 ans. Copenhag. 8.

GEORG. PHILIPP. MICHAELIS diss. inaug. prolapsus ventriculi ab umbilico, Resp. Ioh. Iust. Ebert. Marpurg. 4.

Observations on the asthma and on the whooping cough. By JOHN MILLAR M. D. Appendix containing remarks of asa foetida. Lond. 8 mai.

Eiusd. Bemerkungen über die Engbrüstigkeit und das Hühnerweh. Nebst einem Anhang von der stinkenden Asa. Aus dem Englischen übersetzt von D. C. C. KRAUSEN. Leipzig, 8.

PHILIPP MILLERS *Gärtners der Apothecker-Gesellschaft in den botanischen Garten zu Chelsea, allgemeines Gärtnerlexicon, d. i. ausführliche Beschreibung der Geschlechter und Gattungen aller und jeder Pflanzen, nach dem neuesten Lehrgebäude des Ritters Linné eingerichtet, worinnen zugleich eine Erklärung aller botanischen Kunstwörter, und eine auf vieljährige Erfahrung gegründete praktische Anweisung zum Garten- Acker- Wein- und Holzbau enthalten ist. Nach der allerneuesten, sehr vermehrten und veränderten Ausgabe. Aus dem Englischen übersetzt. Erster Theil, Nürnberg. 4.*

Eiusd. *Abbildungen der nützlichsten schönsten und seltensten Pflanzen, welche in seinem Gärtnerlexicon Tom. XVII. Pars IV. A a a vorkommen,*

vorkommen, auf das genaueste, nach den von der Natur genommenen Zeichnungen, in Kupfer gestochen und illuminirt, auch mit einer ausführlichen Beschreibung und Anzeige der Classen, worunter sie nach RAI, TOURNEFORTII und LINNAEI Classification gehören, erläutert. Aus dem Englischen übersetzt. Nürnberg. fol.

P. G. MILLORADOVICS diss. inaug. de surditate, ex retropulsa crusta lactea orta. Hal. Magd. 4.

IO. MITCHELL diss. brevis de principiis botanicorum et zoologorum, deque nouo stabiliendo naturae rerum systemate congruo cum appendice aliquot generum plantarum recens conditorum et in Virginia obseruatorum. Norimberg. 4.

Traité de la vitriolisation et de l'alunation, ou l'art de fabriquer les vitriols et l'alun. Avec une dissertation sur la minéralisation et sur l'état du soufre dans les mines et les métaux. Par Mr. MONNET. à Amsterdam et à Paris. 8. c. f.

Médecine d'armée, ou traité des maladies les plus communes parmi les troupes dans les camps et les garnisons par Mr. MONRO médecin des armées Britanniques. Traduction de l'Anglois avec des augmentations considérables par Mr. LE BEGUE DE PRESLE Docteur Régent de la Faculté de Médecine de Paris, Censeur Royal. Ouvrage, qui contient des recherches sur les progrès de la médecine d'armée et le catalogue de livres publiés sur ses diverses parties: Les moyens de fortifier et conserver la santé des troupes dans les camps et les garnisons. L'établissement et l'administration des hôpitaux militaires soit fixes, soit ambulans avec leurs réglemens. Les symptômes, le traitement et les remèdes des maladies communes parmi les troupes dans les camps et les garnisons. Tome premier contenant le discours préliminaire et l'introduction. Tome second

second contenant les symptomes et le traitement
des maladies. à Paris, 8.

ANTON. MONTANI de remediis tractatus Pisae,
8 mai.

IO. AUG. MONTANI diss. inaug. de curatione vl-
cerum per puris resorptionem. Erford. 4.

Mémoire sur la meilleure manière d'ensemencer les
terres par le Sieur ARMAND MONTREAL de
Montpellier. à Montpellier, 4.

IO. BAPTIST. MORGAGNI de sedibus et causis mor-
borum per anatomen indagatis. L. B. et Lips.
4 mai.

Eiusd. the seats and causes of diseases illustrated by
anatomy translated by B. ALEXANDER. Lond.
4. Vol. I-III.

SIEG. MÜLLER diss. inaug. sistens raram de cal-
culo vesicae observationem et epicrisin. Argen-
tor. 4.

IO. ANDR. MURRAY *Abhandlungen von einer
böartigen Bräune und einer widernatürlichen Haut
in der Luftröhre; von den Krankheiten der Kinder
im Mutterleibe etc. Göttingen und Gotha, 8.*

Eiusd. de vermibus in lepra obuiis, iuncta leprosi hi-
storia et de lumbricorum setis, observationes, re-
giae societati scientiarum Gottingensi praelectae.
Gotting. 8. c. fig. aen.

I. N. DE NECKER deliciae Gallo-Belgicae sylue-
stres s. tractatus generalis plantarum Gallo-Bel-
gicarum ad genera relatus cum differentiis spe-
cificis secundum principia Linnaeana. Tom. I.
II. Francof. ad Moen, 8. c. f.

Nouvelles recherches sur les découvertes microscopiques etc. de l'Abbé SPALLANZANI avec des
notes, des recherches physiques et métaphysi-
ques sur la nature et la religion et une nouvelle
théorie de la terre par M. NEEDHAM F. R. S.
etc. à Paris, 8. mai.

FRANC. ALEXANDR. NEUHAUS diff. inaug.
fistens colicae hystericae casum cum sua epicrisi.
Argentorat. 4.

E. A. NICOLAI *Pathologie, erster Band. Halle, 8.*

ADAM NIETZKI diff. inaug. de febris malignae
ex hectica ortu eiusque eventu. Resp. C. F.
Leutner, Hal. ad Sal. 4.

Cours de médecine pratique redigée d'après les
principes de Mr. FERREIN par Mr. AR-
NAULT DE NOBLEVILLE. à Paris, 12.
Vol. I. II. III.

L'art des expériences ou avis aux amateurs de la
physique, sur le choix, la construction et l'usage
des instrumens, sur la préparation, et l'emploi
des drogues, qui servent aux expériences par Mr.
l'Abbé NOLLET del'Académie royale des scien-
ces etc. ib. 12. Vol. I. II. III.

Eiusd. *Vergleichung der Wirkungen des Donners mit
den Wirkungen der Electricität. Leipz. 8.*

I. PHILIPP NONNE diff. inaug. de antispasmo-
dicorum modo agendi et vsu. Resp. Rudolph.
Angust. Benedict. Saltzmann, Erford. 4.

ANDR. NUNN diff. inaug. de duabus prope
perinaeum fistulis, vrinam purulentam ex-
cernentibus. Resp. Matth. Franc. Alix. ib. 4.

Eiusd. diff. inaug. de peripneumonia. Resp. Io.
Willh. Bornmann, ib. 4.

GER. CHRIST. OEDERS *Verzeichniß der in den
Königl. Dänischen Landen bereits gefundenen und
vermuthlich wildwachsenden Kräuter. Copenhagen,
8 mai.*

Eiusd. *Nomenclator botanicus, ib. 8.*

*Abbildung der wilden Bäume, Stauden und Buschge-
wächse, welche nicht nur mit Farben nach der Natur
vorgestellet, sondern auch nach ihrer wahren Beschaf-
fenheit, nach den Stand ihrer Blätter, nach ihrem
Wachsthume und Alter, das sie gewöhnlich erreichen,
nach*

nach ihrer Erziehung und Pflege, die sie erfordern, kurz und gründlich beschrieben werden von CARL CHRISTOPH OELHAFEN VON SCHOELLENBACH der Reichsstadt Nürnberg Waldamtman. Herausgegeben, verlegt und mit den in Kupfer gestochenen und illuminirten Abbildungen versehen von ADAM WOLFGANG WINTERSCHMIDT Kunstverleger und Kupferstecher in Nürnberg. 4.

FRID. CPHP. OETTINGER de viribus radicis rubiae tinctorum antirhachiticis. Tubing. 4.

SIM. PALLAS *practische Anleitung die Knochenkrankheit zu heilen.* Berl. und Stralsf. 8.

Spicilegia zoologica, quibus nouae inprimis et obscurae animalium species iconibus, descriptionibus atque commentariis illustrantur cura PET. SIM. PALLAS Fasciculus V. VI. et VII. Berolin. 4. c. f.

Eiusd. Naturgeschichte merkwürdiger Thiere in welcher vornehmlich neue und unbekannte Thierarten durch Kupferstiche, Beschreibungen und Erklärungen erläutert werden. Aus dem Lateinischen von E. G. BALDINGER. Erste Sammlung. Berlin und Stralsund, 4.

Traité historique et pratique de la gravure en bois, par Mr. PAPILLON graveur en bois ancien associé de la société anatomique des arts; ouvrage enrichi de plus iolis morceaux de sa composition et de sa gravure. à Paris, 8. Vol. I. II.

Avis au public sur son plus grand intérêt, ou l'art de se préserver de la petite vérole réduit en principes et démontré par l'expérience par Mr. PAULET. à Paris, 12.

Chymisch - medicinische Abhandlung von denen destillirten Wassern und brennenden Geistern, dargestellt von D. IOH. PAULI. Kopenhagen, 8.

IO. THADDAEUS ANTON PEITHNERS *erste*

- Gründe der Bergwerkswissenschaften aus dessen physisch metallurgischen Vorlesungen.* Prag, 8 mai.
- Indian zoology P. I. By TH. PENNANT. Lond. fol. c. fig. color. distinct.
- Experiments and observations on water, particularly on the Hara pamp water of Manchester. By TH. PERCIVALL. ib. 8 mai.
- Discours sur la physionomie et les avantages de connoissances physionomiques par DOM. PERNET-
T V S. à Berlin, 8.
- La pagonotomie, ou l'art d'apprendre à se raser soi même, avec la manière de connoître toutes sortes de pierres propres à affiler tous les outils ou instrumens tranchans et les moyens de préparer les cuirs pour repasser les rasoirs, la manière d'en faire de très bons; avec le secret du fameux rouge d'Angleterre pour le poli de l'acier, approuvé par l'Academie royale des sciences suivi d'une observation importante sur la saignée par I. I. PERRET maître et marchand coutellier, ancien iurégarde. Paris, 12. Vol. I.
- P. PETERSENS *Beschreibung der Königlichen Reiseapotheke nebst Anweisung, wie die Krankheiten, welche Reisenden zustossen, erkannt und gehoben werden.* Lübeck, 8.
- CHR. ANT. PEUSCHELS *Abhandlung der Physiognomie, Metoposcopia und Chiromantie etc.* Leipz. 8. m. K.
- M. VAN PHELSUM *historia ascaridum pathologica.* Leoward. 8.
- Eiusd. explicatio partium phytographiae* LEONH. PLUKENETI. Harling. 4.
- JOSEPH IACOB PLENCKS *neues Lehrgebäude von Geschwülsten.* Aus dem Lateinischen übersetzt. Dresden und Leipzig, 8.
- Eiusd. Anfangsgründe der Geburtshülfe. Erster und zweyter Theil.* Wien, 8 mai.

IOS. IAC. PLENCKS neue leichte Art dem mit der
Luftseuche angestekten Kranken das Quecksilber zu
geben. Aus den Lateinischen übersetzt. Zweyte
verbesserte und vermehrte Auflage. Dresd. u. Lpz. 8.

Eiusd. Sammlung von Beobachtungen über einige Ge-
genstände der Wundarzneykunst. 1ster Th. ib. 8.

Traité des affections vaporeuses des deux sexes par
Mr. POMME. à Paris, 12. Vol. I. II.

Phyfiocratie ou constitution naturelle du gouverné-
ment le plus avantageux au genre humain par
Mr. DU PONT. à Berne, 8. Tom. I- VI.

Observations on the nature and consequences of
those iniuries to which the head is liable from
external violence. By PERCIVALL POTT.
Lond. 8.

Eiusd. Bemerkungen über den Wasserbruch und andere
Krankheiten der Hoden; nebst eben desselben Bemer-
kungen über Beinbrüche und andere Verrenkungen.
Aus dem Englischen übersetzt. Kopenhagen, 8.

Landwirthschaftliche Erfahrungen zum Besten des Land-
mannes. Eine Wochenschrift von IOH. HEINR.
PRATIE. Zweytes und drittes Quartal. Altona,
8. mai.

An account and method of cure of the bronchocela
or derbyneck. To which are subioined remarks
on some parts of M. ALEXANDER's experimental
essays. By THOM. PROSSER. Lond. 8. mai.

De la conservation des enfans ou les moyens de les
fortifier, de les préserver et guérir des maladies,
depuis l'instant de leur existence, iusqu'à l'âge de
puberté par Mr. RAULIN. Tom. II. à Paris; 12.

Eiusd. Von Erhaltung der Kinder von dem ersten Au-
genblicke ihres Entstehens an bis zu ihrer Mannbar-
keit. Aus den Französischen. Erster Theil. Leip-
zig, 8 mai.

Eiusd. Instructions succintes sur les accouchémens,

en faveur des sages-femmes de Province, faites par ordre du ministère. à Paris, 12. c. f.

Eiusd. observations sur l'usage des eaux minérales de Pougues avec l'analyse chimique de mêmes eaux par Mr. COSTEL. ib. 12.

Catalogue raisonné des tableaux, bronzes, terres cuites, figures et bustes de plâtre, dessins en feuilles et sous verre, estampes de toutes les écoles livres d'estampes et bijoux, qui composent le cabinet de feu Mr. CAYEUX sculpteur ancien officier de l'Academie de Saint Luc. Par PIERRE REMY. ib. 12.

La botanique mise à la portée de tout le monde, ou collection des planches représentant les plantes usuelles d'après nature avec le port, la forme et les couleurs, qui leur sont propres, gravées d'une manière nouvelle par Mr. REGNAULT de l'Academie de peinture etc. ib. fol. mai.

Essai sur les écrouelles par Mr. RENARD Doct. en médecine. ib. 12.

I. A. H. REIMARI *Ursache des Einschlagens vom Blitze nebst dessen natürlichen Abwendungen von unsern Gebäuden.* Langensalza, 8.

IOH. IAC. REINHARDS *Marggräfl. Baden-Durlach wirklichen geheimden Raths vermischte Schriften. Achtes Stück mit zwei Kupferplatten und Register über das ganze Werk.* Franckfurt und Leipz. 8. (Plurima oeconomiam concernunt.)

SAMUEL ABRAH. REINHOLD *diff. inaug. de aconito napello.* Argentorat. 4.

MELCH. REYE *diff. inaug. de dolore colico.* Gotting. 4.

Histoire naturelle de l'air et des météores par l'Abbé RICHARD Vol. 6. à Paris, 12.

CHRIST. RICKMANN *diff. med. de usu atque abusu medicamentorum terreorum absorbentium.* Auctore Henr. Carol. Reich. Ien. 4.

10. CHRIST. RIEDELS *verbessertes und vermehrtes Gartenlexicon, nebst einem nützlichen Garten-calender.* Nordhausen, 8.

DE LA RIVIERE V. DUMOULIN.

Parallèle de la condition et des facultés des hommes avec la condition et la faculté des autres animaux traduits de l'Anglois par Mr. ROBINET. Bouillon, 12.

Oekonomische Reliquien in Zehenden abgetheilt, als eine Fortsetzung der Abhandlung von gelehrten Landwirthen. Erstes Zehend, verfertiget von FRIEDRICH MORITZ VON ROHR Herzogl. Würtemberg Oelßnischen Regierungsr. Breslau, 8. mai.

Beschreibung einer glücklichen abgenommenen krebshaf-ten Brust von 12 medicinischen Pfunden, an einer 62. jährigen Frau im Lazarethe des Königl. großen Hospitals von IOH. IAC. ROSCIUS. Königsb. 4.

L'art du menuisier contenant 40 feuilles et 50 planches, faisant le quarante-troisième cahier de la description des arts et métiers par MM. de l'Academie royale des sciences. Par M. ROYBO fils. compagnon menuisier. à Paris, fol.

La toilette des pieds, ou traité de la guérison des cors, verrues et autres maladies de la peau: et dissertation abrégée sur le traitement et la guérison des cancers. Par le Sieur ROUSSELOT Chirurgien. ib. 12.

1. F. RÜBELS *gründliche Untersuchung und Beantwortung wie alle Arten von Friesel zu curiren sey?* Franckf. am Mayn, 8.

Examen chymique de différentes substances minérales. Essais sur le vin, les pierres, le bézoards et d'autres parties d'histoire naturelle et de chymie. Traduction d'une lettre de Mr. LEHMANN sur la mine de plomb rouge. Par Mr. SAGE. à Paris, 12.

ULRICH CHRISTOPH SALCHOW *chirurgische Betrachtungen zur Bestätigung der unnöthigen Amputation und des Nutzens der Bleymittel. Hamb. 8.*

GEORG SANDEMANN *diff. inaug. de rheo palmato. Edimburghi, 4.*

Thesaurus dissertationum, programmatum aliorumque opusculorum selectissimorum, ad omnem medicinae ambitum pertinentium, collegit, edidit et necessarios indices adiunxit EDUARDUS SANDIFORT. Vol. Ildum. Roterodam. c. tab. aen.

Eiusd. natuur en genees - kundige bibliotheek. Bevattende den zaakelyken inhoud der nieuwe werken, welke in de geneeskunde en natuurlyke historie buiten ons vaderland uitkomen. Vyfde Deel In's Gravahage. 8 mai.

IAC. CHRIST. SCHAEFFER *Abbildung und Beschreibung einer dreyfach nützlichen Sägemaschine, zum Holzschneiden in der Wirthschaft, zur Leibesbewegung für Gelehrte und Kränkliche, und zum Steinschneiden, für die Naturaliensammlungen. Regensb. 4. m. K.*

Eiusd. Entwurf einer allgemeinen Farbenverein, oder Versuch und Muster einer gemeinnützigen Bestimmung und Benennung der Farben. Nebst zwey ausgemahlten Kupfertafeln. ib. 4.

Eiusd. icones insectorum Ratisbonensium. ib. 4 mai. c. 200. tab. pict.

Eiusd. erstere Versuche mit Schnecken. ib. 4. m. K.

Eiusd. fernere Versuche mit Schnecken. ib. 4. m. K.

FRANC. XAVIER SCHEIGL *diff. inaug. de auxiliis efficacioribus ad vitam, in viso mortuo, restaurandam. Vienn. 8.*

Bericht von den heilsamen Wirkungen der Kinkina oder Peruvianischen Rinde, und von der Nichtigkeit der Vorurtheile, welche das Publicum gegen diese Rinde noch hat, mit einem Anhang von den innerlichen Gebrauche

Gebrauche des Schierlings, Bilsenkrautes und Münchskappen extractes von IOH. GEORG SCHENKBECHER. Riga und Mietau, 8 mai.

C. A. SCHLÜTERS gründlicher Unterricht von Hüttenwerken. Braunschweig, fol. m. K. (noua edit.)

IO. ANT. SCOPOLI Einleitung zur Kenntniss und Gebrauch der Fossilien für die Studierenden. Riga und Mietau, 8.

Eiusd. annus I. et II. historico naturalis descriptiones auium musei proprii earumque rariorum, sistens, quas vidit in vivario Augustissimi Imperatoris et in museo excellent. comitis **FRANC. ANNIB. TURRIANI.** Lips. 8.

IO. CHRIST. DAN. SCHREBERS Beschreibung der Gräser mit ihren Abbildungen nach der Natur. Leipz. fol. erster Theil.

PH. GEORG. SCHROEDER diss. inaug. de pleuritidum partitione, in primis quoad febrium, iis coniunctarum, differentias analecta. Resp. et Auct. *Frid. Chph. Ellert.* Gotting. 4.

Eiusd. diss. inaug. de haemorrhagiis febrilibus. Resp. *Wilh. Chph. Reichmann.* ib. 4.

Eiusd. diss. inaug. de febrilibus metastasibus. Resp. *Io. Andr. Lohr.* ib. 4.

FRID. IOS. GULIELM. SCHROEDER diss. inaug. de obstructione vasorum et morbis, ab ea dependentibus. Resp. *Ernest. Alexandr. Bock.* Marburg, 4.

Anthropotheologia, d. i. Anweisung, wie man aus der Betrachtung des Menschen, nämlich seines Leibes, dessen Glieder, und deren Verrichtungen, der Seele und ihren Kräften, Vermehrung und Unterhaltung des menschlichen Geschlechts, des Lebens, der Geburt, des Alters, Lebensziels, Krankheiten, Todes und Auferstehung von den Todten, die Allmacht, Weisheit, Gerechtigkeit, Güte und Vorsorge Gottes

tes erkennen könne, zur Verherrlichung des großen Gottes und Erbauung des Nächsten, vorgestellt von IO. HEINR. SCHVETTE M.D. Landphysicus des Herzogthums Cleve etc. Halle, 8.

IO. FRID. SCHÜTZENS gründliche Anweisung zur Hebammenkunst. Hildburgshausen, 8.

Des Herrn D. DAVID VON SCHVLZ Unterricht von der Einpfropfung der Pocken. Aus dem Schwedischen übersetzt von IO. ANDR. MURRAY. Göttingen und Gotha, 8.

IO. STEPHAN SCHWABE *Vorschläge zur Holzvermehrung und Anweisung zum Holzbaue mit vielen eigenen und fremden Anmerkungen. Schwerin, 8 mai.*

CHRIST. LUDOV. SCHWEICKHARD. diff. inaug. sistens obseruationem, de non necessaria funiculi vmbilicalis deligatione cum sua epicrifi. Argentor. 4.

Das gesunde Landleben von D. CHRIST. GOTH. SCHWENCKEN. Dresden, 8. (edit. 2.)

GEORG. FRID. SIEGWART diff. inaug. sistens historiam gemellorum coalitorum monstrosam, pulchritudine spectabilium. Resp. August. Ioh. David Siegwart. Tubing. 4. c. f.

Eiusd. diff. inaug. de vegetabilium vltiori indagine eiusdemque necessitate et vtilitate. Resp. Car. Chph. Hiller. ib. 4.

PETR. SIGORNE focii Sorbonici etc. praelectiones astronomiae Newtonianae ad vsum studiosae iuuentutis, ab ipso Auctore plurimum auctas et emendatas edidit FRID. AUG. BOECKIUS Philosoph. Prof. Tubingensis etc. Accessit epistola Auctoris ad editorem de luce et attractione. Tubing. 8.

• CAR. CASPAR. SINBOLD collectio obseruationum medico chirurgicarum. Fascicul. I. Bamberg. et Wurceburg. 4. c. f.

Des

Des Freyherrn VON SIND vollständiger Unterricht in den Wissenschaften eines Stallmeisters. Göttingen und Gotha, fol. m. K.

MARTIN SLABBER natuurlyke belustigingen behelzende microscopische Waarneemingen van in en uitlandsche water en land dieren. Te Haarlem, 4 mai. c. f.

IOS. VON SONNENFELS *Abhandlung von der Theurung in großen Städten und den Mitteln derselben abzuhelpen. Leipz. 8.*

Des Herrn Abt SPALLANZANI physicalische und mathematische Abhandlungen. Leipz. 8 mai. m. K.

IAC. REINB. SPIELMANN *diff. inaug. sistens examen acidi pinguis. Resp. Michael. Frideric. Boehm. Argent. 4.*

Eiusd. olerum Argentoratensium fasciculus I. Resp. Io. Iac. Spielmann. ib. 4.

P. N. SPRENGELS *Fortsetzung der Handwerker und Künste in Tabellen. Vierte Ausgabe, welche die Bearbeitung der Edelgesteine, des Bleyes, Zinns, Kupfers und Messings enthält. Berlin, 8. m. K.*

IO. CHRIST. EHRLICH SPRINGERS *physicalisch practische dogmatische Abhandlung von den deutschen Weinbaue mit einer vorangeschickten Betrachtung über den Nutzen des Weinbaues und die Nothwendigkeit des Buxus. Lemgo, 8.*

Physiological essays and observations. By IOHN STEDMANN. M. D. Edinburgh, 8. c. f.

ANTON STOERK *libellus, quo demonstratur, herbam, veteribus dictam flammulam Iouis, posse tuto et magna cum vtilitate exhiberi aegrotantibus. Vienn. 8. c. f.*

Eiusd. zwei Abhandlungen vom Nutzen und Gebrauche des Brennkrautes oder der aufrechten brennenden Waldrebe und des weißen Diptams oder Escherwurz. Aus dem Lateinischen übersetzt. Frankf. und Leipz. 8. m. K.

L. I. D. SVCKOWS *der Naturlehre öffentlichen Lehrers zu Iena Entwurf einer physischen Scheidekunst. ib. 8.*

GEH. VAN SWIETEN *Erläuterung der Boerhaavischen Lehrsätze von Erkenntnis und Heilung der Krankheiten. Aus dem Lateinischen übersetzt, dritten Theiles erster und zweyter Band. Wien, 4.*

Beyträge zur Naturkunde des Herzogthums Lüneburg, gesamlet von IOH. TAUBE. Zweytes Stück, Zelle, 8.

Treatise on the ananas or pine-apple. By A. TAYLOR. Lond. 8. c. fig.

The natural history of four-footed beasts. By T. TELLTRUTH. Embellished with curious cuts. ib. 16. (Nomen Auctoris fictum.)

MAR. GERH. THILENII *kurzer Unterricht für die Hebammen und Wöchnerinnen auf dem Lande. Cassel, 8.*

The medical miscellanies or a collection of cases tracts and commentaries, exhibiting a view of the present state of medicine and chirurgical practice and litterature in England. By T. THOMBINSON. Lond. 8.

Avis au peuple sur sa santé par Mr. S. A. TISSOT, Quatrième édition originale. à Paris, 12. Vol. I.

Eiusd. Aviso al popolo intorno alla sanità, tradotta dal Francese, arricchita et illustrata di prefazione, note ed alcune dissertazioni dal D. GANDINI Genova e Dresda, 8. Tom. I. II. III.

Eiusd. von der Gesundheit der Gelehrten. Aus dem Französischen. Neue Auflage. Leipz. 8.

Eiusd. Anleitung für Gelehrte und Personen von einer sitzenden Lebensart in Absicht auf ihre Gesundheit, nebst GOTTLIEB SUCHERS Anleitung zur Gesundheit des Geistes oder Naturgeschichte des Weisen. Hamburg, 8.

S. A. TISSOTS on diseases incident to literary and sedentary persons. The second edition with a preface and notes. By I. KIRKLAND. Lond. 8.

Eiusd. de la santé des gens de lettres. à Berne, 8.

Eiusd. von der Onanie oder Abhandlung über die Krankheiten, die von der Selbstbefleckung herrühren. Nach der dritten, beträchtlich vermehrten, Ausgabe aus dem Französischen übersetzt. Eisenach, 8.

Eiusd. opuscula medica: diss. de febribus biliosis siue historia epidemiae biliosae Laufannensis anni 1755, accedit tentamen de morbis ex manu-
stratione. Collegit et edidit C. G. BALDINGER Cellae, 8.

I. DAN. TITII diss. artis instituendi observationes meteorologicas primae lineae. Resp. *Frid. Wilh. Heun.* Witeberg. 4.

Histoire générale de l'Amérique depuis sa découverte; qui comprend l'histoire naturelle, ecclésiastique, militaire, morale et civile, des contrées de cette grande partie du monde par le P. TOURON. à Paris, 12. Voll. 8.

Mémoires et observations de chirurgie. Par Mr. TRECOURT. à Bouillon et à Paris, 8.

CHRIST. IAC. TREW aneurysmatis spurii, post venae basilicae sectionem orti, historia et curatio. Norimb. 4.

DAN. WILHELM. TRILLER diss. inaug. de horrore in febribus exanthematicis, praesertim variolis, signo plerumque letali. Resp. *Christ. Gotth. Schatter.* Viteberg. 4.

Eloge de Mr. LE CAT par Mr. VALENTIN du collège royal de chirurgie de Paris. à Paris, 8 mai.

RUDOLPH. AUGUST. VOGEL *diff. inaug. de curatione cancri occulti et aperti, per aquam calcis vivae potam praestita. Resp. Gottfr. Michael. Hermann Baumbach. Goetting. 4.*

Eiusd. diff. inaug. de simulatis morbis et quomodo eos dignoscere liceat. Resp. Io. Iac. Iansen. ib. 4.

Eiusd. neue medicinische Bibliothek. Des 7ten Bandes stes und folgende, des 8ten Bandes 1stes Stück. ib. 8.

Les singularités de la nature par Mr. DE VOLTAI-
RE. à Geneve, 8.

I. Description d'une belle grive d'Amérique. II. Dé-
scription du coq des roches américain par Mr.
VOSMAER. à Amsterd. 4.

IO. AVG. VNZERS *Arzt, eine medicinische Wo-
chenschrift 12 Theile in 6 Bänden. Vermehrte und
verbesserte Ausgabe. Hamb. und Lüneb. 8 mai.*

Eiusd. medicinisches Handbuch I. Theil. Hamb. 8 mai.

*Eiusd. Sammlung kleiner physikalischer Schriften, zwey
Theile. Hamb. und Lüneburg, 8.*

*Eiusd. Briefe von den Veränderungen des Erdbodens
und der Entstehungsart des Erdbebens. ib. 8.*

*Die Naturgeschichte der Versteinerungen zur Erläute-
rung der Knorrischen Sammlung von Merkwürdig-
keiten der Natur. Herausgegeben von I. F. I.
WALCH. Des zweyten Theils zweyter Abschnitt.
Nürnb. 8.*

*Eiusd. Steinreich systematisch entworfen. Neue sehr
vermehrte Auflage. Halle, 8 mai.*

IO. IVL. WALLBAVMS *Verzeichnis einer vollstän-
digen Apotheke. 2ter Theil, Leipz. fol.*

*Eiusd. Beschwierlichkeiten der Geburtshülfe aus Bey-
spielen erwiesen. Büxow und Wismar, 8.*

IO. GOTSCHALK WALLERII *Anfangsgründe
der Metallurgie besonders der chymischen. Aus dem
Lateinischen übersetzt. Leipzig, 8 mai. m. K.*

The

The natural history and antiquities of Northumberland: and of so much of the county of Durham as lies between the rivers tyne and tweed; commonly called, north bishoprick. In two volumes. By JOHN WALLIS A. M. Lond. 4. Vol. I. II.

Zimmerkunst, oder Anweisung, wie allerley Arten von Deutschen und Welschen Thurmmauben, auch Kugelhelme, nach der neuesten Manier zu Bedeckung der Kirchthürme nicht nur zu entwerfen, sondern auch mit Holz zu verbinden; samt einer wohlfundirten Gewißheit, wie die geschwungene Gradbiegen nach ihrer äußerlichen Gestalt zu verfertigen sind. Ferner, wie eine Glocke auf eine geometrische Art anzugeben und zu verzeichnen ist. Auch wie runde und ovalförmige Zulagen mit ihrem Bund- und Dachgesperre, auch Kuppeln mit hölzernen Gewölbern auf Capellen und Kirchen anzuordnen sind. Samt dem Entwurfe eines Kreuzdaches mit Walben und Chorhauben etc. auch Profilirung derselben nach ihrer Länge und Breite. Denn leztlich, wie gemeine Haupt- und Wendeltreppen, auch Schneckenstiegen mit oder ohne Ruheplätze, nebst ihren verschiedenen Theilen nach den besten Regeln der Zimmerkunst anzulegen sind. Zum Unterricht iunger und unerfahrer Zimmerleute, in zween Theilen abgehandelt von CASPAR WALTHER Stadtbrunnen- und Zimmer- auch Baugeschwornen Wasserwerkmeister in der Reichsstadt Augsburg. Augsburg, fol.

Herrn WATSONS und GLASS Versuche von der neuesten und besten Art die Kinderblattern glücklich einzupfropfen. Aus dem Englischen von C. H. SCHÜTTEN. Halle, 8.

Remarks ou Dr. WARNERS account of the gout wherein his defects in the cure are pointed out and supplied Lond. 8. (Auctor est I. CORDWEL.)

Tom. XVII. Pars IV.

B b b

Schreiben

Schreiben des Herrn Hofmedicus CHRISTOPH WEBER zu Walsrode an einen seiner Freunde von der Lage, der Geschichte, dem Gehalte, dem Gebrauche, denen Wirkungen des Rezburger Gesundbrunnens und des Bades. Hannover, 8.

Flora Pomerano-Rugica exhibens plantas, per Pomeraniam anteriorem, Sueciam et Rugiam sponte nascentes, methodo Linnaeana secundum systema sexuale digestas, cum differentiis specificis, nominibus Germanicis, officinalibus pharmacopoeorum; locis natalibus, tempore florendi, obscuriorum descriptionibus. Auctore CHRIST. EHRENF. WEIGEL. Berolin. Stralsund. et Lips. 8.

FRIEDR. WEINLANDS Vorthelle welche der Staat durch die Einführung des Blatterbeltzen erlanget. Zelle, 8,

I. G. WEINMANN tractatus botanico criticus de chara caesaris. Carolsruhae, 8.

FRID. GUILIELM. WEIS spec. inaug. plantae cryptogamicae florum Gottingensis. Gotting. 4.

FRID. AUGUST WEITZ vollständige Auszüge aus den besten chirurgischen Disputen aller Akademien, nebst einigen Anzeigen der neuen chirurgischen Bücher, und einem Anhang chirurgischer Neuigkeiten. Erster Band. Budissin, 8.

Abhandlung von der Wartung der Bienen, worinnen die natürliche Geschichte dieser Insecten nebst den verschiedenen Arten sie zu warten, sowohl in den alten, als in den neuern Zeiten und der neuerlich hierbey gemachten Verbesserungen enthalten ist. Diesem ist noch die natürliche Geschichte von den Wespen und Hornissen nebst den Mitteln sie zu vertilgen, beygefüget, durch THOMAS WILDMANN. Aus dem Englischen übersetzt. Copenhagen, 8. m. K.

CHRIST. FRID. WILKENS Nachricht von seltenen Versteinerungen, vornehmlich des Thierreichs, welche bisher

bisher noch nicht genau beschrieben und erkläret worden. Berlin und Stralsund, 8. m. K.

IO. HENR. WINKLERI progr. quo exponit tentamina, quaestiones et coniecturas circa electricitatem animantium. Lips. 4.

I. A. WOHLFAHRTS *Biographien griechischer Aerzte, zusammen getragen aus der Geschichte der Medicin des* LE CLERK. Halle 8 min.

CHRIST. L. B. DE WOLF elementa matheseos. Editio noua et correctior. Hal. Magd 4. c. f.

I. B. I. ZAUSCHNERI diff. de elementis et viribus mediis trium aquarum mineralium Teplensium. Pragae, 8.

Eiusd. diff. de sale, a mineralogis haud descripto, opera eius inuento. ib. 8.

ANT. ZEPLICHAL geometria curuarum, ad physicam applicata. Vratislav. 8 mai. c. tab. aen.

IO. HENRIC. ZIEGLER spec. inaug. de digestore PAPINI eiusque structura, effectu et vsu. Basil. 4.

IO. FRID. ZÜCKERT materia alimentorum, in genera, classes et species disposita. Berolin. 8.

Contenta in hac parte.

I.	Commentarii Bononienses. Tom. Vtus P. I. II.	pag. 579
II.	Dissertations sur les antiseptiques par l'académie de Dijon	594
III.	Essais sur différens points de physiologie de pathologie et de thérapevtique par Mr. FABRE	627
IV.	Abregé de l'anatomie du corps humain par Mr. VERDIER Tom. I. II.	636
V.	Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche maatschappye der Weetenschappen te Harlem X Deels I en II. Stuck	640
VI.	Observations on the nature and consequences of those iniuries to which the head etc. By POTT	654
VII.	Observations upon Mr. POTT'S general remarks on fractures etc. By KIRKLAND	666
VIII.	BOEHMERI diss. inaug. de vsu salutari extracti aconiti in arthritide, obseruationibus comprobato	669
IX.	REINHOLD diss. inaug. de aconito napello	673
X.	Traité de l'hydropisie et de la jaunisse par Mr. MARQUET	678
XI.	Noui commentarii academiae Petropolitanae Tom XI et XII. pro annis 1765. 1766 et 1767.	694
XII.	WEIS de plantis cryptogamicis florae Gottingensis	708
XIII.	Noua physico medica	714
XIV.	Continuatio indicis scriptorum physico medicorum, quae anno 1769 prodierunt	722



I N D E X.

A.

- A**bdominalium viscerum
 aberratio. 463 seq. in
 thoracem prolapsus. 124 sq.
 vulnere sanatio. 325. cu-
 ratio singularis. 327
 Abdominis tumor insignis
 ex struma ovarii 52 seq.
 Abscessus sine incisione sana-
 tus. 322. cerebri 126.
 310 sq. 326. vesicularum
 feminalium 88 sq.
 Acari, insecto maiori, ope fili,
 adhaerentes, seque nutri-
 entes 65
 Aceti radicalis congelatio 6
 Achates Islandicus, lapis.
 701. eius ortus. ib. de eo
 experimenta chemica ib.
 Aconiti foliorum succi et ex-
 tracti examen chemicum.
 673 seq. vires et effectus.
 671. 675 seq. circa eius
 usum monita. 672 sq. 677.
 usus et effectus in variis
 morbis. 302. salutaris in
 arthritide. 428. 670. 675
 sq. 677. in hysterico malo
 aliisque morbis. 676 seqq.
 in spina ventosa. 302 seq.
 foliorum et radicum recen-
 tium vis venenata 677 sq.
 Acus deglutita ope brassicae,
 et emetico reiecta 314
 Acuti morbi vid. *Febres acu-
 tae*.
 Adamas, eius disquisitio che-
 mica 60
 Adolph, Io. Traugott, obiit.
 164
 Aduersaria medico practica.
 Vol. I. 488
 Aegagropilae descriptio 264
 Aer, vt fluidum sonos trans-
 mittens. 340. humidus
 causa fluoris albi. 34 seq.
 eius in nauibus renouatio-
 nis vsus et ratio 106 sq.
 Aeruginis crystalli, de earum
 destillatione experimenta.
 6
 Aetherem salis marini prae-
 parandi modus. 3 seq.
 Agarici virtus styptica 325
 Albinus, Bern. Siegf. acade-
 micarum annotationum li-
 ber VIII. 417. memoria
 s. vitae descriptio. 543 sq.
 scripta 551 seqq.
 Albinus, Fred. Bern. societ.
 scient. Harlemon. socius.
 535. Prof. ord. in acad.
 Lugd. Batava in locum
 fratris B. S. Albinus 719
 Alcae, auium genus et spe-
 cies 418 sq.
 Alkali plantarum marinarum,
 sodae simile, praeparandi
 modus. 18. fixum tartari
 crystallifandi ratio. 263.
 eius crystallos conseruandi
 methodus. 277. fixi, cum
 calce viua commisti, vis
 calculum dissoluens. 202
 Algae, plantarum cryptoga-
 micarum classis. 709. ea-
 rum structura et vsus ib.
 species nouae et emenda-
 tae ib. sq.
 Alimentorum hominibus con-
 venientium disquisitioni
 praemium expositum 715
 Bbb 3 Alströ

- 341 sq. organi structura anatomica 338 sq. organon physetere macrocephalo inn. 460
 res, earum historia naturalis 45. icones et picturae 295 sq. renes et venteres 593. systema lymphaticum et vasa lactea 396 seq. illud demonstrandi methodus 397. indiciae rariores 697 sq.
 Aurantiorum foliorum vsus in epilepsia 428
 Auricularum vsus ad auditum 341
 Auran, ab acad. reg. chir. Parisina praemium accepit 347
 Austriacarum stirpium P. I. II. 444
 B.
 Balarucensium aquarum calculos soluendi virtus 295 f.
 Balneorum vsus et abusus in variolis 505
 Balsamicorum actio et vsus antisepticus 617
 Barometrorum electricitas 699
 Batauae societatis physico experimentalis fundatio et institutum 345 seq. 718. thes. et praem. ad ann. 1771. 1772 et 1773. 346
 Baumé, mémoire sur les argilles 436
 Baumer, Io. Paul. obiit 539
 Belemnitarum natura et diversitas 262
 Belladonnae vsus et effectus in epilepsia habituali 512 seq. in cancro dubius 44
 Berolinensis Directorii reg. generalis reddituum summi thes. et praemia ad ann. 1772. 716 sq.
 de Bertrand Pibrac, Egidius, obiit 539
 Bidens acmelloides, planta 70
 Billard, ab acad. reg. chirurg. Parisina praemium accepit 347
 de la Billarderie d'Angiviller, Comes, in horto et museo regio Buffoni successor 163
 Blanchard, ab acad. reg. chirurg. Parisina praemium accepit 347
 Boddaert, Petr. acad. imp. nat. curios. socius 536
 Boeckmann, Ionas, mortuus 164
 Boehmer, Phil. Adolph. diff. de vsu salutari extracti aconiti in arthritide 669
 Bolten, Ioach. Fred. in theatro anatom. Hamburgensi Prof. 720
 Bombycis fabrica et sericeus humor 581. canalis alimentorum 582
 Bonn, Andr. anat. et chir. Prof. Amstelædam. 197
 Bononiensis scient. et artium instituti atque acad. commentarii Tom. V. P. I. et II. 579
 Borax, in ea arsenicum, sallem marinum et cuprum latere, experimentis probatur 6 sq. eius terra vitrescibilis 8
 van den Bosch, Imman. Iac. historia constitutionis epidemicae verminosae 212. acad. imp. nat. curios. socius 536
 Bossut, Abbas, ab acad. scient. Tolosana

- Tolosana praemium reportavit 714
- Botanicae observationes 446
seqq.
- Brachium luxatum reponendi modus 632
- Branchialia officula in piscibus 406
- Breuerus, inuentor instrumenti noui, suctioni vulnerrum pectoris inseruiantis 508
- Bronchialis polypi observatio 208. genesis ib. seqq.
- Brunnichii, Mart. Thr. ichthyologia Massiliensis 47
- Bruxellis societas scient. fundata est 345. eius thes. et praem. de anno 1770. ib.
- Buffonus, erga eum insignis regis Galliae benignitas 163. eius praedia comitatus priuilegiis donata ib. eius successor ib. historiae naturalis editio auctior indicatur 540 seqq.
- Burdigalensis acad. reg. scient. thes. et praem. ad ann. 1771. 1772 et 1774. 714
seqq.
- Burmamnus, Petr. acad. imp. nat. curios. socius 536
- Buttners, Chph. Gottlieb, anatomische Wahrnehmungen 526
- C.
- Caesarea sectio, in femina parua instituta 67 seq. in femina, lue venerea infecta 70
- Calculi, eorum in hominibus et animalibus formarum natura et fabrica 259 sq. de eorum dissolutione experimenta 585.
- in arteriis vteri, vesicae et haemorrhoidalibus externis reperti 527. in vteribus reperti 590. sponte ex vesicae rupta cicatrice prodeuntés 139
- Calomel, medicamentum mercuriale, eius praeparatio 75. pilularum vsus et effectus salutaris in variis morbis ib. seqq.
- Caloris gradus, quem homines et animalia ferre possunt 256 sq. aestiui anni 1768. Romae gradus 398. communicationis exceptionis phaenomena et explanationes 699. variorum fluidorum decrementum, sub euaporatione experimentis probatum 22
- Caluae fractura vid. *Cranium*.
- Camperi, Petr. epistola ad anatomicorum principem magnum Albinum 415. poliater Groningensis 538
- Camphora, num stranguriae medeatur? 211. eius vsus in delirio puerperarum 428
- Cancer, morbus, de eo observationes 199 sq. contra eum remedia 44. mammarum, eius curatio 90 seqq.
- Cancrofi vlceris in labio inferiori exstirpatio 323
- Canis triorchis 143. rabidi morsus duabus personis letalis 461 sq.
- Capitis insignis magnitudo 394. dolor a tumore cerebri folliculato 53 seq. tumor cysticus insignis 529. vulnerum fallacia, exemplis probata
- Bbb 5

- probata 125 sq. vulnus
 cum fractura sanatum 309.
 312. 313. 315. 326. in-
 tegumentorum vulnera, de
 iis monita practica 655.
 contusionum in dura ma-
 tre et interioribus cranii
 partibus effectus, signa et
 curatio 655 sq.
 Carbonum vaporum effectus
 noxii 324 seq.
 Cardamines florum vsus anti-
 spasmoticus 210
 Caries ossium, eius ortus et
 distinctio 86 sq. a causa
 externa 323
 Carotidis aneurysma 272 sq.
 externae laesio sanata 325
 Cassini ab Thury, Director
 observatorii regii Parisini
 720
 Castorei usus externus et in-
 ternus 73
 Castoris historia naturalis 72
 le Cat, Traité des sensations
 et des passions en général
 et des sens en particulier,
 T. I. II. III. 328
 Cataractae lacteae causa et
 operatio 648 seq.
 Cattaneo, Iac. della idropisia
 de' Gelfi 518
 Causticorum actio et vsus an-
 tisepticus 618. vsus in epi-
 lepsia 310
 Cauterii vsus et applicatio in
 epilepsia 158 sq.
 Celsii, Olai, hierobotanicon
 editum iri indicatur 540
 Cephus lacteolus, avis 419
 Cerebri abscessus 310. 326.
 commotionis effectus, et ab
 extraneatione distinctio
 659 seq. curatio 660.
 consensus cum corde et
 pulmonibus 628. defe-
 ctus in fetu viuo 313. 528.
 tumor folliculatus 53 seqq.
 ventriculorum hydrops v.
Hydrocephalus.
 Chamban, ab acad. reg. chir.
 Parisina praemium accepit
 347
 Chamaeleontis historia natu-
 ralis et coloris mutatio vn-
 de? 137. noua species
 394, in capite bonae spei
 observati descr. 466 f.
 Champeaux, experiences et
 observations sur la cause
 de la mort des noyes 109
 Chinae cortex vid. *Peruvia-*
nus.
 Chirurgi requisita 430
 Chirurgicae observationes
 429 seqq. fellae descriptio
 150
 Choroidea oculi tunica, de ea
 observationes 10 sq. 336.
 eius officium et vsus 336
 seqq.
 Chronicorum morborum
 causa, differentia et cura
 634
 Chrysolithi Brasiliensis pro-
 prietas electrica 700
 Chrysops, insectum, eius de-
 script. et larvae ortus 646
 Cicatricis vulnerum et vlce-
 rum formatio et phaeno-
 mena 631 seq.
 Cicutae character et praepa-
 rata pharmaceutica 300.
 304. vsus et effectus in
 variis morbis 300 sq. 428
 seq. in herpete 324. in
 cancro et scirrhus dubius 44.
 200. cum cortice Peruvia-
 no commistae vsus in can-
 cro 200. cataplasmatibus vsus
 in

- in vlceribus mammarum 309. pilularum vsus in priapismo 89. de varia eius efficacia monita 304
- Cinnamomi tincturae vsus in haemorrhagia vteri parturientium** 289
- Clagenfurthensis Caesar. reg. agriculturae et scient. societ. thes. et praem. ad ann. 1771.** 162
- Clossius, Io. Frid. societatis scient. Harlemonf. socius** 536
- Clyster ex fumo tabaci, ad eum machina** 139
- Cochlearum vulgarium operculorum formatio** 264 sq.
- Coecitatis nocturnae casus** 198
- Colchici autumnalis vsus et effectus in variis morbis** 303 sq.
- Coli duplex laesio sanata** 325. expansio singularis, vt morbi et mortis causa 503 sq. per vulnus diaphragmatis incarcerationio letalis 435
- Colicae spasmodicae curatio** 428. endemiae Damnoniensis causae 203 sq. 210. pictonum historia 206. causae variae 207
- Colli vulnus singulare** 310
- Comedones infantum quid?** 154
- Conchyliorum museum** 230. dispositio systematica 233 seqq.
- Condour, auis** 46
- Conseruae filamentorum vsus oeconomicus** 644. semina obseruata ib.
- Contrafissurae cranii casus** 310 seq.
- Connulsiones parturientium et puerperarum** 289. ab exulceratione vteri 56
- Cor absque pericardio extra pectus propendens** 528. eius auricula rupta mortis subitae causa 493. inflammatio 54. nimia dilatatio vt causa palpitationis eius ib. seq. eius in piscibus situs et fabrica 407. actio in arterias et venas microscopio in salamandra obseruata 248 sq.
- Corporis animalis euolutiones sanae et morbosae** 502
- Costarum verarum exfoliatio** 693. costae bouinae particula, vltra 22 menses in pulmone haerens, tussi eiecta 135
- Cothenius, Christ. Andr. academiae imp. nat. curios. 1000. imperial. donauit** 537
- Cranii ossium fracturae cum vulnere sanatio** 309. 312. 313. 315. 326. contrafissura cum abscessu cerebri trepanatione sanata 310 sq. destructionis a causa venerea curatio 656. a contusione ortae curatio 657. fracturarum fissurarumque differentia, species et signa 657. curatio 658. periculosa laesio in curationem alius morbi salutaris 138. vstionem in epilepsia instituendi modus et vsus 158f.
- Crantz, Henr. Ioach. Nepom. stirpium Austriacarum Pars I. et II. 444. classis umbelliferarum emendata** 454 seq.



- seq. classis cruciformium
 emendata 456
 Crell, Laur. Frid. med. Prof.
 Brunsvicens. 538
 Cremor tartari, num in eo al-
 cali fixum existat? 265 sq.
 Crinones infantum, quid? 154
 Croton spicatum, noua plan-
 tae species 391
 Cruris fractura complicata
 cum gangraena 313
 Cruciformes plantae vid.
Plantae.
 Cupri affinitas cum sulphure
 284. virtus magnetica vn-
 de? 702. sulphur vid.
Sulphur.
 Cutis in extremitatibus defe-
 ctus in tribus infantibus
 vnius matris 327 seq.
 D.
 Datte, conchylium Gallo-
 prouinciae 23
 Dauci radicum vis anthelmin-
 tica 221
 Delius, Henr. Frid. diff. de
 vstione cranii in epilepsia
 158
 Dentis proruptio in muliere
 92. annorum 313
 Diaphragmatis vulneris le-
 talis casus singularis 435
 Diascordii vsus in dysenteria
 nautarum 103
 Dictamni albi radicis eius-
 que praeparatorum vsus
 et effectus in variis morbis
 307 seq.
 Diomedae albatris auis descr.
 419
 Dissertations sur les antise-
 ptiques, qui ont concouru
 pour le prix proposé par
 l'academie des sciences de
 Dijon 594
 Diuionensis acad. scient. et
 artium thes. et praem. ad
 ann. 1775. 348 sq.
 van Doeveren, Gualt. in acad.
 Lugd. Batava med. prof.
 ord. 163. 719.
 Dolores, ad spinam dorsi orti,
 symptomati et idiopathi-
 ci 515 seq. eorum curatio
 517
 Dormientes minus calere, ex-
 perimentis probatur 65 sq.
 Ductus thoracicus in anse
 396
 Dysenteriae Nordlingae ann.
 1766 epidemica 424. scor-
 buto accedens, eius cura-
 tio 102. nautarum 103
 E.
 Echinorum marinorum in-
 cessus 584
 Eilenburg, Christ. Henr. obiit
 352
 Electrica proprietas chrysol-
 ithi s. smaragdi Brasiliensis
 700. tourmalini 58. 63
 Electricitas, eius vsus in va-
 riis morbis 62. cum toni-
 tru effectibus comparatio
 260. barometrorum 699
 Elephantiasis, de ea obserua-
 tiones 196 seq. 239 seqq.
 eius symptomata 239. cu-
 ratio 240
 Elephantum ossa, in America
 reperta 388
 Emphysematis ope incisionis
 curatio 317. artificialis
 operatio et vsus 137 sq.
 Emplastrorum abusus disqui-
 sitioni praemium constitu-
 tum 161. 347
 Empyematis sanatio 650. 693
 Entero epiplocele, de ea ob-
 seruata practica 146 seq.
 incarcerata

- incarcerata ab omento pendens 148
- Epidemici morbi**, eorum differentia, eosque observandi ratio 496. vernaes de iis eorumque curatione observationes 509 seqq. morbi ann. 1757 et 1758 Lipsiae grassantis descr. 489 symptomata et curatio 490 seq. epidemicae constitutionis verminosae historia 212. constitutionis cum parotidum tumore a. 1753 Bononiae observatae historia 583
- Epilepsia causticis curata** 310. dictamno albo curata 307 seq. ei ope visionis cranii medendi methodus 158 sq. eius curatio tentata ope extracti hyoscyami 491. stramonii 497. sulphuris veneri 508. belladonnae 512
- Epiplocele**, eius casus singularis 261. simplex, eius distinctio et cura palliativa 146. complicata, de ea observata practica 147 seq. duplex 148
- Equisetum**, peculiare plantarum genus 713
- Equorum morbus**, scrophulae farcimen dictus 74
- Erucarum respiratio**, de ea experimenta 15 sq.
- Erxleben**, Io. Christ. Polycarp. prof. philos. extraord. Gotting. 164. societ. physico experimental. Baravae socius 538. scholae veterinariae Gottingens. praest 542
- Eulero**, Leonard. visus amissus restitutus 540
- Evolutiones corporis humani** quid? 502. earum differentia et ratio ib. sq.
- Exanthematum verminosorum causa et curatio** 218 F.
- Faba**, vrethrae immissa, ischuriae causa 322
- Fabre**, essai sur differens points de physiologie, de pathologie et de therapeutique 627
- Faissolle**, experiences et observations sur la cause de la mort des noyes 109
- Fasciarum usus in fracturis ossium** 661. 668
- Febres acutae**, iis medendi methodus Hippocratica 632 sq. febris continua putrida Lipsiae 1757 et 1758 epidemica, eius symptomata et curatio 489 sq. maligna miro modo curata 394. miliaris, ei medendi methodi 157. putrida, eius gradus et curatio 608. putrida maligna nautarum 104 sq. eius causae et curatio 105. putrida petechialis cum molae excretionem 50 sq. febrium intermittentium causa et curatio 103. continuarum putridarum cum vermibus symptomata et curatio 213 sq. intermittentium verminoso biliosarum et catarrhalium symptomata 215 curatio 216. lentarum verminosarum symptomata 216 seq.
- Felis** in ea superfetatio 315
- Femoris luxationum repositionis modus** 632. luxatio

- tio ex caussis internis 128
sq. huius exempla ib.
- Ferularum vsus et ratio in
fracturis ossium 661. 668
- Fetus in vtero situs 64. situs
capitis sub partu mutatus
413. sub partu mortui si-
gnum 414. duplex connatus
254. humanus monstrosus
26. viuus sine cerebro
318. 528. singularis de-
formitas viscerum 124 sq.
463 sq. tubarius 530
- Ficus culturae optimae decla-
rationi praemium consti-
tutum 330
- Fibrae animalis ortus diffe-
rentia et actio 348
- Filices plantarum cryptoga-
micarum classes 711. ea-
rum differentia et fructifi-
catio 711 sq. vsus et vires
712. meliori disquisitioni
praemium expositum 536.
- Fimi species et effectus 443
- de Fischer, Io. Bernh. de fe-
bre miliari, purpura alba
dicta 154
- Flammulae iouis praeparata
305. eorum dosis ib. vsus
et effectus in variis mor-
bis 306 sq.
- Fluida varia, de eorum
frigore, quod sub euapo-
ratione producant, experi-
menta 21 sq. experimen-
ta, in vacuo instituta 22.
eorum motus a diuerso ca-
loris gradu 694. corporis
animalis, eorum differen-
tia et actio 330 sq. fluidi
neruei natura, actio et or-
tus 330 sq.
- Fluoris albi definitio et theo-
ria 28 sq. fontes et ortus
29. diuersi colores et qua-
litates 30. species diuer-
sae et characteres ib. seqq.
signa 31. symptomata 32.
haereditarii descr. 32. cum
aliis morbis complicati se-
quelae 32 sq. ab aliis mor-
bis, eum mentientibus, dif-
ferentia 33. caussae remo-
tae 34 sq. propiores 37 sq.
curatio caussalis 38 sq.
- Fodinae, iis inseruiens noua
machina 5. metallica in
prouincia Namen, eorum
disquisitioni praemium ex-
positum 345
- Foetus vid. *Ferus*.
- de Foigny, Gandoger vid.
Gandoger.
- Fontana, Felice, nuoue offer-
vazioni sopra. i globetti
rossi del sangue 242
- Fontium medicatorum Ger-
maniae tabula systematica
80 seq.
- Forlani, Casp. M. rariores
observationes medico pra-
ctico anatomicae 50
- Formica fusca Linn. eius cu-
ra in oua 77 sq. tempesta-
tis praenuncia 78
- Fossilia agri Parisienses 262
- Fracturas ossium simplices
tractandi modus, de eo
monita et regulae 660 sq.
complicatas tractandi mo-
dus et ratio 663. 667
- Fraxini cultura et utilitas 643
- Fried, Georg. Albrecht, *An-
fangsgründe der Geburts-
hülfe* 410
- Frigoris gradus de ann. 1740
et 1768. 389. 392. liquo-
rum variorum sub euapo-
ratione augmentum, expe-
rimentis

- rimentis probatum 21 sq.
circa idem experimenta,
in vacuo instituta 22. arti-
ficialis gradus ad congela-
tionem mercurii 695
Fucus foliaceus frondibus fru-
tificantibus papillatis 697
Fuldae hortus botanicus in-
structus 351
Fulguris effectus varii in cor-
pus humanum 430 seqq.
eorum curatio 431 sq.
Fulmina, ab eorum periculo
se defendendi ratio 261
Funes maiores nauticos con-
servandi modus 63
Fungi non sunt plantae verae
708 seqq. laricis et fa-
gi, eorum vsus stypticus
580
G.
Gandoger de Foigny, Traité
pratique de l'inoculation
467
Gangliorum in nervis vsus
332 seqq.
Gedanensis naturae indaga-
torum societ. thes. et prae-
mia ad ann. 1771 et 1772.
537.
Gemellae coalitae 528
Gemmarum disquisitio che-
mica 60
Generationis theoria, experi-
mentis in ovīs incubatis
factis, probata 703 sq.
Genitalium partium in pisci-
bus anatome 406
Geriniani operis ornithologi-
ci Tom. I. 293
Germaniae fontium medica-
torum et thermarum tabu-
la systematica 80 sq.
Gesner, Io. Aug. Phil. Samm-
lung von Beobachtungen
aus der Arzneygelahrheit
423
Giseke, P. D. physic. poel. et
histor. naturalis prof. Ham-
burg 718
Glaciei coniunctio cum flui-
dis variis, de ea experi-
menta 22 sq. mariae Ru-
thenicae patria et origo
706 sq.
Glandularum vsus in fluidum
nervium 333. morbus sin-
gularis 426. in plantis in-
sufficiencia pro definien-
dis generibus 456
Globulorum plumbeorum ex
tormento explosorum, in
aerem impingendo effe-
ctuum theoria 432 sq. cu-
ratio 433
Glutinosi spontanei et adsci-
titi differentia 511
Gonorrhoeae feminarum spe-
cies 33. distinctio a fluore
albo 34
Gordius Medinensis, in Suecia
reptus 65
Gothae consilium captum,
mersis, subito ac violenter
mortuis auxilium praestan-
di 352
Gottingae schola veterinaria
constituta 542. academiae
observatorium a Rege An-
glorum horologio Shelto-
niano donatum 164
Gouan, Antoine, Histoire des
poissons 400
Goyenot, ab acad. reg. chir.
Parisiensi praemium accepit
347
s' Graeuwen, Paul. med. pra-
xeos et chem. prof. ord.
Groningens. 537 sq.
Grauidarum

Grauidarum mucoso vermino-
sa febris 219

Grauiditas, eius signum ex
orificio vteri 287. per 18
menses prolongata 315.
cum anasarca, erysipelate
aliisque morbis complicata
311

Guaperua piscis 75

Gypsi analysis chemica 18
H.

Haemoptysis, quatenus venae-
sectione sananda 493 seq.
a vermibus 217

Haemorrhagia periodica pol-
licis pedis 312. vteri aqua
frigida curata 313 seq. a
vermibus 215. parturien-
tium, in ea remedium 289

Hafniae schola veterinaria
condita 353

Hamburgi theatrum anatomi-
cum institutum 720

Hannes, Christ. Rudolph.
acad. imp. nat. curios. so-
cius 162

Harlemensis societ. scient. so-
cii 535. commentarii T.
VIII. 124. Tom. IX. 459.
Tom. X. 640

Hemerobii Linn. chrysops di-
cti infecti desc. 646. lar-
vae ortus ib.

Hennig, acad. reg. scient.
Norwegicae socius 538

Hepaticorum vasorum anasto-
moses in fetu humano 266
seq. earum vsus 267

Hermaphroditi, de iis obser-
vationes 144

Herniae, de iis observatio-
nes 500. congenitae, ea-
rum inuentor 142. de iis
observationes et monita
practica ib. crurales cur in
feminis crebrius occurrant,

quam in viris 500. circa
earum operationem in vi-
ris monita practica 150.
inguinalis cum crurali com-
plicatae observatio 499 sq.
omenti vid. Epiplocele.
thoracicae duplex causa
125. vmbilicalis carcera-
tae in femina 80 annorum
curatio 134

Herniosi, num ab officio pres-
byteri arcendi? 143

Herpetis distinctio et species
323 sq.

Hill, Io. consilia constituen-
dae acad. reg. scient. Lon-
dinensis 346 sq.

Hippocratica morbis acutis
medendi methodus 632 sq.

Histoire et mémoires de l'a-
cademie royale des scien-
ces. Année 1764 et 1765.
253. Histoire naturelle gé-
nerale et particuliere par
Mr. de Buffon et d'Au-
benton, editionis nouae
auctioris recensio 540 sq.

Homines, quem caloris gra-
dum ferre possint 256

Hoogendyk, Steph, societa-
tis physico experimentalis
Batauae fundator et auctor
718

Hordei spica ramosa 255.
275. multiplicatio et sa-
tum, de ea experimenta 395

Humectantium vsus in mor-
bis nervorum 319 sq. in
morbis spasmodicis 320

Humorum motus in vasis ca-
pillaribus et tela cellulosa
629

Hunteri opus de vtero edi-
tum iri indicatur 141 sq.

Hybrida animalia vid. *Ani-
malia*

malia. Hybridarum plantarum generatio et natura 481 sq.

Hydargyrus vid. *Mercurius*.

Hydrocele, eius distinctio et curatio 684. sola compressione curata 148. congenita 142

Hydrocephali causae, signa et curatio 679 sq. in fetu observatio 320. insignis descr. 528 sq. interni inventio et historia 225 seq. diuersa stadia et symptomata 226 sq. signa 228. causae et curatio 228 seq. eo demortuorum dissectiones 227

Hydromphali signa et curatio 683

Hydrophobia ex abusu potus spirituosus 652. letalis eius duo casus 461 sq.

Hydrops, eius species 679 sq. curatio 685. ascites 681 seq. labiorum externorum pudendi 684. pectoris 680 sq. pericardii 681. ventriculorum vid. *Hydrocephalus*. vteri 683

Hymen cartilagineum in parturiente 288

Hyoidei ossis luxatio 587

Hyoisyami extracti vsus et effectus in variis morbis 303 sq. in colica spasmodica 428. in morbis melancholicis et epilepticis 491 sq.

I.

Ichthyocolla, ex quibus piscibus et quomodo praeparatur. 14 seq.

Ichthyologia Massiliensis 47.
Tom. XVII. Pars IV.

ichthyologica philosophia 400 seq.

Icteri distinctio, causae et curatio 686 sq.

della Idropisia de' Gelfi 518

Iliaca passione mortuae sectio 527.

Incrustatum Rakanienfe 134

Indiae aues rariores 697 sq.

Inflammationis causa et curatio 623. 629 sq. verae sedes 425. signum ex crusta sanguinis inflammatoria dubium 426

Inoculationis variolarum commendatio 462 seq. historia

468. facta in Gallia 274.

successus Rotterodami observatus 140. sinistri euentus causae ib. methodus

Algeriae et Bengalae in

India orientali visitata 391.

in Arabia visitata 392.

ad eandem subiecta apta

468. aetas aptissima primi

6 menses 469. constitutio

ib. instituendae anni tempus ib. ad eam praeparationis utilitas et modus

470 sq. puris seu materiae

variolosae selectus ratio

471 sq. insitionis locus 472

variae methodi 472 seqq.

de iis cautela ib. methodus

quaenam praestantior

473 sq. circa operationis

successum cautela 474.

quae post operationem ob-

seruanda et peragenda 475

seq. decursus morbi varietas

476 sq. eadem quod re-

cidium praecaueat, affir-

matur 477. variae super

ea quaestiones solutae 478.

contra eam obiectiones mo-

- tae refutatae, eiusque com-
moda 492. eadem, vt po-
steritati noxia 512. spuria-
rum frustra tentata 209
- Insectorum** circa Ratisbonam
indigenorum icones 92.
musei Petropolitani raro-
rum desc. 696
- Intermittentium februm** cau-
sa et curatio 103
- Intestinorum processus** seu di-
verticula 501. formatio
in embryone gallinaceo
obseruata 703 seq. Intesti-
num rectum vid. *Rectum*.
- Irritabilitatis causa** 628. ef-
fectus 629. eadem omni-
bus corporis partibus inest
628 seq.
- Ipecacuanhae** vsus in asthma-
te 201. vsus antisepticus 606
- Ischuria a faba vrethrae im-**
missa 322
- a Iusti, Io. Henr. Gottlieb,
obitus 351 sq.
- K.
- Kermes mineralis** vsus in
pleuritide verminosa 219
- Kirkland's Thom.** obserua-
tions upon Mr. Pott's ge-
neral remarks on fractures
etc. 666
- Kongl. Vetenskaps Acade-**
miens Handlingar foer Aor
1768. Vol. XXIX. 58
- L.
- Labii inferioris cancrofi vlce-**
ris exstirpatio 323
- Lac, de eo experimenta che-**
mica 580. eius vsus in-
signis in scorbuto 525.
vsus et abusus in phthisi pu-
rulenta 610
- Lacerta Amboinensis** 49
- Lactea vasa in auibz** 396. me-
tastasis vt causa mortis in.
puerpera 130
- Lanam in telas** contexendi
artis antiquitas 479 seq
praestantiorem ab ouibus
obtinendi modus 483 seq.
- Lapathi radice** decocti vsus in
putredine scorbutica 625 in
vulceribus mammarum 309
- Laurenti, Laur.** operis orni-
thologici editor. 294
- Lepadogaster, nouum piscium**
genus 409
- Lepidopus, piscium** genus 409
- Leprae arabum** casus et sym-
ptomata 239 sq. curatio 240
- Leucophlegmatia, eius causae**
et curatio 679. verminosa
217
- Leuis, Io.** obiit 720
- Lignum, in eo varias figuras**
regionum vrbiu cet. de-
lineatas sistendi enchiresis
136
- Liquores corporis animalis,**
eorum differentia 330. v.
etiam *Fluida*.
- Lithantracum** fodinam arden-
tem extinguendi modus
271
- Lithontripticorum remedio-**
rum operandi modus 260
- Lithotomiae, apparatu alto**
peragendae, methodus in
feminis adhibenda 326 sq.
eam sequentis peculiaria
symptomata 327
- Litorella iuncea, nouum plan-**
tae genus 73 sq.
- Locustas, earumque oua de-**
struendi remedia 264
- Londinensis aqua putealis**
195 sq. acad. reg. scient.
constituendae consilia 346
- Longaeuitatis auxilium** 691,
Loquelam

- Loquelam furdis restituendi
methodus 12. 24
- Lucas, Car. obiit 720
- Lucensium thermarum atmos-
phaera 593
- Ludwig, Chr. Gottl. aduersa-
ria medico practica V. I. 488
- Ludwigia, de eius morbo,
morte et cadaueris disse-
ctione obseruata 503
- Lumbrici ex intestino in her-
nia inguinali excretio 648.
- ex naribus excretio 651.
- eorum setae 240 sq.
- Luxationes membrorum tra-
ctandi modus, de eo moni-
ta 664 sq. 668. complica-
tas tractandi modus 668 sq.
- femoris vid. *Femur*.
- Lymphae ad colataria organa
conuersionis morbosae ra-
tio 510 sq. curatio 511 sq.
- Lymphaticum systema in aui-
bus 396 sq.
- M.
- Magneticae theoriae examen
700. acus inclinationes, ad
leges hydrographicas deli-
neatae 67
- Magnetis artificialis vsus in
doloribus et rigiditate di-
giti 429
- Magnetismus cupri et orichal-
ci vnde? 702
- Mammarum scirrhi curatio 90.
canceri recrudescentis cura-
tio 90 sq.
- de Man, Maximil. Iac. societ.
scient. Harlemonf. socius
536
- Manetti, Xaver. operis orni-
thologici Geriniani editor
294
- Männioca, planta 592
- Marcasitae, quid? 26
- Maret, ab acad. scient. ele-
gant. liberar. et artium Am-
bianensi praemium accepit
716
- Marquet, Traité pratique de
l'hydropisie et de la jau-
nissé 678
- Marsiliensis acad. scient. et
artium thes. et praem. ad
ann. 1771 et 1772. 348
- Martini, Frid. Heinr. Wilh.
neues systematisches Conchy-
lien. Cabinet. Erster Band 230
- Maxillarum in infante rege-
neratio 127
- Medical transactions, publi-
shed by the College of
Physicians in London. V. I.
195
- Medicamentorum topicorum
vsus et abusus in variolis
505
- Medico practicae obseruatio-
nes 427 sq.
- Medicorum dissensus in com-
modum artis salutaris con-
vertendi ratio 505
- Membrorum singularis distor-
sio 257
- Memoires de mathematique
et de physique. Tom. V. 3
- Memorie sopra i muli di vari
Autori 120
- Menyngum vsus 332. in iis
sedes animae 334
- Mercurialis medicamenti ca-
lomel dicti vsus et effectus
in variis morbis 75 sq. mer-
curialium pilularum prae-
paratio 89. vsus in lue ve-
nerea ib.
- Mercurii congelatio, de ea
obseruata et experimenta
695. vsus et operandi mo-
dus 202. vsus in morbo
quodam oesophagi 203.
- Ccc 2 sublimati

- sublimati corrosiui vsus in
scirrhis 199. in lue vene-
rea vsus noxius 71
- Merfi, de eorum morbis causa,
experientiae et obseruatione-
nes 109 sq. eos vitae re-
stituendi consilia et modus
352 sq.
- Messe, Dav. a societ. Amste-
lod. artium liberal. et scient.
praemium accepit 349 sq.
- Metallorum cum sulphure af-
finitas 283 seq.
- Metastasis lactea mortis causa
in puerpera 130 sq. tumo-
res parotidum ad testes
583
- Meteorologicae obseruatio-
nes 695 seq.
- Mica lamellis magnis paralle-
lis Cronst. 706
- Michaelis, Io. Dan. editionem
nouam Celsii hierobota-
nici molitur 540
- Microscopicae obseruationes
et experimenta super glo-
bulis sanguinis rubris 243
seq. super actione cordis
in vasa sanguifera 247. su-
per sanguine eiusque motu
486 seq.
- Milia vesicularia alba, eorum
definitio 156. iis medendi
methodus 157
- Miliare exanthema, vt sym-
ptoma 151. non est con-
tagiosum ib. eius origo ex
culpa medici 152. illud
praeuertendi modus ib.
eius curatio 153. album
de eo obseruatio 155. eius
causa proxima et distinctio
155. sedes in nervis et
fluido nerueo 154. 156
- Mneralisationis momenta et
ratio 283
- Mola duplex in vtero bipar-
tito 50 seq.
- de Monchy, med. prof. Rote-
rodam. 350
- Monnet, Traité de la vitrio-
lisation et de l' alunation
278
- Monstrum humanum 26. 254.
528. 529. 591. sine cere-
bro 318
- Montium igniuomorum or-
tus 27
- Morbi nigri symptomata et
cura 425. chronici vid.
Chronici. putridi, eorum
causae 603 seq. in primis
viis haerentium causae,
gradus et curatio 605 seq.
a putredine sanguinis pro-
ductorum causae, differen-
tia et curatio 607 sq.
- Morgagni, Io. Bapt. obitus
719
- Mori, arboris excrescendi ra-
tio in China et Italia com-
parata 518. morborum
causae et curatio 519 seq.
hydropis ortus et noxa 520
sq. incisionis vtilitas et mo-
dus 523
- Morsus canis rabidi effectus
letales 461 sq.
- Mortuos violenta ratione ac
subito, vitae restituendi
modus et consilia 352 sq.
- Muli Pedemontani dissectio
121
- Munniks, Wynold. anat. et
chir. prof. ord. Groningens.
538
- Murray, Io. Andr. de vermi-
bus, in lepra obuiis, iuncta
leprosi historia, et de lum-
bricorum setis obss. 238
- Mus aguti Linn. 59
- Musci,

- Musci, plantarum cryptogamicarum classis 711. eorum genera ib. species emendatae et nouae ib. propagatio sine cotyledonibus negatur 645
- Musculi, eorum in piscibus ratio 404. ossiculorum auditus, eorum actio et vsus 341. vteri obliqui laterales 13. quadrigemini vterini ib. orbiculares laterales 14
- Mytili lithophagi Linn. historia naturalis 23
- N.
- Nahuys, Alex. Petr. societ. scient. Harlemens. socius 536. anat. et chir. prof. ord. Harderovic. 538. a societ. scient. Vlissingensi praemium accepit 535
- Nani, eorum species 254. de iis obseruationes ib.
- Napelli extractum vid. *Aconitum*.
- Naphthae salis communis praeparatio 4
- Nautarum victus et potus 107 morbi 94 seq. dysenteria 103. scorbutus 95. morbi acuti 103 sq. eorum sanitatem conseruandi remedia 106 seq.
- Nautili siphonis vsus 236
- Nebel, Chph. Ludov. med. prof. extraord. Giesiensis 719
- Neruei fluidi natura et actio 331 seq. ortus 332
- Neruorum sensatio declarata 332 sq. influxus et consensus cum corde et pulmonibus 628. ad auditum facientium descr. 338 seq.
- Neruosi morbi singularis obseruatio 427
- Neubauer, Io. Ern. diff. de tunicis vaginalibus testis et funiculi spermatici 530
- van Nooten, S. a societ. scient. Vlissing. praem. accepit 535
- Noui commentarii acad. scient. imper. Petropolitanae Tom. XI et XII. 694
- Nuove osservazioni sopra i globetti rossi del sangue 242
- Nyctalopiae casus 198
- Nympharum vsus 411
- O.
- Obstetriciae artis elementa 286. 410
- Oculi anatomen spectans animaduersio 336. tunica choroidea, de ea obseruationes 10 sq. vulnus cum symptomatibus. peculiaribus 316
- Oeder, Geo. Chr. floram Danicam et pericula contagii inter armenta grassantis transferendi est continuaturus 163
- Oesophagi morbus grauissimus 202 sq. tumor scirrhuso carcinomaticus 693
- Oettinger, Io. Car. med. prof. extraord. Erford. 718
- Olei asphalti praeparatio et vsus in vlceribus viscerum 132. 464 seq.
- Oliuarum culturae optinae declarationi praemium expositum 348
- Omenti diuersus situs et mutationes morbosae 145. pondus insigniter auctum ib. scirrhusib. scirrhus petrificatus 146. ligaturae vsus in operatione herniae 149. hernia vid. *Epiplocele*.
- Opii largior vsus 265. vsus in febre miliari 157. vsus Ccc 3 chirurgi-

- chirurgicus et effectus 433
sq. vis cardiaca controuer-
sa 506. de eius usu caute-
lae 507
- Orchidum austriacarum clas-
sis, genera et species 452 f.
- Orichalci virtus magnetica
vnde? 702
- Ornithologia methodice di-
gesta 293. de ea scripto-
res 294
- Orthoceratites, eius structura
233
- Offa permagna in America
reperta 388. rhachitico-
rum, de iis obseruationes
589
- Offea fragmenta in albugi-
nea testis tunica reperta
265
- Officula auditus, eorum usus
341. branchialia in pisci-
bus 406
- Offis hyoides luxatio 587.
occipitis foraminis magni
diuersus situs in homini-
bus et animalibus 263
- Ossium singularis distortio
257. singularis rigiditas et
emollitio 265. cylindrico-
rum fractura imperfecta
321. peluis in partu didu-
ctio affirmata 287 seq. in
partu naturali negata 411.
duorum pedis in quadru-
pedibus concretio 588. nu-
merus et ratio in piscibus
403 sq. 406. fracturae
vid. *Fracturae*.
- Oua excludendi modus Sinen-
sibus vsitatus 67. in naui-
bus a corruptione praefer-
vandi modus 107. incuba-
ta, cum iis instituta expe-
rimenta 703 sq.
- Ouarii hydrops 684. tumor
insignis 52 seq. 57
- Ouium cultura antiquissima
479. sollers; cultura in Hi-
spania 480. culturae ratio
in Suecia 481. 484. lanam
praestantior in sobole
conseruandi modis 481.
483 sq.
- Oxymellis colchici vsus in va-
riis morbis 303 sq.
P.
- Pallas, P. S. spicilegia zoolo-
gica. Fasc. V. VI. VII et
VIII. 418
- Pallucci, Natal. Giuseppe sag-
gio di nuove osservazioni e
Continuazione del Saggio
85
- Palpitationis cordis causa sin-
gularis 54 sq.
- Paracentesis in fetu ascitico
vino instituendi modus 290
- Papilionaceae plantae vide
Plantae.
- Paralysis per febrim putridam
soluta 692
- Parisiinae acad. reg. chirurgo-
rum thes. et praem. ad ann.
1772. 161. 347
- Parisini agri fossilia 262
- Parotidum tumores epidemi-
ci 583. vulnus sanatum 316
- Partus distinctio 412. natu-
ralis causae 288. naturalis
post praegressam haemor-
rhagiam vteri 8 mensium
694. praeternaturalis quid?
288. difficilis variae caus-
ae ib. seq. ferotini possibi-
litas 292. ferotini 18 men-
sium casus 315. caesareus
vid. *Caesarea sectio*.
- Patyn, prof. med. Roterodam;
350
Pectoris

- pectoris hydropis distinctio, causae, signa, et curatio 680 sq. vulnerum suctioni inseruiens instrumentum nouum 507 sq.
- Pediculus auium alatus, insectum 647
- Peluis feminini mensura 411. cum capite fetus comparata ib. ossium diductio vid. *Ossium*.
- Pemperton, Henr. obiit 351
- Pericardii hydropis causae, signa et curatio 681. in eo sanguis effusus repertus 689 seq.
- Peripneumonia, de ea observationes 425. Nanceii ann. 1757. grassata, eius causae et curatio 689. ea a vermibus 219. ea demortui sectio 54
- Peruvianus cortex, num adstringat? 211. eius vsus chirurgicus et analysis 436. vsus antisepticus 626. vsus et dosis in variis febrium speciebus 591. effectus in dolore periodico supercilii 315. vsus in elephantiasi 197. in tumoribus albis articularum 201. cum mercurio et cicuta commisti vsus in cancro 200
- Pestis, vid. *Pulueris*.
- Petropolitanae acad. scient. noui commentarii Tom. XI et XII. 694
- Philosophical Transactions Vol. LVIII. 387
- Phosphorum praeparandi modus 398. super varia eius luce experimenta 399
- Phthisis pulmonalis, de ea observationes 424
- Physteris macrocephali Linn organon auditus 460
- Physicae observationes 253. 264.
- Phytotypolitus Bononiensis 584
- Pibrac, Egidius de Bertrand, mortuus 539
- Pilulae aethiopicae Edinburgensium 72. earum vsus in lue venerea ib. ex calomelo, croco et camphora 75. mercuriales, earum praeparatio 89
- Pinguedo euomita 427
- Pinguin, auis character genericus et species 390
- Pinnarum in piscibus vsus et differentia 402.
- Piscinas struendi ratio 59. 65
- Piscis Guaperua 75
- Piscium historia philosophica 400 sq. classes ordines et genera 408 sq. species novae 48. rariorum descriptio 421 sq. anatome externa 401 sq. interna 403 sq. ossa 403 sq. 406. musculi 404 viscerum et vasorum ratio 405 sq. surditas probata 403. pinnae vid. *Pinnae*. ossicula branchialia vid. *Ossicula*.
- Placentae nexus cum vtero ope arteriarum 64. extractionis modus 413. ante caput fetus prolapsus et perforatio 292. diu in vtero sine noxa relictas casus ibid.
- Plantae, earum species novae et mutatae 705. vis medica ex characteribus botanico cognoscenda 705 sq. marinae, ex iis alcali, sodae simile

- simile praeparandi modus
 18. plantarum austriaca-
 rum umbelliferarum classis
 et genera 444 sq. species
 mutatae 446 sq. classis
 emendata 454 sq. ringen-
 tium classis et genera 448
 sq. species mutatae ib. sq.
 papilionacearum classis et
 genera 450 sq. orchidum
 classis et genera 452 seq.
 cruciformium classis emen-
 data 456 sq. cryptogami-
 carum florae Gottingensis
 classes 708. hybridarum
 generatio et natura 481 sq.
 Plantaginis feminis vsus an-
 thelminticus 216
 Plenks, Ios. Iac. *Anfangsgrün-
 de der Geburtshülfe* 286.
*Sammlung von Beobachtun-
 gen über einige Gegenstände
 der Wundarzneykunst. Er-
 ster Theil.* 429
 Pleuritis a vermibus 219. nau-
 tarum, eius differentia et
 curatio 104
 Plomberianarum aquarum hi-
 storia naturalis et medica
 9 sq. calor ib.
 Plumbi praeparatorum effe-
 ctus 205. vsus noxius 206.
 vino pomaceo admixtivsus
 ut causa colicae 204 seqq.
 210. particularum vni-
 cum vino 204. venenum.
 quibus modis clanculum in
 corpus humanum applicari
 possit 205 seq.
 Poissonnier, Desperrieres traité
 des maladies des gens
 de mer 94
 Polypi bronchialis casus 208.
 genesis ib. sq. ex naribus
 et ore extirpatio 326. vte-
 ri curatio 314. 319
 Polytrichi propagatio per co-
 tyledones 645
 Porcus monstrosus 691 seq.
 Pororoca, aquarum inundatio
 592
 Porterfield, Guil. obiit 539
 Pott's, Percivall, observations
 on the nature and conse-
 quences of those iniuries,
 to which the head is liable
 from external violence 654
 general remarks on fractu-
 res and dislocations ib.
 Praesagiorum theoria 334 sq.
 Priapismi curatio 89
 Psittaci vita 133 annorum
 299
 Pudendorum muliebrium
 gangraenae et sphaceli cu-
 ratio 56
 Puerperarum mucoso vermi-
 nosa febris 219. mors ex
 metastasi lactea 130 seq.
 Pulmonum lobus in os con-
 versus 530
 Pulsus diuersa ratio in hydro-
 cephalo interno 226 seq.
 Pulueris hydragogi formula
 685. contra pestem effectus
 Purgantium hydragogorum
 formulae 685
 Puris genesis et differentia 630
 Purpura rubra seu chronica
 de ea obseruata 153. alba,
 vid. *Miliare exanthema*.
 Putredo, eius gradus 622.
 animalis, quid sit 596. 612.
 eius differentia, phaenome-
 na et modus 596. 612 seq.
 619. causae et effectus
 603 sq. 612 sq. 619. 622.
 gradus, distinctio et signa
 614. 625 sq. externae sta-
 dia vel gradus 603. diffe-
 rentia et curatio 605. in
 primis

- primis viis collectae caussae gradus et curatio 605 seq. in sanguine differentia et caussae 607. sanguinis scorbuticae gradus et curatio 607. febrilis gradus et curatio 608. purulentae curatio 609 sq. gangraenosa curatio 611. ei resistentia remedia vid. *Antiseptica*. Putridi morbi vid. *Morbi*. Pyritarum definitio et differentia 26. natura et qualitates 279 seq. mutatio in vitriolum 280 seq. de iis eorumque combinatione cum aliis materiis observationes 27
- Q.**
Quassiae radice vsus in febribus variis 390
- R.**
Ranae variabilis historia 421
Raulin, traité de fleurs blanches, avec la methode de les guérir 28
Recti intestini incarceration, a pessario inducta 691
Reichel, Geo. Christ. de sanguine, eiusque motu experimenta 485
Reinhold, Sam. Abrah. diss. de aconito napello 673
Ren vnicus in fetu 321. renum abscessus a calculo 590. magnitudo praeternaturalis et vesiculae serosae 585. in aubus anato-me 593
Renon, Bartholdus obiit 539
Retinae oculi tunicae officium 337
Reuff, Christ. Frid. prof. med. extraord. Tubing. 351
Rhachitis, de ea obseruationes 589
Rheumatismus, de eo obseruationes 426. electricitatis ope curatus 62. nautarum, eius curatio 103
Rhinocerotis et natura et varietas 466
Richter, Aug. Gottlieb. prof. med. ord. Gotting. 351
Riedel, acad. artium et scient. Viennensis membrum 718
Ringentes plantae vid. *Plantae*.
Roterodami societas physico experimentalis constituta 345 sq. 718
Roux, A. Journal de médecine, chirurgie, pharmacie cet. Tom. XXV. XXVI. 309
du Rozier, Abbas, a Mar-silienfi acad. scient. et artium praemium accepit 348
Rudolph, Io. Phil. Iul. diss. de vitione cranii in epilepsia 158
- S.**
Sabatier, editio auctior Cl. Verdier abrégé de l'anatomie du corps humain Tom. I. II. 636
Sacchari cocturae meliori modo praemium expositum 714 seq.
Sal commune ope euaporationis conficiendi modus 255. eius effectus et vsus contra vermes 198. alcali, sodae simile ex plantis marinis praeparandi modus 18. ammoniacum natium ex solfatara obtinendi modus 269 sq. marinum, eius aetherem praeparandi modus
Cec 5 dus



- dus 3 sq. tartari crySTALLI-
 fandi ratio 263. eius cry-
 stallos conseruandi metho-
 dus 277
 Salamandra aquatica, in ea
 actio cordis in vasa sangui-
 fera obseruata 247 sq.
 Salerne, l'histoire naturelle
 éclaircie dans une de ses
 parties principales l'orni-
 thologie, traduit du latin
 de Ray 45
 Salinae Stara Russiensis 703
 Salsae aquae euaporationis
 methodus emendatior 255
 Salsola kali, planta 25
 Sandifort, Eduard. societ.
 scient. Harlemerf. socius
 536. in acad. Lugd. Bata-
 va anat. et chir. prof. ex-
 traord. 163 719
 Sandifort, I. B. Hagae comi-
 tum fratri successit 351
 Sanguinis natura et motus,
 de eo obseruationes micro-
 scopicae 485 sq. globuli ru-
 bri, super iis obseruatio-
 nes microscopicae 243 seq.
 eorum mixtionis et com-
 positionis ratio 246. ve-
 nosi ab arterioso differen-
 tia 487 sq. circulationis
 per hepar in fetu humano
 ratio 266. 267 sq. circula-
 tio in salamandra aquatica
 microscopio obseruata 248
 sq. stasis in venis inflam-
 mationem mentiens 495
 Saponis optimi parandi modo
 praemium expositum 348
 Sarcomatis insignis in viro ca-
 sus 321 sq. vteri insignis
 casus 527. sanatio 314. 319
 Saturninorum remediorum
 noxa 206
 Scandix infesta, planta 705
 Scarabaei variae species 696
 Schacht, Nic. Geo. Osterdyk,
 praxeos clin. chem. et bo-
 tan. prof. Harderovic. 538.
 Schaefferi, Iac. Christ. icones
 insectorum circa Ratisbonam
 indigenorum 92
 Schloffer, Io. Alb. de lacerta
 Amboinenfi 48
 a Schulzenheim, Dav. respon-
 sio ad quaestionem reg. aca-
 scient. Sueciae super pur-
 pura 151. 162
 Schwaben zur *Arzneugelabr-
 heit und Naturkunde. Erster
 Band* 423
 Scirrhus, eius curatio 199 sq.
 mammarum eiusque cura-
 tio 90. omenti 145. omen-
 ti petrificatus 146. insignis
 ad fundum ventriculi re-
 pertus 692
 Scleroticae albus color unde?
 II
 Sclopetorum vulnerum, vi ae-
 ris moti ortorum, theoria
 432 sq. curatio 433
 Scorbuti caussae, 95. 524.
 gradus et symptomata 96.
 diagnosis et prognosis 97
 seq. prophylaxis 98. cura-
 tio 100 sq. 607. de eo ob-
 seruationes generales 102
 Scriptorum physico medico-
 rum, quae anno 1768 pro-
 dierunt, index 165 sq. eius
 continuatio 364 sq. anni
 1769 index 553 sq. eius
 continuatio. 722 sq.
 Scrophula farcimen, equo-
 rum morbus 74
 Secundinae vid. *Placenta*.
 Seelandina societas Vlissin-
 gensis vid. *Vlissingensis*
 Semina

- Semina conseruandi et super mare transportandi modus 390
- Seminalium vesicularum abscessus 88 seq.
- Sensationum theoria 332 sq.
- Sensibilitas neruorum declarata 332. partium vulnerarum 627
- Sensuum internorum theoria 333 sq.
- Simia oedipus Linn. 65
- Smaragdi Brasiliensis proprietates electrica 700
- Snip, Tolcardus, obiit 719
- Soda, quibus ex plantis et quomodo praeparetur 25. ei simile alcali ex plantis marinis praeparandi modus 18
- Solfatara prope Neapolim, de ea observationes 269 seq.
- Tiburtina et Viterbiensis 16
- Solida corporis animalis pars, quid? 330
- Soni theoria 340 seq.
- Spallanzani dell' azione del cuore ne' vasi sanguini noue offervazioni 247
- Spasmodicus morbus singularis 427
- Spasmus vesicae, morbus 641
- Spermatici funiculi tunicae vaginales 351 sq.
- Spina dorsii, ad eam orti dolores varii eorumque causae 515 sq. spasmii et tensiones variae 516 sq. eorum curatio 517
- Spina ventosa, eius notio 86. ortus et incrementi successui stadia ib. sedes ib. curatio 87 sq. extracto acconiti curata 302 seq.
- Spirituosi potus abusus, ut causa hydrophobiae 652
- Spiritus fumantis Libavii praeparatio 4
- Squalus edentulus 47
- Stellarum marinarum incessus 585
- Sterilitatis causae 122. 690.
- Stoerck, Anton. libellus, quo continentur experimenta et observationes circa noua sua medicamenta 300. libellus de herba dicta flammula iouis eiusque vsu 305
- Storia naturali degli uccelli Tom. I. 293
- Stramonii extracti vsus et effectus in melancholicis et epilepticis morbis 497 seq.
- Struma insignis testiculi muliebri 51 seq.
- Struthiopteris, filicum genus 712 seq.
- Svar pae Kongl. Vetensk. Aca-
demiens Fraga huru all
flags Frisel kan foere kom-
mas och botas, sa hos Barn-
saengs-Huflruv, som andra? 151
- Submersi vid. Merfi.
- Sudor digitorum vtriusque manus singularis 693
- Suffocati, de eorum mortis causa experimenta et observationes 111 sq. eorum mortis violentae indicia 117 seq.
- Sulphur, eius status in mine-
ris et metallis 283 sq. affi-
nitas cum ferro 284. cum
cupro ib. cum aliis metal-
lis 285. venereum quid? 508. eius effectus in epi-
lepsia habituali 509
- Superfetatio, eius possibilitas 689. in fele obseruata 315
- Suppura-

- Suppurationis theoria 630
 Surdis loquelam restituendi methodus 12. 24
 Sutarum coalitus in fetu, partus difficillis causa 289
 Sylvestre ab acad. reg. chirurg. Parilina praemium reportavit 347
 Sympathiae theoria 334 sq.
 T.
 Taenia cum lumbricis simul observata 311 sq. ope tincturae ialappae excreta 685
 Tartari tartarifati vis lithontripica 585. cremor vid. *Cremor*.
 Tendinis ruptae patellae curationi inferuiens vinctura 588. musculi recti femoris curatio 132. tendinum vulneratorum sensibilitas affirmata 627
 Terra, eius motuum causa et ortus 27. fertilis, eius disquisitio chemica 442. coerulea in palude torfacea, in Scotia inuenta 393. cretacea, eius ortus a lapidibus calcareis ramosis 5
 Testaceorum museum 231. systematica dispositio 233 seq.
 Testium diuersus situs, numerus et morbi 143. tunicarum vaginalium descriptio 531 sq. tumor metastaticus 583. in piscibus anatome 406
 Tetani curatio 318. 322
 Theodoro Palatinae acad. scient. thes. et praem. ad ann. 1773. 536
 Thermarum germaniae tabula systematica 80 sq. Plomberianarum historia naturalis et calor 9
 Thermometricae observationes circa calorem in somno 66
 Thinkel, Christ. Henr. a societ. naturae indagatorum Gedanensi praemium accepit 537
 Thyroideae cartilaginis vulnus singulare 310
 Tolosanae facultatis medicae doctores et professores 161. acad. scient. inscriptionum et elegant. litterarum thes. et praem. ad ann. 1772. 1773 et 1774 714
 Tonitru effectus varii in corpore humano 430. eorum curatio 431 sq. cum electricitatis effectibus comparatio 260
 Tourmalini electricae proprietates 58. 63
 Trachipterus, nouum piscium genus 409
 Transactiones philosophicae ad. ann. 1768. Vol. LVIII. 387
 Tremellae species in thermis Plomberianis obuia 10
 Trepanationis vsus et necessitas in fractura caluae 657. modus 658. in futuris instituendae commentatio ib. in osse frontis 659
 Triorchidum probatio 143
 Triticum ramosum 255. 275
 Tubularia fungosa, zoophytum 607
 Tumor capitis cysticus insignis 529. in abdomine insignis ossescens repertus 589. scirrhus carcinomaticus oesophagi 693. tumoribus albis articularum medendi methodus 201
 Tussis a particula costae bouinae, in pulmone haerente 135. infantum ann. 1768 Nordlingae epidemica 428
 Tutiae Alexandrinae praeparatio 703
 Tympani membranae vsus 341
 Tympanitis ab ascite differentia, causae et curatio 683
 V.
 Vagina vteri vid. *Vterus*.
 Vanne, Violante, operis ornithologici tabularum editor 294
 Variolae non sunt morbus 512. iisdem corpus depuratur ib. earum ortus ex euolutione arteriarum cutanearum controuersus 497. naturales bis homines inuadentes 135 sq. naturales artificialibus succedentes 139. in iis topicorum vsus et abusus 505. in fetu observatae 506. in fetu ante partum 649. earum contagium post singulum quinquennium epidemicum 133. bis homines inuadens 135. 139. spuriarum a veris differentia 209. inoculatio frustra tentata 209. vid. etiam *Inoculatio*.
 Vasa, eorum ratio et distributio in piscibus 407. lactea et lymphatica in auiibus 396 seq.
 Vegeta-


- Vegetabilium recentium actio et**
vsus antisepticus 603
- Venae, earum pulsus causa** 276.
infarctus et stasis sanguinis, in-
flammationem mentiens 495.
salamandrae, in iis sanguinis
circulus, microscopio observa-
tus 251 sq.
- Venaesectionis vsus et abusus in**
apoplexia et paralyti 211. in
haemoptoicis 493 sq. in vomitu
cruento 494. vsus in morbis
putridis 624. prophylacticae
vsus in nautis 107
- Venenum lentum ex plumbo** 205
- Venerea lues, de ea observatio-**
nes 88. eius curatio 89. in
ea remedia 71 seq.
- Ventriculi rupti observatio** 136
- Verdier, Abregé de l'anatomie du**
corps humain. Par Mr. Saba-
tier. Tom. I. II. 636
- Verhandeligen uitgegeeven door**
de Hollandsche Maatschappye
der Weetenschappen te Harlem
VIII Deel. 124. IX. Deel 459.
X Deel. 640
- Vermes, causa haemorrhagiae vteri**
215. causa vertiginis 324. contra
eos remedia 198. 221. ex her-
nia incarcerata egressi 254. per
nares excreti 159 sq. 651 seq.
ex intestino in hernia inguinali
procidentes 648. in sinibus
frontalibus ouium reperti 254.
in lepra obuii 238 seq. eorum
larvae et muscae 239. genera-
tionis causae 240
- Verminosa constitutio epidemica,**
eius historia 212 seq. pleuritis
et peripneumonia 219. exan-
themata, eorum causa et cura-
tio 218. verminosae febres con-
tinuae putridae 213. intermit-
tes biliosae et catarrhales 215.
febres lentae 216. leucophleg-
matiae, ratio 217. verminoso
mucosae febris, grauidis et puer-
peris accessoria 219. vermino-
forum morborum diagnosi 222
seq. symptomatum explicatio
221 sq.
- Vernalium curationum vsus et**
abusus 509 sq.
- Verrucae canerosae** 199
- Versionis vsus in extrahendo fe-**
tu 290 seqq. de eo monitu
291
- Vertigo a vermibus** 324
- Vesica vrinaria vid. Vrinaria.**
- Vesicatoriorum vsus in tetano** 318
- Vesontiensis acad. scient. thes. et**
praem. ad ann. 1772. 716
- Vesuvii montis eruptio** 387
- Veterinariae artis historia** 164.
schola constituta Gottingae
542. Hafniae 553
- Viennae academia artium et scient.**
fundata 718. praemium institu-
tum et iussum est, meritis, et
subito ac violenter mortuis au-
xilium praestandi 353
- Viennensis facultatis medicae do-**
ctores et professores 533
- de Villa, Don Anton. Cap. bo-**
tan. et agriculturae prof. To-
vanæ in Murcia 162
- Vindobonensis vid. Viennensis.**
- Vink, a munere prof. med. Rote-**
rodam. se abdicavit 351
- Visus organa et ratio** 336 seq. sen-
sationis duratio experimentis
probata 271 seq.
- Vitrioli formatio et differentia**
27. ortus 278. ex pyritis for-
matio 280 sq. coerulei seu cu-
pri praeparatio 282. Romani
origo et formatio 17
- Vitriolisationis notio** 279
- Vitrum fossile naturale, lapis** 701.
eius analysis chemica ib.
- Viueria narica, animal** 64
- Vlcerum tractandorum emenda-**
tioni praemium constitutum 161.
347. vlceris vesicae curatio
310
- Vlissingensis societatis artium et**
scientiarum institutum et ratio
533. membra 534. thes. et
praemia ad ann. 1773. 535
- Vmbelliferae plantae vid. Plantae.**
- Vmbilicalis funiculus, num ex eo**
abscisso sanguis emittendus?
288. 291. eius prolapsus rarior
291. 413. ligaturae ratio in
partu gemellorum 292. intra
uterum dissectionis et ligaturae
modus non probatur 291
- Vnguenti helcotici vsus in spina**
ventosa 87. in lue venerea 89.
in scirrho et cancro 90 sq.
- Vnguentorum abusus disquisi-**
tioni

- tioni praemium expositum 161.
347
- Vomitus cruentus, num et quando in eo venaesectio? 494 seq.
- Vreteres in auibis 593
- Vrina pituitosa, morbus 641. eius signa et causae ib. seq. diagnosis et curatio 642. in ea pinguis cuticula 427. verminantium 220. eius retentiones in grauidis curatio 412
- Vrinariae vesicae fluxus catarrhalis 321. spasmus seu tenesmus, morbus 641. vlcëris curatio 310
- Visionis vsus in epilepsia 158. eam instituendi modus 158 seq.
- Vteri fabricae musculosae disquisitio anatomica 14 seq. musculi obliqui laterales 13. quadrigemini vterini ib. orbiculares laterales, eorumque vsus 14. nexus cum placenta ope arteriarum 64. bipartiti observatio 51. duplicis descr. 688. exulceratio cum conuulsionibus 56. haemorrhagia, num a vermibus oriri queat? 215. haemorrhagiae curatio 313. 694. eam secutus partus sanus 694. hydrops, eiusque ab ascite differentia 683. inuersi repositionis modus et periculum 292. in partu ruptura spontanea 318 seq. polypi seu sarcomatis curatio 314. 319. sphacelo affecti plenaria extirpatio 316. speculum emendatum 150. orificium quatenus signum grauiditatis 287.
- orificii status post partum ib. vaginae angustia 288. coalitio ib. dilaceratio 289. in fetu aberratio 463 seq.
- Vulnera capitis 125 seq. 309. 312 seq. 315. 326. pectoris vid. *Pectus*. sclopetorum vid. *Sclopetorum*. post amputationes magnas tractandi modus 631
- Vultur gryphus Linn. 46
- W.
- Weis, Frid. Guil. plantae cryptogamicae florum Gottingensis 708
- ab Wenzel, visum Cl. Eulero restituit 540
- Werner, prof. botan. Fuldensis 351
- Whytt's, Robert, Works 223
- Will, Geo. Andr. memoriam secularem aedium vniuersitatis Altdorsinae celebravit 720
- de Wind, Paul. obiit 539
- Wohlfart, Io. Aug. Obs. de vermibus per nares excretis 159
- Wyngard, Io. anat. chir. et artis obstetriciae Lector Dauentriensis 539
- X.
- Xanthornus, nouum auium genus 419 seq.
- Xylophthorus terrestris insectum 586
- Z.
- Zeviani, Giov. Verardo. sopra lo scorbutto dissertazione 524
- Zoologica spicilegia 418
- Zückert, Io. Frid. systematische Beschreibung aller Gesundbrunnen und Bader Deutschlands 78



EMENDANDA.

Pag. 6. lin. 4. elici lege eiici possit; lin. 9. HERONIS
 lege HIERONIS. p. 10. lin. 20. bullum leg. bulbum. p. 12.
 lin. 26. methodos leg. methodum. p. 16. lin. 17. corpori leg.
 corporis. p. 24. lin. 13. cananiculos canaliculos p. 31. lin. vlt. cache-
 ctium leg. cachecticum. p. 34. lin. 25. fit leg. fit. p. 36.
 lin. 23. morbis leg. morbus. p. 56. lin. 13. simplicissimo leg.
 simplicissima. p. 82. lin. 3. Badensis leg. Badenses. p. 94.
 lin. 16. DESPERIERRES leg. DESPERRIERES. p. 101.
 l. 15. nasturtinorum leg. nasturtinarum. p. 101. l. 33. summum lege
 summam. p. 107. lin. 19. digestionem leg. digestionis. p. 110.
 lin. 14. visum esse productum leg. visam esse productam. p. 112.
 lin. 33. illum lege illam. p. 113. lin. 1. iniectum lege iniectam.
 p. 116. lin. 29. istum leg. istam. p. 117. lin. 13. productum
 fuisset lege produxisset. p. 127. lin. 22. dextram leg. dex-
 trum. p. 131. lin. 28. potissum lege potissimum. p. 134. lin.
 28. quae lege qui. p. 141. lin. 10. post 1768 adde 4 mai. p.
 144. lin. 6. fasciamque lege fasciam. p. 168. lin. 12. zur l. zum.
 p. 198. lin. 28. mitigato lege mitigata. p. 199. lin. 13. et 15
 refecare lege refecari. p. 213. lin. 4. quum lege quam. p.
 231. lin. 13. conchyologicum l. conchyliologicum. p. 232. lin. 2.
 singulas lege singulae. p. 236. lin. 2. tabulati lege tubulati.
 p. 266. lin. 20. vnam lege vnus. p. 277. lin. 11. positum leg.
 positam. p. 13. SWIETENIVS lege SWIETENIVS. p.
 292. lin. 25. quam lege quem. p. 295. lin. 2. quem lege quos.
 lin. 32. aqua lege aquila. p. 296. lin. 5. baetico lege boetico.
 p. 300. lin. 19. et 22. capiti lege capite. p. 322. lin. 1. mani-
 tudinis lege magnitudinis. p. 337. lin. 31. Omnis lege Omnes.
 p. 343. lin. 3. iuuabant lege iuuabunt. p. 367. lin. 9. *Forse-*
zung leg. *Fortsetzung*. p. 368. lin. 4. Batauorum lege Bataua-
 rum. lin. 20. CVIL. lege GVIL. p. 392. lin. 10. BAB-
 TIST. lege BAPTIST. p. 390. lin. 21. Penguin. lege Pin-
 guin. p. 392. lin. 20. in vsum lege in vsu. p. 394. lin. 14.
 mngnitudinis lege magnitudinis. p. 396. lin. 10. facili lege fa-
 cile. p. 398. lin. 15. IISDEM ab lege ab IISDEM. p.
 400. lin. 15. Stasbourg. leg. Strasbourg. p. 410. lin. 13. pra-
 ter leg. praeter. p. 411. lin. 13. vsui leg. vsu. p. 418. l. 24.
 quarto lege quinto. p. 422. lin. 2. katschatici leg. kamtscha-
 tici. p. 427. lin. penult. hebdomatel. hebdomade. p. 438.
 lin. 23. acidi rubros leg. acido rubros. p. 460. l. 16. espodet
 leg. respondet. p. 472. l. 12. facta l. factae. p. 474. lin. 3.
 occurentia lege occurxentia. p. 477. lin. 4. ipecacuanha lege
 ipecacuanhae. lin. penult. artificales lege artificiales. p. 480.
 lin. 10. Angilcae leg. Anglicae. p. 484. lin. 4. ouuium lege
 ouium. p. 485. lin. 11. conducentur leg. conducantur.
 p. 511. lin. 28. quorum lege quarum. pag. 530. lin.
 28. se lege sua. p. 535. lin. 3. aliae alias. lin. penult.
 FRIEDERICVS leg. FRIDERICVS. p. 438. lin. antepe-
 nult. p. 162. l. p. 345. p. 549. lin. 31. anotomiae lege anatomiae
 p. 552. lin. 10. BALTHASAR. leg. BARTHOLOM. p. 554.
 lin. penult. lertres leg. lettres. p. 558. lin. 3. Fine leg. Eine.
 p. 561. lin. 19. Vol. leg. Vol. l. p. 571. lin. 24. GOTH.
 lege



lege GOTTFR. p. 572. lin. antepenult. et p. 573. lin. 1.
CPHP. leg. CHPH. p. 573. lin. 9. aliter lege alter. p.
580. lin. 10. BAPTISTA leg. BAPTISTA. p. 581. lin. 15.
spiritu leg. spiritui. p. 592. lin. 20. BOSCONICH
lege BOSCOVICH. p. 567. lin. 2. terrestribus lege terrestribus.
p. 603. lin. 27. exhalationibus. lege exhalationibus. p. 604.
lin. 30. aliquid leg. aliquod. p. 606. lin. 3. eas leg. eam. p.
28. peniciosissima leg. perniciosissima. p. 607. lin. 19. Differrunt
leg. Differunt. p. 614. lin. 19. sit lege sit. p. 637. lin. 28.
exponetur lege exponitur. p. 645. lin. 9. tractatis lege tracta-
tibus. lin. 15. fuscis leg. flosculis. p. 651. lin. 6 et 7
effectus leg. effectus. p. 652. lin. 16. tabace leg. tabaci. p.
654. lin. 11. aeris leg. aeri. lin. 24. qui leg. quod. p. 656.
lin. 14. supetunt leg. suppetunt. p. 664. lin. 1. et leg. est. lin.
34. metuedum leg. metuendum. p. 666. lin. 21. post considera-
tur. adde Auctore THOMA KIRKLAND. p. 668. l. 19. celeberrimorum
leg. celeberrimorum. p. 669. lin. 22. alloborandum l. allaborandum.
p. 770. lin. 2. tiam lege etiam. lin. 13. accuratae lege accurate. u. p.
673. lin. 30. acalinis lege alcalinis. p. 675. lin. 25. collectas l.
collectae. p. 683. lin. 16. folliculorum leg. foliorum, lin. 31.
CROLLI lege CROLLII. p. 685. lin. 12. librae aqua lege libra
aquae. p. 694. lin. diacodii lege diacodii ope. p. 701. lin.
12. hunc leg. hic. p. 704. lin. 18. pecularae leg. peculiare.
p. 728. lin. 8. pertandra lege pentandra. p. 735. lin. 9. de-
finis lege definis. p. 750. lin. 15. fictum lage fictum.
